

सस्नेह—

भारतवर्ष के उन सरल हृदय, किन्तु
परिश्रमी किसानों को, जो 'धरती-का-लाल'
कहाने में
हार्दिक सुख और आत्म-गौरव
का
सच्चा अनुभव
करते हों ।

लेखक—

मुद्रक—

यादव प्रिंटिंग प्रेस,
भाय्यार सीवाराम, देहली ।

दो शब्द

इतिहास साक्षी है, कि प्रारंभ में मनुष्य केवल मांसादि पर अपने जीवन का निर्वाह करता था। जंगली पशुओं और मनुष्य में केवल शक्ति-सुरत का ही भेद था, अन्यथा स्वभाव मिलता-जुलता और रहन-सहन का ढंग एक जैसा था। परन्तु समय ने करघट बदली, और मनुष्य ने पशुओं का जामा बदल कर धीरे धीरे सभ्यता और संस्कृति का चोला धारण करना प्रारंभ किया। प्रकृति ने प्रेरणा देने के साथ-साथ मनुष्य को रास्ता दिखाया, और उसके भस्तिष्क में खेती-बाड़ी करने का विचार उत्पन्न हुआ। उसने हल की नोक से धरती के हृदय को विदीर्ण कर गेहूँ, चावल जैसे प्राणदायक अनाजों को बोया—एक दाने से हजारों दाने पैदा हुए, और खेती-बाड़ी ने जुधा-निवारण की समस्या को हल कर दिया। देश में एक छोर से दूसरे छोर तक हरे-भरे खेत लह-लहाते हुए दिखाई देने लगे। मानव-समाज में नवजीवन को स्रोत समझ पड़ा। नाना प्रकार की फसलें बोई जाने लगी—अनाज, तरकारियाँ और फल इत्यादि।

सब प्रकार के अनाज बोने का विस्तार पूर्वक वर्णन हम अपनी “किसान गाइड” में कर चुके हैं, और भाँति-भाँति की सरकारियों का पूरा वर्णन हम अपनी ‘शाक-भाज्जा सरकारी और स्वास्थ्य’ नाम की पुस्तक में किया गया है। उपरोक्त दोनों पुस्तकों का जनता में जो आदर हुआ, उससे प्रोत्साहित होकर मुझे यह तीसरा विषय ‘उद्यान शिक्षा’ के नाम से लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं जानता हूँ, यह विषय उतना आसान नहीं है, किन्तु फिर भी जन-सेवा की प्रेरणा मुझे यह जटिल काम हाथ में लेने को विवश कर रही है। आशा है मेरी अन्य पुस्तकों की भाँति विश्व पाठकगण इने भी अपना कर साहित्य-क्षेत्र में आगे बढ़ने का मुझे प्रोत्साहन प्रदान करेंगे।

—लेखक

विषय-सूची

विषय

प्रकरण १

घाटिका

जल-यायु और उपयोगी स्थान

भूमि

घाटिका-निर्माण

प्रकरण २

आवश्यक सामान और घरे का प्रबंध

मकान

पशु-पालन, कुआँ

स्थायी नौकर

खेत के लिये आवश्यक सामान

घरे का प्रबन्ध

मिट्टी ईंट या पत्थर की ऊँची दीवार, तार का घेरा

केतकी, करौंदा

अशोक, बांस, बबूला या कीकर, जंगली गुलाब

नई बेरी, नागफनी और शूहर

मैहदी, आई पोमिया कारवा

निगुन्डी, हिंगोट, हवा-रोक-वृत्त

प्रकरण ३

जुताई, सिंचाई और पानी का विकास

सिंचाई

सिंचाई की रीति, पानी का विकास

३२

विषय-सूची

विषय

प्रकरण १

वाटिका
जल-वायु और उपयोगी स्थान
भूमि
वाटिका-निर्माण

प्रकरण २

आवश्यक सामान और घेरे का प्रबन्ध	1
मकान	1
पशु-पालन, कुआँ	2
स्थायी नौकर	2
खेत के लिये आवश्यक सामान	2
घेरे का प्रबन्ध	21
मिट्टी ईंट या पत्थर की ऊँची दीवार, तार का घेरा	22
केतकी, करौंदा	23
अशोक, बाँस, यशूला या फीकर, जंगली गुलाब	24
नङ्ग घेरी, नागफनी और यूहर	25
मेंहदी, आँखें पोमिया कारवा	26
निगुन्डी, दिगोट, हवा-रोक-वृक्ष	27

प्रकरण ३

जुलाई, सिंचाई और पानी का निष्कास	28
सिंचाई	28
सिंचाई की रीति, पानी का निष्कास	28

विषय			पृष्ठ
प्रकरण ४			
छोटे पौधों को खाद देने का अभिप्राय	३७
फलदार पौधों को खाद देने का अभिप्राय	३८
सजीव खाद	३९
निर्जीव खाद	४०
गोबर का खाद फलों के वृक्षों को कितना दिया जाये	४३
मनुष्यों का मल-मूत्र, पक्षियों की विष्ठा का खाद	४४
खलियों का खाद	४५
हरा खाद	४७
सूखे या हरे पत्तों का खाद	४८
काम्पोस्ट	४९
शहर के कूड़ा-कंकट का खाद	५०
स्फुर पूर्ण सजीव खाद	५१
पोटाश पूर्ण सजीव खाद, निर्जीव खाद	५३
चूने का खाद	५४
फलदार पेड़ों को खाद देना	५५

प्रकरण ५

फलों के शत्रु और उनसे बचाव	५६
पातक पौधे, अमरवेल	५६
बांझी	५७
फीटाणु	५९
फीट नाशक उपचार और विष	६०
टिट्टे	६४
तितलियों की जाति के फीट	६५
दीमक, फल की मक्खी	६६
घुणक फीट	६७

प्रकरण ६

पौचे तैयार करने की युक्तियाँ
बीजू पौचे तैयार करना
सिपाई
कलमी पौचे तैयार करना
कलम बांधने का मुख्य सामान
दाजी या कलम लगाना, कटिंग
दाय कलम
दो पृष्ठी कलमें
पद्मा चढ़ाना
अर्ध निकालना
भेंट कलम
पांघ की क्रिया
वेबन्द बांधना
साधारण कलम, जीभी कलम, काठी कलम
प वर्किक, पौचे लगाने का समय
वे लगाने की रीति
द्वारा

प्रकरण ७

ए छांट
	६८ से १०३

प्रकरण ८

करण और खेती की विस्तारित रीति
फलों की खेती
र
र दाड़िम

चेपय			४४
अमरुद	११४
आम	११८
आदू, सतालू	१२८
फकदी, खीरा	१३०
फटहल, फणस	१३२
फमरस	१३४
फेला	१३५
खजूर अरबी, ग्यजूर देरी	१३८
खरयूजा	१४१
खिरनी	१४३
गुलाब जामुन	१४४
बकोतरा	१४४
जामुन	१४६
छरपूच, बलिगर, हिन्दवाना	१४७
छुरंत, बिजौरा	१४६
छेन्दू	१४६
दिल पमन्द	१४०
नास राती	१४१
नीबू	१४३
पपैया, पपीता, परएढ बकदी	१४६
पाप्रता	१४८
बिरी	१६०
देर	१६०
देरीगूच, मबोय, टिपारी	१६३
देरी-खेद	---	१६४
देरी रू	---	१६५

फूलों की खेती

अथवा

(समरदार बागवानी)

प्रकरण १

वाटिका

वाटिका (पार्क) का हमारे देश में बहुत बड़ा महत्व माना गया है; और विशेषकर हिन्दुओं के धार्मिक अनुष्ठानों के साथ जो वाटिकाओं का प्रारंभ से ही एक-पनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। देश में स्थान-स्थान पर सुन्दर, मनोरम वाटिकाएँ बनी हुई थीं, जो न केवल शोभा-श्रद्धा के लिए थीं; परन्तु विमान्त पथिकों का भ्रम दूर करने, पूजा-पाठ के हेतु पुष्प-पत्रदान करने एवं भक्ति-भक्ति के समुत्पन्न फलों द्वारा जागरिषों का स्वास्थ्य-सुखद-पलायन करने में भी ये वाटिकाएँ सहायक हुआ करती थीं। देशों और कुराहों में जिस भीतर से इन वाटिकाओं का प्रचार किया गया है, वह हर चीज तरह-तरह होगा जो आनन्दित होकर मरने से पूर्व न बड़े। प्रशस्त विद्वानों एवं अधि-मुनि-पुत्रों के कामों से होकर बड़े-बड़े शरीरों का निर्माण इन वाटिकाओं के ही द्वारा है।

किसी भी दृष्टिकोण से लीजिए, वाटिकाओं का हमारे देश में सदा से ही एक उच्च स्थान रहा है।

जिस भाँति युग-परिवर्तन के साथ-साथ संसार की सभी बातें बदलती रहती हैं, उसी भाँति वाटिकाओं के स्वरूप में भी एक भारी परिवर्तन उपस्थित हुआ और आज जिस रूप में वाटिकाएँ हमारे सम्मुख रह गई हैं, उन्हें देख कर सबमुच हृदय दुःख और आश्चर्य से कुंठित हो जाता है। कहां वे पौराणिक काल की नैसर्गिक दृश्य उपस्थित करने वाली सुन्दर, मनोहर वाटिकाएँ; और कहां ये आज के शुष्क डालियों से भरे पेड़ों के, अव्यवस्थित लम्बे-चौड़े बारा ! कहां गई इनकी वह सुन्दरता ! कहां गया वह मनोमुग्धकारी दृश्य ? कहां हैं वे रसयुक्त फलों के गुच्छे ? क्या आपने कभी इन सब बातों पर विचार किया है ? वही देश, वही भूमि और शायद जलवायु भी वही—फिर क्या कारण है, कि हमारी वाटिकाएँ अब भा वैसी न हों ! आइये आज इसी विषय पर बैठ कर विचार करना है—ताकि देश की यह निधि संगठित रूप से सुरक्षित की जा सके।

वाटिकाएँ कई प्रकार की होती हैं, किन्तु वर्तमान व्यवस्था को देखते हुए उन्हें हम तीन मुख्य श्रेणियों में बाँट सकते हैं। यथा—(१) पुष्प वाटिका, (२) फल वाटिका, और (३) मिश्र वाटिका इत्यादि।

(१) पुष्प वाटिका—यह साधारणतः बड़े आदमियों की कोठी, या अधिकारी वर्ग के बंगलों में ही देखी जाती है। केवल शोभा-वृद्धि के लिये ही इन्हें लगाया जाता है। रंग-भिरने सुगन्धित फूलों से आच्छादित निडुंज, लताएँ और पीये इस वाटिका का

सौंदर्य-वर्द्धन करी हैं। पूजा और विवाह आदि शुभ अवसरों पर फूलों की विशेष मांग रहती है, जिन्हें माली के द्वारा उचित मूल्य पर धोकर या फुटकर बेचा जा सकता है।

(२) फल वाटिका—यह केवल फलों की प्राप्ति के लिए ही लगाई जाती है। इसमें हर प्रकार के फलों के वृक्ष तो लगाये ही जाते हैं, किन्तु बहुतायत उन्हीं वृक्षों की होती है जो बारा लगाये जाने वाले स्थानों की स्थिति, भूमि और जलवायु के अनुकूल होते हैं। ऐसी वाटिकाएँ बड़े नगरों के आस-पास या ऐसे स्थानों पर अधिक उपयुक्त होती हैं, जहाँ यातायात का उचित प्रबंध हो, ताकि वार्षिक पैदावार सुगमता से मंडी पहुँचाई जा सके।

(३) मिश्र वाटिका—इनमें फल, पत्त और कहीं-कहीं सरकारियों को भी स्थान दे दिया जाता है। अधिकतर ऐसी ही वाटिकाएँ आज कल लाभदायक सिद्ध होती हैं।

जल-वायु और उपयोगी स्थान

पाग लगाने के लिए सर्वप्रथम उपयोगी स्थान चुनने की आवश्यकता पड़ती है। जहाँ जिस प्रकार जलवायु हो, वहाँ वहाँ के अनुकूल पौधे बोये जाने चाहियें, तभी व्यवसायिक दृष्टि में लाभ उठाया जा सकता है। हमारा देश विशाल है यहाँ के अधिकांश प्रान्तों का जलवायु जुदा-जुदा है और यही कारण है कि देश भर के लिये एक-मे नियम नहीं बनाये जा सकते। किसी प्रान्त के साधन-सम को जानकार ही इस बात का निश्चय किया जा सकता है कि वहाँ कौन-कौन से पौधे बोये जाने चाहियें। भारतवर्ष में प्रधान तीन श्रेणियाँ होती हैं—दूरी, शीत और मीन।

अगुर् माती इन ऋतुओं के अनुसार ही कसल की देख-रेख की
 जाती रहती है। गर्मी की मौसम और वातावरण
 में तरी की मात्रा बढ़ जाने पर पौधे भी बढ़ने लगते हैं। य
 अवस्था पौधों की बाढ़ व लिये मानी गई है। वर्षा ऋतु में व
 और भूमि गर्म रहती है, और वातावरण में नमी भी क
 अधिक बढ़ जाती है। यही कारण है कि पौधों की बाढ़ बि
 अधिक बरसात में होती है, इतनी और किसी मौसम में न
 होती। शीत-काल में, जबकि सर्दी-गर्मी में शीघ्रता-पूर्वक प
 र्तन होने से पौधों को हानि पहुंचने का डर रहता है। कु
 माती उन पर छाया करके उनकी रक्षा करता है। इस सम
 ऋतु के हेर-फेर के कारण, थोड़े समय के लिए पौधों की ब
 क-सी जाती है। इस अवस्था में पौधा अधिक पानी नहीं से
 सकता, इसलिए माती ऐसे समय कम पानी देता है। आव
 ता से अधिक पानी भी पौधों को हानि पहुंचाता है। य
 माती ये सब बातें भली प्रकार जानता है, और उसके अनुसार
 सफे अपना काम भी करना पड़ता है। गर्मी के दिनों में जर्म
 रूखी सूख कर फकी हो जाते हैं। इसलिए यह पौधे को स
 नी सींचता है, और थाने की मिट्टी को गोद कर ढीली बना
 ता है। फलों के पौधे इस समय फलों से लदे रहते हैं इनलि
 नही देख-भाल और करना पड़ती है। अगुर् माती सब
 देर कर सब करता रहता है।

भूमि—पौधे रूखों से अपनी मूलक निकाल लेते हैं। पौ
 ही उन्हें ठाम न होकर, मदान नती के समान कोड़ी होती है

पौधे को अपना जीवन बनाये रखने के लिए निम्नलिखित तत्व आवश्यक होते हैं— नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बोनिजन, फोस्फोरस, पोटैशियम, सल्फर, कैल्शियम, नमक, लोहा, मॅग्नेशियम, सिलिकियम, मैंगनीज, क्लोराइट और मैंगेनियम इत्यादि। इनमें से हाइड्रोजन और कार्बोनिजन तो पौधे को पानी से मिल जाते हैं। कार्बन पारों और के दातावरण से प्राप्त होता है। शेष अन्य सभी तत्व पौधे को जमीन की मिट्टी से मिलते हैं। ये तत्व भूमि के अन्दर पानी में घुले हुये सार के रूप में ही पाये जाते हैं।

पृथ को हाँड़ो जन से लगाकर पारमोरन तक के सत्य बहुत ब्यापार दरकार होते हैं। ये सभी सत्य भूमि से ही सोखे जाये हैं। अनपेक्ष यह जरूरी है कि सोखे हुए सत्यों को किसी न क्विवा रूप में जमीन को अक्षय्य लौटा दिये जायें। अर्थात् धरती के गर्भ में उनकी पूर्ति होती रहनी चाहिये। यदि ऐसा न किया जायेगा, तो इन सत्यों के अभाव में अनीन निपल हो जायेगी, जिसका परिणाम यह होगा कि पौधा निपल और अक्षय्य होकर सारी प्रकृति को निरक्षय बना देगा।

पीसा जमान की मिट्टी में ही बढ़ता है। उसकी जड़ें मिट्टी में
 ही फैल कर अपनी खुशबू फैलाते हैं। इसीलिए वह बहुत अच्छी
 है कि हमारे ही मिट्टी में ही हो, जितने पीसे अपनी जड़ें बढ़
 सके, और उसकी जड़ें अधिक गहराई तक फैल कर सके।
 क्योंकि पीसा हमारी जड़ों को अपने और पीसा पर हमला में
 कम रखे !

कृषकजन अधिक बालू वाली भूमि को 'बलुआ', कम बालू वाली को 'मटियार' तथा बीच वाली को 'दुमट' कहते हैं। इसी लोग बलुआ और दुमट के बीच वाली को 'बलुआ-दुमट' और दुमट व मटियार के बीच वाली को 'मटियार-दुमट' कहते हैं। भूमि विज्ञानवेत्ताओं ने बालू की मात्रा की जाँच करके इसे निम्न-लिखित पाँच भाग माने हैं। जिस मिट्टी में बीस शतांश से कम बालू हो, उसे 'मटियार' और जिसमें बीस से बालुन शतांश हो उसे 'मटियार-दुमट' कहते हैं। दुमट में यह मात्रा बालुन से साठ शतांश तक होती है और जब यह मात्रा साठ से अस्सी तक पहुँच जाती है, तो उसे बलुआ-दुमट कहते हैं। बलुआ में बालू का भाग अस्सी शतांश से अधिक ही रहता है।

ये फलों के वृक्ष प्रायः सब प्रकार की मिट्टी में हो जाते हैं। परन्तु अधिकांश बलुआ-दुमट और दुमट में अच्छे होते हैं। मटियार मिट्टी जिसमें बरसाती पानी लगता हो उसमें कुछ फल ऐसे हैं जिनके वृक्ष नहीं हो सकते। यदि इस बरसाती पानी को थोड़ी-थोड़ी दूरी पर खुली हुई नालियाँ बना कर निकाल दिया जाये, तो भूमि का कुछ अंश तक सुधार किया जा सकता है। बलुआ भूमि में फलों के वृक्ष लगाये जायें तो खाद और पानी दोनों ही अधिक देने पड़ते हैं। इसलिए जहाँ तक हो ऐसी जमीन चुननी चाहिए। जहाँ की मिट्टी दुमट या बलुआ-दुमट हो। जमीन का चुनाव करते समय एक थोर ढालू या समतल भूमि का चुनाव करें।

भूमि-विज्ञानवेत्ताओं ने भिन्न-भिन्न पौधों के लिये निम्न-लिखित जाति की भूमि को उत्तम और लाभदायक बताया है। देखिये नीचे का नक्शा—

नाम पौधा	उपयुक्त भूमि की जाति	रूम-से-रूम गहराई	जलवायु तथा विवरण
अंगूर	दुमट	४ फीट	सूज ऊष्ण वायु में पकता है।
अ. र.	बुलुआ-दुमट	६ "	
अनार	चूने का धंश		
	बाली दुमट	४ "	
अमरुद	बुलुआ-दुमट	६ "	
आदू	दुमट	६ "	भूमि के नीचे ऊष्णता हो।
आलुबुजारा	दुमट	६ "	" " " " "।
आम	मटियार-दुमट	१० "	हिम प्रदेशों में नहीं होता।
केला	तरी बाली,		
	ज्वारा-दुमट	६ "	तर प सम जलवायु में।
खजूर	ज्वारा-दुमट	१० "	गर्म-उष्ण जलवायु में।
मेपट्ट	—		—

दीपा	वस्तुका मूल्य की प्राप्ति	कम से जमनामः	मन्त्रवाक्य तथा विधान
१	दुमट	८ १/२	
२	दुमट	६ "	
३	निशाम दाही		
४	एवंरा-दुमट	६ "	
५	दुमट	३ "	
६	बजुषा-दुमट	८ "	
७	एवंरा-दुमट	८ "	
८	दुमट	६ "	
९	दुमट	६ "	
१०	दुमट	६ "	
११	एवंरा-दुमट	५ "	
१२	दुमट	४ "	

सार जलवायु अच्छा है।

वाटिका-निर्माण

वास्तव में वाटिका-निर्माण (Laying out) का कार्य इतना आसान नहीं है । कारण, कि निर्माण-कार्य प्रारंभ करने से पहले वह सब घाते मोच लेनी पड़ती हैं, जिनसे लाभ-हानि पर यथेष्ट प्रभाव पड़ता है । मित्र-भिन्न जाति के पौधों को किस ओर की पंक्ति में लगाना उचित होगा, मानी के रहने का प्रबन्ध तथा सिंचाई के लिये जलाशय बनवाने का उपयुक्त स्थान इत्यादि सभी आवश्यक बातों का पहले एक नक्शा तैयार कर लेना पड़ता है और तब उसी के अनुसार (Laying out) होना चाहिये ।

हम यहां हम एकड़ भूमि का एक नक्शा पेश करते हैं, पाठक गलत उसी के अनुसार, अथवा जैसी स्थिति हो, इसमें कुछ हेर-फेर करके वाटिका लगा सकते हैं । चारों ओर कैंटिदार भट्ठी या घुड़ों की याड़ लगाने के परवाना, जिस ओर मुख्य द्वार रखना हो, वहाँ में एक १२ फीट चौड़ी मड़क वाटिका के ठीक मध्य भाग से दाहिनी ओर इसके अन्तिम छोर तक बनानी चाहिये । इन मड़क को, अच्छा तो यही होगा कि पक्की बना ली जाये, ताकि बरसात में कीचड़ न हो सके । नहीं तो, मुखियानुसार उस पर सुर्खी (ईंटों का धूरा) छलका कर दुरगुठ से छुटवा देना चाहिए । सड़क हमेशा दोनों ओर की भूमि से एक फुट या ६ इंच ऊँची अवश्य होनी चाहिए । इसी के दोनों ओर सिंचाई के लिए मुख्य नालियाँ बनाई जायें, जिनसे आवश्यकतानुसार अन्य छोटी-छोटी नालियाँ निकाल कर वाटिका के भिन्न २ भागों में पहुँचानी चाहियें । मध्यवर्ती मुख्य मार्ग के दोनों ओर किनारों से ४-५ फीट

की दूरी पर जिन वृक्षों की पंक्ति लगाई जाये वह कम ऊँचे
 घाले होने चाहियें, ताकि उनकी जड़ों अथवा छाया से निकट की
 भूमि के पौधों को हानि न पहुँच सके। संतरा, आड़ू, या आंव
 दुपारा जैसे पेड़ ऐसी जगह ठीक रहने हैं। इनसे मुख्य-पथ के
 सुन्दरता भी बढ़ जाती है और फल भी प्राप्त होते रहते हैं।
 प्रवेश-द्वार के पास दोनों ओर पाव-पाव एकड़ के लगभग दो-दो
 बनवायें जायें। एक ओर के तम में नौकरों के लिये दो-दो
 मकान तथा दूसरी ओर नर्सरी बनाने से अच्छा रहता है। नर्सरी
 में बीजू पौधे तैयार किये जा सकते हैं, और चिकी के लिए
 इलमी पौधे भी वहाँ रक्खे जा सकते हैं। द्वार के पास होने के
 कारण जरूरतमन्द माहकों को आसानी से दिखलाये जा सकते
 हैं। जिस ओर मकान आदि बनवाये जायें, वधर घेरे के पास
 आम, इमली, कोंथ, जामुन, बेल आदि के पेड़ लगा देने चाहियें।
 क्योंकि इनके छाया और फल दोनों समय-समय पर मिलते रहते
 हैं। इन दो रोतों के निर्माण के पश्चात् डेढ़-डेढ़ एकड़ क्षेत्र-फल
 घाले तीन-तीन खेत सड़क के दोनों ओर बनवाये जायें और
 प्रत्येक दो खेतों के बीच में मुख्य सड़क से मिलती हुई आठ-नौ
 फीट चौड़ी सड़कें बनवा कर उनके किनारों पर केला, पपीता
 आदि के पेड़ लगवा देने चाहियें। इन सड़कों का यह लाभ होगा
 कि पशु हल-बल्लर सहित बड़ी सुगमता से प्रत्येक खेत में पहुँचाये
 जा सकेंगे। इन रोतों का डेढ़ एकड़ ही होना कोई आवश्यक
 नहीं है। बनाने-बनाने मुश्किलान्तर इनका क्षेत्रफल बढ़ाया

बढ़ाया जा सकता है। ऊपर हमने दूध एकड़ भूमि को डेढ़ डेढ़ एकड़ बाने छः खेतों में बाँटा है। इनमें से चार खेत लम्बी आयु के वृक्षों के लिए तथा दो खेत माग-भाजी बाने या कम आयु वाले पौधे लगाने के काम आ सकते हैं। जलवायु और भूमि की स्थिति देगते हुए नदनुसार उपरोक्त नक्शे को बनाना चाहिये।

सिचाई के लिये अगर कुआँ बनवाना हो, तो समतल भूमि होने पर बीच बाने खेतों में से किसी एक में सड़क के किनारे बनवाना चाहिये। यदि भूमि समतल न हो और एकतरफ ऊँची, दूसरी तरफ नीची हो, तो ऊँचाई की तरफ बनवाना ठीक होगा।

नक्शा

डेढ़ एकड़ (खेत)	मुख्य मार्ग—१२ फीट चौड़ा	डेढ़ एकड़ (खेत)	बाह्य मार्ग ८-६ फीट चौड़ा
मार्ग		मार्ग	
डेढ़ एकड़ (खेत)		खेत डेढ़ एकड़ • पन्ना कुआँ	
मार्ग		मार्ग	
खेत डेढ़ एकड़		खेत डेढ़ एकड़	
'सकान, पाव एकड़		नर्सरी, पाव एकड़	

प्रकरण २

आवश्यक मागान और घरे का प्रबन्ध

निम्न-लिखित चीजें किसी भी फल-मगिया में होनी जरूरी हैं। इनमें अपनी-अपनी आवश्यकता और सुविधानुसार कमी-बेशी की जा सकती है।

मकान—प्रत्येक फल-बाटिका में दो तीन कमरों का एक मकान अवश्य बना होना चाहिए। ये कमरे जुदा-जुदा भी बनाये जा सकते हैं। एक फूंस का छप्पर तो इतना लम्बा-चौड़ा बनाया जाये कि जिसमें दो जोड़ी बेज बखूबी बांधे जा सकें। इसी छप्पर या कमरे में एक भाग (बीच में पार्टीशन करके) ऐसा होना चाहिए, जिसमें बैलों का दाना और बेटों के औजार तथा सजीव अथवा निर्जीव पदार्थ का ढेर रक्खा जा सके। दूसरा मकान ऐसा हो, जिसमें चौकीदार, माली या मिथी लकड़ी के बक्स आदि (पेंटिंग के पूरे सामान सहित) रह सकें। इसी के साथ दूसरा कमरा ऐसा होना चाहिए, जिसमें फल आदि तोड़ने के बाद उन्हें पकाये या पके-पकाये रखा जा सकें। ये सब कमरे सुविधानुसार फट्टे-पक्के बनाये जा सकते हैं।

इन्के अतिरिक्त, यदि एक छोटा-सा पंगल-गुमा घर इसी

पान १ आस-पास और बनाया जाये तो अच्छा है। इसमें एक या दो बड़े-बड़े कमरे और मानने की ओर एक बड़ा-सा खुला हुआ वरान्दा अवश्य होना चाहिए। क्योंकि यह बंगला केवल मनोरंजनार्थ आये हुए मेहमानों के लिए ही बनाया जाता है। आराम की फसल का आनन्द लूटने, जलवायु परिवर्तन करने, अथवा पिकनिक का आनन्द लूटने के हेतु ही इस बंगले का निर्माण किया जाता है। परन्तु यह अपनी-अपनी इच्छा पर निर्भर है। घनाभार न होने की दशा में ही इसको बनवाना चाहिए, वरना कोई खाम उभरत नहीं है।

पशु-पालन—खेती-बाड़ी करने वालों को पशु-पालन करना पशु प्रशो में लाभदायक सिद्ध होता है। एक गाय और एक जोड़ी बैल तो अवश्य होने ही चाहियें। जहाँ सिंचाई का प्रबन्ध नहर से हो वहाँ जुताई करने और फलों को बाजार तक पहुँचाने के लिए एक बैल की जोड़ी काफी होगी। परन्तु यदि मोट द्वारा हुए से पानी उठाना पड़े तो उसके लिये एक बड़ा जोड़ी और अन्य काम के लिए एक हल्की जोड़ी रख लेनी चाहिए। गाय रखें न रखें वह अपनी इच्छा पर निर्भर है। बाटिका को, सिंचाय उसके गे घर के ग्वाद के अन्य कुछ भी लाभ-हानि नहीं। परन्तु यदि बैलों के साथ-साथ एक गाय भी रख ली जाये तो अच्छा हो है।

कुएँ—जहाँ नहर से पानी मिल सके वहाँ पीने के जल के लिये एक साधारण छोटा कुएँ या ट्यूब वेल (Tube well)

हो गो काम कम जायेगा। मगर न हो गो एक बात-माली
 पतनना चाहिए, जिनमें लिखें भी हो गंठ और फनी बर
 भी मिल गये। हम एकदू भूमि हो लिखें के लिए देना
 होना चाहिए जिनमें माली के दिनों में दो मोटे दिन मर
 रहने पर भी मंषा एक पानी न दूटे और रात भर में घर
 पूरी हो जाये।

स्थायी नौकर—मायः दस एकदू सेप्रकल की पणि
 पाम सम्हालने के लिए एक चतुर भाजी और तीन स्थायी म
 फाये हैं। काम की अधिकता होने और छोटे-मोटे काम
 के लिए आवश्यकतानुसार अस्थायी मजदूर भी रखे जा स
 हैं। माली को सब प्रकार की फलमें पौवने और काट-छाँट
 का पूरा-पूरा ज्ञान होना चाहिए। चिड़चिड़े स्वभाव का म
 ठीक नहीं होता। भीठी बोली से उत्साह बढ़ा कर मजदूर
 दुगना-तिगना काम लिया जा सकता है। मालिक बुद्धिमान
 काम ले तो उसे यथेष्ट लाभ पहुँचने की संभावना रहती
 बीच-बीच में अच्छा काम करने वाले नौकरों को यदि
 मोटा कोई पुरस्कार दे दिया जाया करे तो इससे मालिक
 यश तो कैलता ही है, पर साथ ही काम भी अधिक से अ
 हो जाता है। नौकरों से काम लेना कोई आसान नहीं, पर
 सब कामों को आसान कर देती है।

खेत के लिये आवश्यक सामान

मादे हल	२
घसर (Scraper and clod-Crusher combined)				२
सब्बल (Crowbar)	२
गैती (Pick-axe)	३
कुदाल, या फावड़े (Spades)			३
खुरपी	४
हलिया	३
हजारे, या मंम (Watering cans)			२
फाँटे (Forks)	२
पम्प (Sprayer)	१
फाँटा बड़ा (बजन के लिये)			१
गाड़ी	१
हाथ से चलाने वाला हो (Hoe)			एक पहिये वाला	१
हाथ गाड़ी (Wheel parrow)			१
मोट और रस्सियाँ (यदि पानी कुण. से उठाना हो)				२
कुल्हाड़ी (Axe)	१
आरी (Saw)	१
बनूला	१
रुग्रानी	१
बलनी (मिट्टी खाद आदि चलाने के लिए)			१
पाकू (मेसिंग, या सादा पाकू)			१

पाकू (प्रूनिंग, मोटे दल्ले और टेढ़ी नोक वाला) १
" (बटिंग, सादा किन्तु पतले दल्ले वाला) १
पेड़ छाँटने की कैवी (Tree-pruner) १
छोटी टहनियाँ काटने की कैवी (Secateurs) १
सँ की (Fruit-picker) २
बरीष (भूमि नापने के लिए) १

टोकरियाँ, लोहे के तल्ले और देवदार के बक्स इत्यादि।

उपर्युक्त औजार हमने दस एकड़ भूमि की खेती के लिये लिखे हैं। यह आवश्यक नहीं है, कि सब सामान इतना ही होना चाहिए; परिस्थिति और आवश्यकता को देखते हुए इनकी संख्या अथवा औजारों में कमी-बेशी की जा सकती है। स्मरण रखें, कि इन औजारों में से जब किसी औजार को काम में लाया जाये, तो उपयोग के पश्चात् उसे साफ करके रखा जाये। ऐसा न करने से, जंग आदि लग जाने के कारण औजार बिगड़ जाते हैं। खास करके वे औजार जिनमें पाँचे काटे जायें, मिट्टी खोरी या औपधियाँ छिड़की जायें, उन्हें तो अवश्य ही धोकर साफ का लेना चाहिए। छुरी या कैवी आदि को वर्षा ऋतु में तेल, ग्रीम या वेसलीन आदि लगा कर रखना चाहिए।

घेरे का प्रबन्ध — प्रत्येक पल्ल के बगीचे के चारों ओर घेरा होना चाहिए। जिसमें पशु से ही नहीं बरन् खोरों से भी रक्षा हो सके। ऐसे घेरे चार प्रकार के होते हैं।

(१) मिट्टी, ईंट या पत्थर की ऊँची दीवार—ईंट या पत्थर की चुनाई मिट्टी चुने या सीमेंट में की जा सकती है। जहाँ जिस प्रकार की चीजें सतत मुख्य में पाई जा सकती हों, वहाँ घन्टी का घेरा बना लिया जाये। अन्य सब प्रकार के घेरों से यह दीवार थाली घाड़ ही अधिक मजबूत और सुरक्षित रहती है। दीवार के ऊपर घनते समय ही काँच के छोटे-छोटे टुकड़े लगा देने चाहियें, ताकि कोई दीवार फाँद कर भीतर न आ सके। इस घेरे से हजा की रुकावट भी हो जाती है।

(२) तार का घेरा—ऐसे घेरे तीन प्रकार के होते हैं। एक सादे तार के, दूसरे फाँटेदार तार के और तीसरे जालीदार तार के। तार की पकड़ के लिए लोहे या लकड़ी के खंभे लगाये जाते हैं। बगीचे वालों के लिए जालीदार (Woven wire fencing) तार का घेरा ठीक होता है। ऐसे घेरे के ऊपर एक तार फाँटेदार तार का लगाना ठीक होता है, ताकि ऊपर चढ़ कर कोई अन्दर न घूँस सके। जाली तीन-चार ईंच भूमि के अन्दर तक गड़ी हुई होनी चाहिए। ताकि गीदड़, सुन्हर आदि सँगली जानवर अन्दर न आ सकें। जालीदार तार के घेरे में लकड़ी के खंभे लगाना ठीक होता है। ये कम-से-कम १५-१५ या २०-२० फीट की दूरी पर लगाये जाने हों। प्रत्येक खम्भा ५-६ फीट ऊँचा और ५-६ ईंच व्यास का होता है। खम्भे एक या डेढ़ फीट गहरे भूमि में अवश्य गड़े होने चाहियें। गाड़ने से पहले प्रत्येक खम्भे को तारछोल गार्न करके रंग देना चाहिए। यदि पूरे खम्भे न भी

रंगे जायें तो नीचे या भाग दाईं पीट तक अवश्य रंग
 चाहियें। डामर (अलमत्तरा या तारकोल) लगा देने से
 आदि से रंगभे सुरक्षित रहते हैं। कोनों वाले रंगों को
 गहराई पर मजबूती के साथ गढ़ना चाहिए। ये अन्य रंगों
 अपेक्षा यदि कुछ माटं और ऊंचे भी रखे जाएं तो अच्छा
 इनकी मजबूती के लिए दो-दो तिरछे रंगभे इस भांति लगा
 चाहियें, कि जिनका एक तिरा जमीन में गड़ा हो और
 बीच वाले रंगभे की टेक के लिए उसके साथ जुड़ा हुआ हो
 यह रंगभे और मजबूत हो जाता है।

(३) तीसरे प्रकार का घेरा जीवित पौधों को ल
 तयार किया जाता है। ऐसे घेरे बहुधा काँटेदार झाड़ों के
 जाते हैं, जिनमें कोई आदमी या पशु अन्दर न घुसने पाय
 घेरे देखने में तो सुन्दर लगते हैं, लेकिन इसको तैयार क
 काफी समय और परिश्रम व्यय करना पड़ता है। इसके
 उपयुक्त पौधों के नाम हम नीचे देते हैं। इच्छानुसार चु
 लगा सकते हैं।

केतकी (*Agave*)—यह पौधा इस मतलब के लिए
 होता है। यह अधिक ऊँचा तो नहीं होता, किन्तु इसका
 इतना होता है कि पशु या मनुष्य कोई भी इसमें होकर प
 में नहीं घुस सकते।

करौंदा—जिन प्रान्तों में अधिक धूलि होती हो, वहीं
 बोया जाना चाहिए। इसमें छोटे-छोटे काँटे भी होते हैं, इ
 याद के उपयुक्त है।

अशोक—इसकी छाया बड़ी घनी होती है। कहीं-कहीं तानों को छिपाने के लिए कम्पाउण्ड के अन्दर इसको लगाते हैं।

सौंस—सगी पाले जलवायु के स्थानों में इसको बोया जा सकता है। यों उचा तो यह फाकी होता है, परन्तु इसमें कांटे ही होते।

वयूल या कीकर—बाड़ या घेरा लगाने के लिये यह बड़ी अच्छी चीज है। उत्तर भारत का यह लोकप्रिय, मजबूत और मिठ पृष्ठ है। इसमें छोटे-छोटे नोकदार पैने कांटे होने कारण पशु या मनुष्य कोई भी इसके बीच से लौघने का साहस नहीं कर सकता। यद्यपि इसका पौधा धीरे-धीरे बढ़ता है, किन्तु एक बार लगा देने के पश्चात् फिर दीर्घ काल तक विश्रित हो जाना पड़ता है। इयर-उयर में छँटाई न करके पौधों में खुद बढ़ने देना चाहिए। इसके बीज चैत्र (एप्रिल) में लेकर माघ (जुलाई) तक स्थायी रूप में बाड़ की जगह बो दिये जाते हैं। प्रारंभ में मिचार्ड करने की आवश्यकता होती है। परन्तु जब पौधे एक-एक फुट के हो जाते हैं, तो फिर पानी देने की जरूरत नहीं रह जाती। पौधों के निचले भाग को अधिक मत्ता नहीं होने देना चाहिए। क्योंकि ऐसा होने से नेबले अपने होने का स्थान बना लेने हैं, जो बाग को हानि पहुँचाते हैं।

जंगली गुलाब—इसकी बाड़ भी अच्छी रहनी है। जनवरी करवरी (मार्च-फाल्गुन) में बाड़ लगाने के स्थान पर खारी बनवा कर ६ इंच से १२ इंच तक लम्बी कलमें काट कर आड़ी-

तिरछी लगा दी जाती हैं। कुछ दिन तक सिंचाई करते रहें जड़ें फूट आती हैं। इसके फूल भी बेचे जा सकते हैं।

मड़-चेर—यह जंगलों में बहुत पाई जाती है। इनमें कर बाड़ की जगह लगा देते हैं। बीज बोने हों तो फाल्गुन (मार्च-एप्रिल), अथवा आश्विन-कार्तिक (सितम्बर-अक्टूबर) में बो दिये जाते हैं। प्रारंभ में पानी देने की आवश्यकता है, बाद में नहीं। इसके पौधों को इधर-उधर फैलाने से रो चाहिए। इसको साधारणतया वे ही लोग बाड़ के लिये लगाते हैं, जो अधिक ध्यान न करना चाहें, अथवा जहां दूसरे पौधों की प्राप्ति कठिनाई से हो।

नागफनी और धूहर—इन पौधों का घेरा भी बहुत बढ़ रहा है। परन्तु यह एक पंक्ति में ठीक नहीं रहती, इसलिये इसको कम-से-कम तीन पंक्तियों में बोया जाना चाहिये, जिससे बाड़ काफी बनी हो जाये। इनके नौकीले पैने कांटों से पशु मनुष्य सबको डर लगता है। इनके पौधे लगाने के लिए उनके पत्तों और डंठलों को बलम करके लगाया जाता है। नागफनी, धूहर की ही एक जाति है, हमफे दूध से, यानी दौठल में पत्ते होते हैं, बन्ही को कत्तम करके लगा दिया जाता है। बड़ा धूहर में जो छोटी-छोटी शारायें निफलती हैं, उनको बन्ही में गाड़ दिया जाता है। इनके लगाने का मौसम अगस्त-सितम्बर या फरवरी-मार्च होता है। इसके पौधे दशपि बाड़ के लिये लाभदायक बनावति है, तथापि यह इधर-उधर फैल कर बहुत-सी जमीन पर कब्जा जमा लेते हैं। इसलिये देख-भाल करते रहना चाहिये।

मेंददी—इसके पौधे काँटदार नहीं होते हैं। परन्तु एक-दूसरे मिला कर लगाने के कारण ये आपस में इनने गुंथ जाते हैं कि कोई इनके बीच से निकल नहीं सकता। इसका बीज मई-जून में एक सप्ताह पानी में भिगोने के बाद नर्सरी में बोये जाते हैं और जब तक अंकुर नहीं निकल आता, तब सड़क के किनारे पानी से जूझ रहता है। एक वर्ष बाद नर्सरी से इन पौधों को उखाड़ कर बाटिका के पार्श्वों ओर लगा दे।। कलमें भी लगाई जा सकती हैं जिनको अगस्त-नवम्बर में प्यारिये घना कर लगाया जाता है और जब पौधे तैयार हो जाते हैं, तो उन्हें बाड़ की जगह स्थानान्तर कर दिया जाता है। मेंददी के पौधे में प्रति वर्ष दो बार पत्ते सोड़े जाते हैं, जो बाजार में बिक कर अच्छे पैसे दे जाते हैं।

आई पोमिया कारना—यह पौधा बहुत मजबूत और ठण्ठता को भली भाँति सहन करने वाला है। इस कारण कुछ लोगों ने इसका नाम 'निर्जंज पौधा' भी रख दिया है। इसके पत्ते बहुत बड़े होते हैं, और तो और पत्तों भी इनको गंदी स्थानी। रातगैँ जब सूख जाती है तो जलाने के काम आ जाती है। यह पौधा हर समय दवा रहने के अलावा हर प्रकार के बीड़ों और दूसरे रोगों में सुरक्षित देखा गया है। रीमना में बढ़ने के कारण इसको टेढ़-टेढ़ पीट की दूरी पर लगा देने से भी बाँटे पत्तों का इस्तेमाल हो जाती है। दो-तीन साल में यह ६ से ८ फीट तक लंबी हो जाती है। इसकी कच्चे हुए सब्जी खाई जाती है।

वर्षा काल अथवा वसन्त ऋतु में इसकी इतनी हवा
है। एक बार लगा देने के बाद सिवाय इसके कि जरा
भी छोटी छोट तो उसको छांट दिया जाये, इस पर कन्हीं
भी ध्यान नहीं दिया जाता। बड़ी सुगन्ध से लग जाती है।

भूमि में आया है, कि अब तक साधारण ही रंग
की ही लगाई जाती थी। क्योंकि यह पौधा बहुत जल्दी हरे
पैदा होता है और रास्ते में रुकावट पैदा कर देता है।
इसका उपयोग कम होता जा रहा है। निलम्ब 'पोलिग' को
ही लोग अधिकारिक बाड़ के लिए पसंद करते जा रहे हैं।

निर्गुन्धी—यह पचास ईंच से अधिक वर्षा वाले प्रदेशों
में ही बीज या शाखा काट कर कलमों की रीति में लगा
कर बोने में इगको लगाया जाता है।

हिमालय—यह फंकीली जमीन में भी हो सकता है, पानी में
भी लगाया जाता है।

हिमालय—यह एक फंकीली जमीन वाला पौधा है। पूर्वी पहाड़ों
में इसकी बहुत अधिक पैदाईस किया जाता है। यह बहुत
जल्दी पैदा होता है। कोई इगको बीच में निकल कर नहीं आता
है। बीच भाग-तिनकर में असाही जगह पर बो दिने
में इसकी बहुत पैदाईस करने रहने है। पानी में
भी लगाया जाता है।

१६

मे समान के

को भी

लगाई जायें, जिनसे आँधी-मूफान का वेग कम होकर फलदार वृक्षों के फल, फूल और शाखायें टूटने से बच जायें। ऐसे वृक्षों की बाड़ लगाने से न केवल तीव्र आँधियों का वेग ही कम होता है, बल्कि शीतोष्ण की अधिकता से भी बाग के पौधों की रक्षा होती है। अतएव घेरा जहाँ तक हो सके बड़े वृक्षों का ही लगाना ठीक है।

फर्नी-कहीं सीताफल, अनार, शंखामूर, बेल आदि भी कम्पा-एण्ड के पास लगाते हैं। जंगल-जलेबी के वृक्ष भी इस काम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जैत, कनेर, हयूरेंटा आदि की बाड़ लगाने से बाटिका की शोभा बढ़ती है। हवा रोकने के लिए दो पंक्तियों में वृक्ष लगाने चाहिए। दूसरी पंक्ति के वृक्ष पहली पंक्ति के दो वृक्षों के बीच में आने चाहियें, जिससे पवन का वेग तो अवश्य कम हो जाये, परन्तु फलदार पेड़ों को हवा और प्रकाश मिलना बन्द न होने पाये।

प्रकरण ३

जुताई, सिचाई और पानी का निकास

खेती-बाड़ी के काम में जुताई और सिचाई एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। फल वाले वृक्षों के बीच की जमीन में बार-बार हल या बखर देते रहना चाहिए। विशेषकर वर्षा ऋतु में तो इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। फल वाले पेड़ों की मिट्टी खुरपी से हमेशा ढीली करते रहना चाहिए, ताकि हवा जड़ों तक पहुँच कर पौधों के बढ़ने में सहायक हो सके। जुताई, निर्माण और गोड़ाई का खाम खयाल न रखने से बहुत हानि उठानी पड़ती है। जुताई और गोड़ाई फलों की जड़ों के पास की मिट्टी ढीली होती रहती है और इससे पौधे को हवा के साथ-साथ धरती के गर्म में संचित किये हुये भोजन पर्याप्त मात्रा में मिलते रहते हैं।

जमीन में खर-पतवार के उग आने से भी पौधों को नुकसान पहुँचता है। अन्य पौधों की भाँति ही खर-पतवार के पौधे भी जमीन से ही अपनी खुराक घूसते हैं, और जमीन की तरी का बहुत-सा अंश भी इनके पत्तों से होकर हवा में उड़ जाता है। यदि खर-पतवार नष्ट कर दिया जाये, तो खुराक और तरी, जिसका बहुत-सा भाग वे अपनावश्यक पौधे नष्ट कर डालते हैं।

। जाना है और बंदी फिर फलदार पौधों के काम आता है ।
 थिच मुराथ मिलने से फल-पूल सब पुष्ट और स्वस्थ होंगे ।

मिचार्ड—भारतवर्ष के प्राय सभी प्रांतों में वर्षा के सिवा
 अन्य शत्रुओं के पौधों को पानी देने की आवश्यकता पड़ती है ।
 जो देने के लिये कृषि में कृषि, नालाब, कुएँ और नहर इत्यादि ही
 । गहरे कुओं से पानी ऊपर निकालने के लिए मोट (पम्प),
 रीशियन मॉल, अथवा इंजन से चलाये जाने वाले पम्प आदि
 का उपयोग किया जाता है । भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न भागों में
 भिन्न-भिन्न गहराई में जल छटाने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के
 मशीन और विदेशी यन्त्रों का उपयोग किया जाता है । रहट और
 लम्बे द्वारा जल निकालने की प्रथा हमारे देश में अधिक है ।
 इसे भी दो-तीन प्रकार के होते हैं ।

पानी की नाली हमेशा ऐसे स्थान पर बनाई जानी चाहिये,
 जहाँ से पानी घास के प्रत्येक भाग में स्वयं ही लुढ़कता हुआ चला
 जाये । व्यर्थ जल नष्ट न होने पाये, इस बात का खयाल रखना
 चाहिये । प्रायः देखा जाता है, कि पानी नालियों को फोड़ कर
 बाहर निकलने लगता है, जिसका परिणाम यह होता है कि
 जहाँ पानी देने की जरूरत होती है वहाँ पूरा पानी नहीं पहुँच
 पाता और दूसरी जगह व्यर्थ ही फैल कर वहाँ कीचड़ पैदा कर
 देता है । हमारे मत से तो नालियाँ पक्की ही बनवा दी जायें
 तो बहुत अच्छा हो । लोहे की चादरें काट कर नालियों बनाई
 जा सकती हैं । बर्तन कम्पली वालों ने मिट्टी की अच्छे गोलाकार

नालियों बनाई है, वही भी काम चला सकता है। कुछ क्षेत्रों में जिनके ज़िये रपर की नालियों का भी प्रयोग करते हैं। अच्छा माधन है। इसमें जल व्यर्थ नष्ट नहीं होता। सुविधा पानी देने का प्रबन्ध होना चाहिये।

सिंचाई की रीति—फलों के बगीचे में सिंचाई दो तरह की जाती है। एक ऊपर से जल छिड़क कर और दूसरी नालियों द्वारा। छोटे-छोटे पौधों या लताओं अथवा घोंच की बगीचों में जो तरकारियाँ बोई जायें, उनकी सिंचाई के लिये ब्यारियाँ बनाई जाती हैं। ब्यारियाँ ढाल होने के कारण पानी बह कर चला जाता है नर्सरी में जो बीज बोये जायें उन्हें हलारे या झाँक से, बड़े पेड़ों को नालियों द्वारा पानी दिया जाता है। बड़े पेड़ों जितना फैलाव हो उतनी ही गोलाकार नाली बना कर पानी दिया चाहिये।

पानी का निकास—यह एक आवश्यक बात है। बहुत फल और फूल वाले वृक्षों को, जमीन में हर समय पानी रहने से हानि पहुँचती है। इस कारण बारा के लिए बड़ी खाई अच्छी होती है, जिसमें पानी भरा न रहे। परन्तु सभी जगह ऐसी जमीन का मिलना सम्भव नहीं, और इसी लिये कुछ उपायों द्वारा पानी के निकास की व्यवस्था की जाती है। बागों के लिये निम्न-लिखित रीति से पानी के निकास व्यवस्था की जानी चाहिये।

जिस जमीन में बरसात का पानी भरा रहता हो, उसमें २० फीट की 'दूरी' पर ७-८ फीट चौड़ी और एक या दो फीट

ही नाजियाँ बनाई जायें। जमीन के दान के अनुसार ही ये जियाँ बनाई जानी चाहियें। इन नाजियों के गुप्त्र पर पट्टन-सी स रस पर उन पर कम्पर रस देना चाहिये। परमातम में पानी साथ रस की महीन मिट्टी ढाकर रखी जाती है। यदि नाजियों गुप्त्र पर धारा रस दी जायेगी, तो मिट्टी ढाकर ढाकर न जायेगी।

पानी के निदाग के लिये एक स्तार दूसरी रीति बाम में लाई जाती है। परन्तु इस में व्यव अधिक करना पड़ता है। यों भी नल वाले पदों के लिये यह रीति एकदम उपयोगी नहीं है। शक भार्जा की रसों के लिये निम्नलिखित रीति से जल के निदास की व्यवस्था करना अच्छा है। नीचे हम इसी रीति का वर्णन करते हैं। सुविधानुसार उपयोग में ला सकते हैं।

रस में १४-२० फीट के अन्तर पर तीन फीट गहरी नाजियाँ खोदी जायें। इन नाजियों में घन कम्पनी के घने हुए मिट्टी के तब (Tuber) या ईंट-कंकड़-पत्थर डाले जायें। नल रखने के बाद घन पर ६ इंच मोटी बालू की तह डाल दी जाये और तब नाली मिट्टी में भर दी जाये। यदि कंकड़-पत्थर-ईंट आदि डाले जायें, तो इन पर ६ इंच मोटी घास या पत्तों की तह दी जाये और तब ६ इंच मोटी बालू की तह डाल कर ऊपर से मिट्टी भर दी जाये।

प्रकरण ४

खाद

जहाँ भूमि में पानी में घुले हुए भिन्न भिन्न तत्वों की वृक्ष पौधों को स्वस्थ और पुष्ट बनाती है। ये तत्व नम्रजन, पोटाश, गंधक, लोहा, मैंगनीय और ताँबा इत्यादि होते हैं। तत्वों का थोड़ा बहुत अंश हर प्रकार की जमीन में होता है। भिन्न भिन्न पौधे इनको भिन्न-भिन्न परिणाम में जमीन से लेते हैं। कई सालों के बाद नम्रजन, गुर या पोटाश के भरझ हो जाते हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए पौधे को हर खाद दिया जाता है। नम्रजन से पौधा बड़ी तेजी से बढ़ता उसके पत्ते, शाखाएँ और धड़ सब इसकी सहायता से बढ़ें। अगर आवश्यकता से अधिक नम्रजन दिया जायेगा तो पौधा तो खूब है, परन्तु फल थोड़े लाता है इसका पहचान यह है।

जिस पौधे को नम्रजन की खुराक कम मिल रही होगी कम बढ़ता हुआ दिखाई देता है। पत्ते रोगी से प्रतीत होते हैं। कभी-कभी बहुत फल आने से आगामी वर्ष नम्रजन की कमी कारण लम्बी शाखाएँ नहीं बनने पातीं न ही अधिक पत्ते हैं। इसका प्रभाव यह पड़ता है कि आगामी फसल में फल आता है।

पोटाश में पौधे में हड़ता और मजबूती का संचार होता है, तसे पौधे में शीत सहन करने की शक्ति आती है। फल भी में सुन्दर बनते हैं।

फुर में फल, फल और भी बनते हैं। फल अत्यन्त स्वादिष्ट ता है और पकता भी जल्दी है। उपरोक्त तीन तत्व के अभाव पौधा न तो खुद बढ़ेगा, न फल ही अच्छा देगा। इसलिए इन नों तत्व को भूमि के अन्दर बनाये रखने के लिये ही खाद देनी होती है। खाद जमीन के अन्दर इन तत्वों की कमी को पूरा र देता है।

छोटे पौधों को खाद देने का अभिप्राय

साधारणतः छोटे पौधों को माली उस समय तक खाद नहीं ता, जब तक कि वे फल न देने लगे। यदि भूमि खर्रा हुई तो त्र साल तक पौधा खुराक प्राप्त करने के बाद भी भूमि को नर्यल नहीं बना सकता। ऐसी दशा में जब पौधा फल लाने लगे, ते खाद का उपयोग करना चाहिये। यदि खर्रा भूमि में लगाये गये पौधों को भी खाद दिया जाये तो बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। छोटे पौधों के लिए भी खाद उतना ही जरूरी है, जितना बड़े पौधों को, भूमि पाड़े कैसी भी हो।

यदि भूमि कमजोर होगी तो पौधा शुरु से ही खाद न मिलने से कमजोर रहेगा। ऐसी दशा में खाद इस प्रकार दिया जाना चाहिये तितसे पौधा पुष्ट होकर बढ़े।

पौधे के पत्ते और शाखाएँ इत्यादि नष्ट न होना चाहिये। पत्ते हरे, हल्के हरे पड़ना छोड़े पत्तों के तिर गन्ने के पत्ते निभा, मोड़ियन माड्डे के आदि का उपयोग किया जाता है। पत्तों का स्वभाव रक्त रंग का चाहिए कि ऐसे पत्तों को हरे दिये जायें, जबकि पौधे शाखाओं को हना प्रारंभ करें। इस परवरी और दुबारा मान में आता है। इससे पौधा बलवत् शक्तिशाली, पुष्ट और मजबूत बन जाता है।

फलदार पौधों को खाद देने का अभिप्राय

भूमि पादे खरा हो या निर्याल, प्लुषा हो या दुम-पाले पौधों को प्रति वर्ष खाद देना ही चाहिए। ऐसा ही निम्नांकित लाभ होते हैं।

१—पौधा स्वस्थ और मजबूत होता है। नियमित बढ़ता रहेगा।

२—फल सर्वदा एक-मे लाता रहेगा। किसी साल कम न होंगे।

३—फल मोटा, स्वस्थ और रंग सुन्दर आयेगा।

४—जमीन में तरी बनी रहती है।

उपरोक्त लाभों को देखते हुए यह कहना अनुचित न हो खाद के बिना फलों की खेती करना गृथा है। जिस भूमि में रहित पौधे जीवित रह सकें, उसमें भी खाद अवश्य दिया चाहिये, जिससे फल अधिक, मोटे और उत्तम पैदा हों।

खाद दो प्रकार का होता है—सजीव खाद और निर्जीव । हमारे देश में अधिकतर सजीव खाद का ही उपयोग किया है और जहाँ तक संभव हो, इन्हीं खादों का उपयोग करना चाहिये । नीचे हम दोनों प्रकार के खादों का विस्तार पूर्वक न करते हैं ।

सजीव खाद

नव्रजन-प्रधान—जिनमें सूर तथा पोटाश की मात्रा से नव्र-
की मात्रा अधिक हो ।

(१) गोबर का रस (जिसमें पशुओं का मल-मूत्र और
उत्ता के घास-पात का मिश्रण होता है ।

(२) मनुष्यों का मल-मूत्र ।

(३) पत्तियों की विट्टा ।

(४) ग्वली का खाद ।

(५) हरा खाद ।

(६) सूखे और हरे पत्तों का खाद ।

(७) काम्पोस्ट ।

(८) शहर के फूड़े-करकट का खाद ।

(९) शहर की मोरियों का पानी ।

स्फुर-प्रधान—जिनमें नव्रजन और पोटाश से सूर की मात्रा
अधिक हो ।

(१) हड्डियों का खाद ।

(२) मछलियों का खाद ।

(३) पक्षियों की विष्ठा ।

पोटाश-प्रधान—जिनमें स्फुर और नत्रजन की मात्रा पोटाश अधिक हो ।

(१) मामुद्रिक जंगल या नदी, नाले और खाली बंधे घाला सेवार ।

निर्जीव खाद

नत्रजन-प्रधान—जिनसे केवल नत्रजन की ही पूर्ति हो ।

(१) सोडियम नाइट्रेट १५ प्रतिशत नत्रजन

(२) एमोनिया सल्फेट २० " "

(३) एमोनियम क्लोराइड २५ " "

(४) सायना माइड २० " "

(५) कलशियम नाइट्रेट १३ से १६ " "

स्फुर-प्रधान—जिनसे केवल स्फुर की ही पूर्ति हो ।

(१) सुपर फास्फेट २० से ४० प्रतिशत स्फुर

(२) बेसिक स्लैग १६ से १८ " "

पोटाश-प्रधान—जिनसे केवल पोटाश की ही पूर्ति हो ।

(१) पोटेशियम सल्फेट ६० से ८८ प्रतिशत पोटाश

(२) पोटेशियम क्लोराइड ४० से ५० " "

नत्रजन और स्फुर मिश्रित

(१) एमोनिया १३ प्रतिशत नत्रजन, ४८ प्रतिशत स्फुर

(२) डाइनामामाइट २१ " " ४५ " "

(३) ल्यूनी काम २० प्रतिशत नम्रजन, २० प्रति० स्फुर

(४) नाटमी कास नं० १ १४ " " ४५ " "

" नं० २ १८ " " १८ " "

नम्रजन और पोटाश मिश्रित

(१) पोटेशियम नाइट्रेट १४ प्रति० नम्रजन, ४८ प्रति० पोटाश

स्फुर और पोटाश मिश्रित

(१) राग २ प्रति० स्फुर, ४ से ६ प्रति० पोटाश

नम्रजन, स्फुर और पोटाश मिश्रित

प्रति० नम्रजन प्रति० स्फुर प्रति० पोटाश

(१) नाइट्रोकोरका १४ १४ २०

(२) स्फुर की मिट्टी

(३) सालाद, कुँए आदि की मिट्टी ।

नम्रजन-पूर्ता सर्जीव खाद

(१) गोबर का खाद—

इस खाद में न केवल गोबर ही, प्रत्युत बट सव चीजें मिली होती हैं जो पशुशाला साफ करने पर स्वाभाविक रूप से गोबर साथ मिल जाती हैं । इसमें पशु का मल-मूत्र से होता ही है, तब से यह घास-घान भी मिला हुआ होता है जो इनके नीचे पड़ाया जाता है अथवा चारे के रूप में दिया जाता है । क्योंकि सब चीजें, नपाई करने समय एक साथ ही मिला ही जाते हैं, इसलिए इसमें प्रत्युत मिश्रित है इसका उपयोग खाद के रूप में

करने आ रहे हैं। भली प्रकार सड़ा हुआ गोबर का हारा
सर्वोत्तम खाद माना गया है। इससे पौधों की खाद्य तत्वों
के अलावा भूमि की दूध भूमि सुधरती है।

पशुओं के खाद्य पदार्थ में बड़ी संख्या में बीज होती हैं जो
बार जमीन से पैदा होने के कारण नवजन, मुर तथा पेंत
आदि आवश्यक तत्व भूमि से सोख चुके होते हैं। अतः
पत्ते, चारा और तरकारी आदि ही पशुओं को खिलाये
हैं। इनका थोड़ा-सा अंश पशुओं के अन्दर रह जाता है,
उन्हें पुष्ट बनाये रखने का काम आता है—बाकी जो बचता है
वह गोबर बन कर खाद का काम देता है। अतएव जो तत्व
चारा आदि के रूप में भूमि में प्राप्त होते हैं, वही सबेरे
के द्वारा पौधों को मिल जाते हैं।

गोबर के खाद का थोड़ा-बहुत गुण पशुओं की जाति
उनके भोजन पर निर्भर है। गाय घेड़ की अपेक्षा भेड़-बकरी
खाद विशेष लाभदायक होता है। घोड़े की लीद मटिया
के लिए अच्छी होती है। गिरा भूसा खाने वाले पशुओं के
लिए, जिन पशुओं को दाना भी दिया जाता है, उनका खाद
अच्छा होता है। इनके निषाण मग में पान-पान के निषाण
तथा कण्डे रखे जाने की रीति का भी उद्योग-शक्ति पर
पड़ता है। जिग खाद में कम पान-पान होता है और जो
की तेजी और बर्षों के जल में पान कर रहता होता होगा,
खाद (कोई खादों में) होगा। इससे खाद मग में पान-पान

पशुओं का ध्यान रखते हुए रखीदना चाहिए। निज के पशुओं का तो खाद रक्खा जाये, उसे भी अन्य प्रकार की न हो तो फूँस की झाया में रखना चाहिए। गोबर इकट्ठा करने का जो गढ़ा हो उसकी फर्श को मोरम में पिटवा देना चाहिए। ताकि नीचे की मिट्टी खाद के हलन-शील पदार्थों को सोख न जाये। दो जोड़ी बेल के खाद के लिए $८ \times ८ \times ४$ फीट का गढ़ा काफी होता है। बहुतों यह देखा जाता है कि गोबर तो खाद की ढेरी तक पहुँच जाता है, परन्तु मूत्र वहाँ तक न पहुँच कर बीच में ही नष्ट हो जाता है। गोबर की अपेक्षा मूत्र अधिक उपयोगी है। इसलिए पशुशालाओं की फर्श पर मिट्टी बिछा कर उसमें मूत्र सोखा दिया जाए, तो ठीक होगा। घरसात में मिट्टी ढालने से वह गीली हो जाती है और पशुओं को घड़ा कष्ट होता है, इसलिए उन दिनों में घास-पात बिछाना ठीक होगा, ताकि मूत्र उसमें जग्न हो जाये और गोबर के साथ मिल कर अच्छा खाद बन जाये।

गोबर का खाद फलों के वृक्षों को कितना दिया जाये

प्रारम्भ में जब पौधे लगाये जाते हैं और तरकारियाँ भी ली जाती हैं कम दस टाई सौ से तीन सौ मन खाद प्रति एकड़ देना चाहिए। बाद में जब तक तरकारियाँ ली जायें, दो सौ से दस सौ मन प्रति वर्ष देना ठीक होगा। यदि फलीदार तरकारियाँ ली जायें तो उनके लिए कम खाद देना चाहिये। जिन गरी में पौधे

लगायें जायें उनकी मिट्टी में भी गोबर का खाद देना चाहिये। सो गद्दी के आकार तथा पौधों की जाति के अनुसार खाद में लेकर एक मन प्रति गद्दा देना चाहिए। बाद में काट-वृक्ष प्रतिवर्ष भी खाद दिया जाना चाहिए। उस वृक्ष की उपयोगिता और आकार के अनुसार दिया जाना चाहिए। प्रकरण के अन्त में दी हुई रीति से जमीन का अनुमान उस पर लगभग एक ईंच मोटा तह हो जाए, इतना खाद दिये। आगे जहाँ-जहाँ काट-छाँट के बाद खाद देने होगा वहाँ मात्रा नहीं दी जायेगी। उपर्युक्त रीति से खाद डालना चाहिये।

(२) मनुष्यों का मल-मूत्र—

इस खाद का उपयोग तरकारी और अन्य फसलों किया जाता है, फलों के लिए नहीं किया जाता। परन्तु या मिट्टी के साथ मिला कर सुखा करके जो पदार्थ नाम से बिकता है, मिलता हो तो डाला जा सकता है। के खाद से आधी मात्रा में इसको डाला जाना चाहिए।

(३) पक्षियों की विष्ठा का खाद—

पक्षियों की विष्ठा में, सूख जाने पर, लगभग ४ श जन, २.३ शतांश स्फुर तथा १.२ शतांश पोटाश रहता है। यह खाद पशुओं के खाद से अधिक उत्तम रहता है। यदि हमें दी सूखने दिया जाये तो उसमें से खाद के जाते हैं। इसलिए उसके साथ राख या मिट्टी मिलाकर

रहता है। ऐसा खाद बहुत कम मिलता है। परन्तु यदि
ने का प्रबंध हो सके तो उसको गोबर के खाद के साथ मिला
ढाल सकते हैं।

चमगादड़ की विष्टा अन्य पक्षियों की विष्टा से अधिक नेत्र-
रक्षती है। इसमें २ शतांश नम्रजन, ३.२ शतांश स्फुर, और
१ शतांश पोटाश रहता है। यदि उपलब्ध हो सके तो उसको भी
जों में गोबर के खाद के साथ मिला कर ढालें।

(४) खलियों का खाद—

खलियां दो प्रकार की होती हैं, एक वह जो पशुओं को
लाई जाती हैं और दूसरी वह जो जड़गीली होने के कारण
लाई नहीं जा सकती। भागतवर्ष में निम्नलिखित खलियां पाई
ती हैं, जिनका उपयोग किया जा सकता है। साधारण खलियों
खाद के तत्व इस प्रकार इस परिमाण में होते हैं। देखिये नीचे
नक्शा, जो प्रतिशत के हिसाब से दिया गया है।

ट्रैक्टर और खेती अथवा ट्रैक्टर गाइड

लेखक—कृष्णानन्द शर्मा M. A. (M. B. S.)

हिन्दुस्तान में ट्रैक्टर का प्रयोग थोड़ा २ शुरू हुआ है। किंतु
म थोड़े से समय में ही यह बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। इससे
हां समय की और पैसे की बचत होती है, वहां बंजर जमीन
जे जोतना भी इसी का काम है। किन्तु हमारे किसान भाई
सके कल पुर्जों से धार्मिक न होने के कारण परेशान हैं, दस
रुखत को नजर में रखते हुए भारत के कोने २ में बोली और
लेखी जानेवाली हिंदी भाषा तथा नागरी लिपी में हमने यह पुस्तक
हिंदी योग्य व्यक्ति से लिखावाई है। मू० ७)४० डाक मर्च ॥॥॥
पता—देहली पुस्तक भण्डार, चावड़ी बाजार, देहली ६

नाम खली	शतांश नत्रजन	शतांश स्फुर	शतांश सु
असली	५.०	१.६	१.६
कुसुम	५.८	१.३	१.२
तिल	५.०	१.१	१.०
नारियल	३.७	१.६	१.८
बिनौला (छिलका सहित)	२.६	१.२	१.१
मूंगफली	५.६	२.३	२.२
रामतिल्ली	४.५	२.०	१.६
मरसों	५.६	१.६	१.४

उपयुक्त खलियां पशुओं को खिलाई जा सकती हैं। परन्तु निम्नलिखित खलियां विषयुक्त होने के कारण खिलाई नहीं जा सकती। परन्तु खाद के लिये इनका उपयोग किया जा सकता है।

रंढी (Castor)	५.०	शतांश नत्रजन, १.८	शतांश स्फुर, १.६	शतांश सु, १.६
करंज	३.५	" ०.७	" १.३	" १.२
नीम	४.४	" १.०	" १.४	" १.३
महुआ	२.६	" ०.८	" २.८	" २.८

गुली मढ़ाने की रीति

१०० भाग गुली, २४ भाग मिट्टी ४ भाग गंधक और ६ भाग जल का घोल घन कर दिया जाता है। यह पड़ा रहने दे। देरी को पर से दफ़ा कर दे। १०० भाग अधिक पानी रहने न पारे। कभी-कभी १०-१५ दिन १ पानी भी ऊपर से छिड़कना चाहिए।

गुलियों के ग्याद में गुर और पोटाश भी कुछ पामाण में रहने हैं, परन्तु इनका प्रयोग नग्नजन-प्राप्ति के विचार में ही किया जाता है। फलों के पेड़ों के लिए गुलियां घंसे भी दी जा सकती हैं, परन्तु छोटे पौधों के लिए सड़ा पर देना ही अच्छा है। फल छतारने के समय भी इनको दिया जाता है।

मात्रा—चूंकि गुलियां में नग्नजन की मात्रा थोड़ी-बहुत अवश्य होती है, इसलिये मात्रा का अनुमान नग्नजन की गणना पर ही करना चाहिए। प्रति एकड़ वृक्षों की उपयोगितानुसार २० सेर से ३० सेर नग्नजन पहुंचे इतना ग्याद देना चाहिए। नग्नजन की मात्रा में गुली का अनुमान करके उसमें रखी पेड़ प्रति एकड़ का भाग दे दिया जाए तो प्रति पेड़ कितनी गुली देनी चाहिए, यह बात मालूम हो जायेगी।

(५) दूरा खाद—खेती में किमी फसल को छोड़कर, उसके हो जाने के पदचान, दूरी ही गाड़ दी जाये, तो उसे दूरा ग्याद कहते हैं। इनके लिए फलीदार फसलें ही अधिकतर काम में लाई जाती हैं। उनमें भी बगदा पत्ते, कोमल बरही और उल्ही बढ़ने वाली

फलें अधिक उपयोगी होती हैं। यह गुण ग्यार, डेढ़वा, लुआदि फसलों में पाया जाता है। जहाँ खाद का बहुत अभाव हो और वृष्टि भी ३०-४० इंच तक होती हों, वहाँ मन का छत अच्छा रहता है। इससे भी अधिक वाली जगह में देड़वा और कम वाली में ग्यार की फसल ठीक हांगी। पेड़ों के बीच वाली जमीन में, या पेड़ लगाने से पहले ही समूचे खेत में ये फसलें लगाई जा सकती हैं। यदि छोटे पौधों के साथ लगाई जायें तो यह देखना चाहिये कि उन पौधों के आस-पास लगभग तीन-तीन फीट की दूरी तक इनके पौधे न हों। निकट होने से पौधा निषा और पीला पड़ जाता है, क्योंकि उसे रोशनी और हवा भले प्रकार मिलनी चन्द हो जाती है।

मात्रा—वर्षा ऋतु के आरम्भ में लगा कर जब तीन-चौथा भरसात का मौसम बीत जाये, तो जितनी फसल पैदा हो पाये, उसे खादिए। यह खाद हो जायेगा।

(६) सुखे या हरं पत्तों का खाद—पागीचों में मर्दी आने पर बहुत-से पेड़ों के पत्ते गड़ जाते हैं और प्रायः सभी पेड़ों के पत्ते न सुखे, गड़ते ही रहते हैं। जिन्हें लोग आम तौर पर जला देते हैं। इन पत्तों को न जला कर यदि इन्हीं का खाद बन लिया जाये तो बड़ा उपयोगी रहता है। इन पत्तों को इकट्ठा करके एक षट्ठे-से गढ़े में डलवाते रहना चाहिये। जब कारी पत्ते जमा हो जायें तो उन पर मिट्टी डलवा कर पानी छिड़कना दो-तीन दिनों बाद सब जगह पर बड़ा उपयोगी खाद तैयार हो जाना

यह खाद गोबर के खाद से भी जल्दी लाभ पहुँचाने वाला है इसलिये गिरि हुए अथवा पाट-छाँट द्वारा प्राप्त पत्तों का खरहर बनाना चाहिये।

सूत्रा—गिरि मिले सके हुए पत्तों के खाद गोबर के खाद के दर दी देना चाहिये।

(७) **कम्पोस्ट Compost** निरार के समय चिन्तों में निपाने। घास-घात, फसलों की मृदियाँ, भूसा, तर-मूँगे पत्ते और पाट-छाँट द्वारा प्राप्त की हुई कोमल टहनियाँ इत्यादि को एक ढाँच में मिला कर जो खाद तैयार किया जाता है, उसे 'कम्पोस्ट' कहते हैं। क्योंकि बागीचों में पृष्ठों के पत्ते काफी आसानी से नीचे गिरते रहते हैं और पाट-छाँट द्वारा भी काफी टहनियाँ और पत्ते आदि निकलते रहते हैं, साथ ही निरार द्वारा भी घास-घात का ही निकलता रहता है। इसलिये 'कम्पोस्ट' द्वारा इसका खाद बना लिया जाता है।

कम्पोस्ट बनाने की रीति

बागीचों में जिन चीजों में कम्पोस्ट बन सकता है, वे प्रायः दो प्रकार की होती हैं, एक वे जो जल्दी सड़ जायें, जैसे हरे और मूँगे पत्ते, खेतों का घास-घात, अथवा शाक-भाजी के पत्ते इत्यादि दूसरे वे जो हरे किन्तु कठोर हों और बिलम्ब से सड़ें; जैसे पाट-छाँट से निकली हुई कोमल टहनियाँ। कम्पोस्ट बनाने के समय जहाँ तक हो, दोनों प्रकार की वस्तुओं को बराबर भाग में मिला कर काम में लाना चाहिये। ऐसे मिश्रण को बरसात में

गमनाय भूमि पर ढेरी के रूप में बना कर सड़ा मचने दें। र गमों के दिनों में गदों में रखना चाहिए ताकि सड़ने के पानी कम देना पड़े।

सड़ते हुए ग्याद में एक तो वैसे ही गमों के दिनों में स्व भूमि पर रक्खा जाये तो बाहर की गमी और हवा से जल्दी-जल्दी पानी बढ़ ताजा है और ग्याद ठीक से नहीं पाता।

काम्पोस्ट समतल भूमि पर बनाया जाये या गढ़े में बना आर सठ-आठ फीट चौड़ा और दस-तीन फीट ऊँचा होना चाहिए।

बनाने समय मिश्रण के वजन प्रमाण से करीब ५ शतांश गोबर तथा १० शतांश मिट्टी पानी में घोल कर खाद में मिलाने चाहिए और आवश्यकतानुसार पानी छिड़कते रहना चाहिए। गोबर और मिट्टी मिलाने से खाद जल्दी सड़ता है। सड़ते हुए काम्पोस्ट को प्रति मास एक बार उलट-फेर कर देना चाहिए। इस रीति से सड़ाया हुआ काम्पोस्ट ३-४ मास में अच्छा खा बन जाता है।

(८) शहर के कूड़ा-कचरा का खाद—अन्य खादों के अभाव में इस खाद का भी उपयोग किया जा सकता है। इसमें घरों का कूड़ा-कचरा और राख, बर्तनों के टुकड़े, फटे हुए कागज, कपड़े-लुत्ते, सड़कों पर का लीद-गोबर, साग-भाजी के अनुपयोगी पत्ते और कई प्रकार की दुमरी चीजें भी मिलती रहती हैं। प्रारंभ

मे घैमे ही रोनों में बरमान के पहने पचाम साठ गाड़ी प्रति इ के डिमाव मे डाल सकते है । यदि घाद में डालना पड़े तो १ प्रकार मड़ाने के घाद ही डालना ठीक होगा ।

(६) शहर की मोरियों का पानी—फलों के घृतों की गई इस पानी मे को जामके तो अच्छा ही होगा । क्योंकि इस में वे सब तत्त्व पाये जाते हैं जो अन्य खादों में रहते हैं ।

स्फुर-पूर्ता सजीव खाद

(१) हड्डियां—फलों की फसल के लिये हड्डियों का खाद १ ही उपयोगी मिश्र होता है । क्योंकि हड्डियों मे स्फुर की प्रा अधिक रहती है । स्फुर मे जड़ें पुष्ट होती हैं और फल धेरु संख्या मे आते हैं । जो घृत फल न देते हों, अथवा कम हों, उनकी जड़ों मे सड़ाई हुई हड्डियों का मिश्रण दिया जाये, फल आने शुरू हो जाते है । हड्डी को मड़ाने की विधि बहुत सरल है । हड्डी को महीन पीस कर पहले चूर्ण कर लिया ता है, फिर इसमे घालू, गंधक और कोयले का मिश्रण मिला र हड्डियों को सड़ाया जाना है । प्रत्येक वस्तु इतने परिमाण मिलाने चाहियें—हड्डी का चूर्ण ६ भाग, घालू ६ भाग, गंधक ६ भाग, और लकड़ी के कोयलों का चूर्ण एक भाग मिला कर नी से इतना गीला करें कि सब चीजें आपस मे मिल जायें, खुतु इतना पनला न हो कि बहने लगे । प्रायः छः महीने तक भी भांति पड़ा रहने दें । बीच-बीच मे ऊपर से थोड़ा पानी डालते रहना चाहिये, ताकि सूखने न पाये । छः महीने में खाद तैयार हो जायेगी ।

मात्रा—लगाते समय प्रत्येक पौधे के गूदे में दो-दो सेर हड्डी का चूर्ण पहुँचे, इतना पौधों की उपयोगितानुसार चाहिये, और खाद में प्रति वर्ष जब गोबर का खाद दिया जाये उस वक्त भी इसका खाद देना चाहिये। गोबर यदि सौ भाग हो तो उसमें एक भाग हड्डी का चूर्ण मिला देना चाहिये। जहाँ जहाँ कहीं हड्डी मिश्रित खाद का वर्णन हो वहाँ इन्हीं मिश्रण को समझाना चाहिये। जहाँ केवल हड्डी ही देने का जिक्र हो वहाँ ३ से ६ मन तक हड्डी का चूर्ण प्रति एकड़ के हिसाब से देना चाहिये।

(२, मछलियों का खाद—समुद्र के तटवर्ती स्थानों में जहाँ मछलियों का व्यवसाय बहुत होता है, वहाँ सड़ी-गली मछलियों ही फेंक दी जाती हैं। वहाँ से अथवा उन कारखानों से जहाँ मछली का तेल निकाला जाता है, ऐसा खाद मिल जाता है। हड्डी के खाद की भाँति इसका भी उपयोग किया जा सकता है।

(३) पक्षियों की विष्ठा—समुद्र के पक्षी जिस स्थान पर बैठे करते हैं, वहाँ काफी विष्ठा जमा हो जाती है। ऐसी विष्ठा में खाद के तत्त्व काफी मात्रा में पाये जाते हैं। यदि पानी से उत विष्ठा में नमी न आगई हो, तो उसमें नम्रजन और खुर धराधरा मात्रा में पाये जाते हैं। ऐसी विष्ठा में ४-५ शतांश नम्रजन और इतना ही खुर भी रहता है। जहाँ पानी गिरता है वहाँ नम्रजन वाले पदार्थ पुनः बढ़ जाते हैं। इससे खुर का शतांश बढ़ कर सात-आठ शतांश तक हो जाता है। व्यवसायी लोग

रेमो बिप्ला वहां से खोद कर ले आते हैं और किसान लोग उनसे खरीद लेते हैं। यह सब जगह आसानी से नहीं मिल सकती। जहां मिल सके, फाम में ला सकते हैं।

पोटाश-पूर्ता सजीव खाद

समुद्री किनारों के निकट पानी में होने वाले पौधों में लगभग १.५ शतांश पोटाश रहता है। यदि सुगमता से प्राप्त हो सके तो इनका भी उपयोग हो सकता है। कम गहरी नदियों और तालाबों में जो पौधे जम जाते हैं, उन्हें सेवार कहते हैं। इनका उपयोग भी खाद के लिये उत्तम होता है। मुलायम पत्ते वाला सेवार अच्छा होता है। सूखे सेवार में लगभग १ शतांश, नम्र-जन, ०.४ शतांश और २ शतांश पोटाश रहता है।

निर्जीव खाद

इन खादों का उपयोग सजीव की कमी को पूरी करने अथवा साथ-साथ डालना ठीक होगा। अभी भारतवर्ष में ऐसे प्रयोग बहुत नहीं हुए हैं जिनके आधार पर फलों के वृक्षों के लिए निर्जीव खाद की उपयोगिता सिद्ध की जा सके, अथवा उनकी मात्रा का अनुमान ठीक दिया जा सके। ऐसी स्थिति में भारतीय तथा विदेशीय अनुसंधानों के आधार पर विचार किया जाये तो निम्नलिखित मात्राएँ ठीक होंगी। काट-छांट के बाद जब गोबर का खाद दिया जाये तो इसे दिया जाये।

निर्जीव खाद में नम्रजन की पूर्ति के लिए अधिकतर मोडियम नाइट्रेट और एमोनियम सल्फेट का ही उपयोग किया जाता

है। गुपर काग्रेट में गुर की पूर्ति होती है। कुत्र ही
 पृथं जो नीमीकर्म निरता है, नमसे नवजन और सुख
 पूर्ति होगी है। पोटेरियम मरफेट पोटाश की वमी की
 फरता है। हमने फलों का खाद और आकार अच्छा बना
 पोटाश की पूर्ति राग्य द्वारा भी की जा सकती है। जहाँ
 पाजार में खाद-विक्रेता ऐसा मिश्रण भी बेचते हैं जिनमें
 तत्वों की पूर्ति हो जाती है। जहाँ पर खाद की मात्रा उनके
 के रूप में हो जानी है, उनके लिये हम प्रारम्भ में ही साव
 न्यान में लिख आये हैं।

अंगूर, आम, नासपाती, माल्टा, सेव, सन्तरा आदि ऐसे फल
 हैं, जिनसे अच्छी आमदनी होती है। इनके लिये खाद पर कुत्र
 अधिक व्यय किया जा सकता है। ऐसे फलों के लिये बीस से
 स पचवीस सेर नवजन और तीस सेर से पैंतीस सेर तक सु
 प्रति एकड़ पहुंचे इतना खाद देना चाहिये। अमरुद, आड़ू, आलू,
 चुगारा, अंजीर, केला, पपीता आदि के लिये पन्द्रह सेर से बीस
 नवजन और पचवीस सेर से तीस सेर तक सुक्र प्रति एकड़ हो
 रहता है।

यदि राख देनी हो तो प्रति पौधा या पेड़ दो सेर से लेकर
 पाँच सेर तक दे सकते हैं। राख में पोटाश अधिक पाया जाता
 है, इसका उपयोग लाभप्रद है।

चूने का खाद

अम्लदार मिट्टी में जहाँ तरी अधिक हो, चूने का उपयोग
 लाभदायक होता है। यह भारी जमीन को पोली बना देता है
 जिससे पौधे की जड़ें सुगमता से फैल सकें। जमीन में पोटाश

जुना करके चौबे तक पहुंचा देता है। इसके उपयोग के स्थान जुनाई भी आसान हो जाती है। चिकनी जमीन सूखने पर ग्ल हो जाती है, परन्तु चूने का म्याद देने से यह उतनी बटोर ही हो पानी, न इतनी मिथुइनी ही है। सूना धनुआ भूमि को गेड़ देता है और हममें तनी घनाये रखता है। सूना उसमें तेसी तरत पैदा कर देता है, जिसमें नीचे के तल से पानी ऊपर का मेष कर आसानी से आता रहता है।

भूमि में अम्ल का अन्दाजा हम सरह हाथ सकता है कि जमीन में एक गारुटा म्योई। उसमें नीला लिटमस (Litmus paper) धर-उधर दिला दे। यदि अम्ल होगा, तो इस वागज का रंग लाल हो जायेगा। हमें इस प्रकार देखें—

सूना दो छटांक प्रति वर्ग गज के हिस्सा से समान पर लिहें, लेकिन पहले उसे मिट्टी में मिला लें, फिर उपयोग करें। अंगूर, अनाज आदि के निचें सूने का म्याद बहुत लाभदायक होता है। इसे तनी के दिनों में देना पारिये।

फलदार पेड़ों को म्याद देना

जिसकी दूर तक दूरी की शाखाओं का फैलाव होता है, हमें २-२ फीट अर्ध के दूरी तक अर्धवर्तुल जड़ों का फैलाव होता है। इस निचे धड़ से उतनी दूरी तक की जमीन २-३ इंच तक गेड़ कर जलमें म्याद देना पारिये। धड़ के पाँच की दो मीत दूरी जमीन गेड़ कर जल पर म्याद देने की दूरी हमें निचें में मीत अर्ध मिला दे। म्याद देने की दूरी रूढ़ि मयोजक है।

प्रकरण ५

फलों के शत्रु और उनसे बचाव

फलों के शत्रुओं को दो भागों में बाँटा जा सकता है वे जो पेड़ों को अंगहीन कर देते हैं, उन्हें अस्वस्थ कर मार ही डालते हैं। दूसरे वे जो प्रकट रूपसे फल नष्ट कराते हैं।

इन शत्रुओं में कुछ ऐसे भी हैं। जो बिना अनुवीक्षा के देखे ही नहीं जा सकते। परन्तु अधिकांश को हम स्पष्ट देख सकते हैं। इनमें घातक वनस्पति या शत्रु-पौधे (Parasites), मनुष्य, पशु-पक्षी या दूसरे जानवर और कीटाणु आदि।

घातक पौधे (Parasites)

फलों के पेड़ों को हानि पहुँचाने वाले विशेषतः दो घातक पौधे देखने में आते हैं। अर्थात्—एक (Dodder) और दूसरा बाँझी (Loranthus)।

अमरबेल—यह एक बहुत ही छोटे पत्तों वाली ध्यात से देखने पर पत्ते दिखाई देते हैं, धरना धनीर पत्ती ही दिखाई देती है) पीले रंग की सूत जैसी लता होती है। यदि पेड़ों पर लग जाये तो कुछ दिनों में उन्हें मुरादा दे यदि किसी प्रकार एक भी इस लता का


इ पर गिर जाता है तो वहीं उसमें से जड़ों के जैसे महीन
 रेशुर फूट कर टहनियों में घुस जाते हैं और पौधे या पेड़ का
 उस घुस कर अपना पोषण और वृद्धि करती है। थोड़े ही दिनों
 में यह इतनी फैल जाती है कि सम्पूर्ण पृष्ठ को ही अच्छादित
 कर लेती है और कुछ दिनों बाद वह नष्ट हो जाता है।

इससे बचाने का साधारण उपाय यह है कि जहाँ कहीं यह
 नजर आवे, वहाँ उसको तुरन्त नष्ट कर दिया जावे। जिस ढाली
 पर इसकी जड़ चिपकने का संदेह हो, उसको कटवा ढालना
 चाहिये। यदि हो सके तो बागीचे के आस-पास के जंगली पेड़ों
 पर भी दृष्टि देने चाहिये, ताकि इनके फैलने का भय न रहे।

अमरपेल पत्तों के पेड़ों में नीचू और फरोन्द पर विशेष
 देखने में आती है।

पौंभी (*Loranthus*)—यह एक प्रकार का हरे पत्ते वाला
 लाल फूल का पौधा होता है, जो आम, शरीरक इत्यादि पेड़ों पर
 जम जाता है और उनसे रस चूसकर अपना पोषण करता है।
 इससे बीज बहुत पक्षियों द्वारा एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक पहुँचा
 दिये जाते हैं। बीज चूँकि चिपकने होते हैं, नये पेड़ पर चिपक
 कर रह जाते हैं और अनुकूल वातावरण तथा सही पावर दीजने
 से पौधे बन जाते हैं। यदि प्रारंभ में ही इसका ध्यान न रखा जावे
 तो कुछ दिनों में सारे पेड़ पर पौंभी नजर आने लगती है।

इससे बचाने का उपाय यह है कि जहाँ कहीं पेड़ों पर यह
 पौधा नजर आवे उसे वहाँ से तुरन्त हटवा देना चाहिये और



तो लगा दी जाये और कुण्डल की पकड़ के लिए करीब एक थ लम्बा लकड़ी का दस्ता लगा दिया जाता है। उड़ती हुई तली, भैंवरे आदि को पकड़ने के लिए थैली को मटके से उनकी ओर बढ़ाना चाहिए, जिसमें हवा से थैली अपने आप ही फूल जाये। कीट तेजी से उसके अन्दर घुसेंगे। बस जब कीट फाकी ख्या में उसके अन्दर घुम चुकें तो हाथ को इस भाँति घुमावें कि थैली का मुँह बंद हो जाये और कीटाणु बाहर न निकल सकें। इनको जला कर मार डाला जाये।

(२) अन्य उपाय—घड़-छेदक कीट गोबरौले की जाति के होते हैं। ये घृहों के घड़ या शाय्याओं में छेद करते रहते हैं। छि या गर्म लोहे के तार को छेद में डाल कर कीटों को मार डालना चाहिए। यदि कीटा छेद से नीचे की ओर जाता है तो घड़ का मुँह साफ करके उसमें अलकतरा गर्म-गर्म डाल देना चाहिये। छेद से ऊपर की ओर हो तो क्लोरोफार्म और क्रिया-जोड़ को बराबर भाग में मिला कर उसमें रस्स तार करलें। फिर उसे छेद में डाल कर छेद का मुँह बन्द कर दें। इस मिश्रण की गैस ऊपर जाकर कीट को मार देती है।

(३) विष प्रयोग—विष दो प्रकार के होते हैं—एक अन्तरिक्ष, यानी जिनके खाने से कीट मर जायें और दूसरे स्पर्शक, अर्थात् ये विष जो यदि कीट के बदन पर लग जायें तो कीट औरन ही मर जायें।

खान-पान की रीति के अनुसार कीट दो प्रकार के होते हैं। एक घड़क और दूसरे घूरक। इस कारण से घड़क पर अन्तरिक्ष

लिये जायें अथवा धूप में सूख कर मर जायें, (४) पौधे की बीज खरीदते समय कीड़े लगे हुए कदापि न खरीदे जायें। (५) पेड़ों को आवश्यकतानुसार खाद और जल दिया जाये, ताकि वे स्वस्थ बने रहें। क्योंकि स्वस्थ पौधों पर कीटाणु का आक्रमण शीघ्र नहीं होता। (६) काट-छाँट के पश्चात् पेड़ के कटे हुए मार्गों पर तारकोल लगा देना जरूरी है, क्योंकि शर्दा का काट फुड़ कोमल होने के कारण कीटाणु के आक्रमण करने का प्रारंभ रहता है। (७) आक्रमण यदि हो भी जाये तो तत्काल कीड़े को चुनवा कर, काट-छाँट अथवा अन्य प्रकार के उपचार विधि प्रयोग से उनका नाश कर देना चाहिये, ताकि उनकी वृद्धि रुक जाये।

कीटनाशक उपचार और विधि—(१) हाथ से चुनवाकर मिट्टी में गड़वा देना या मिट्टी के तेल और पानी के मिश्रण में डुबो देना अथवा आग में जला देना ये साधारण उपचार हैं। जो कीट पौधे या पेड़ों पर दिखलाई दें और उड़ने की शक्ति न पहुँचे हों और संख्या भी अधिक न हो, तो चुनवा सकते हैं। फुड़कने और उड़ने वाले हानि कर्ता कीट कपड़े मढ़े-मढ़े धैले बनाकर पकड़े जा सकते हैं। संतरे और नीयू छोटे पौधों पर जो तितलियाँ अण्डे दे जाती हैं उन्हें पकड़ने लिये ऐसी मैलियाँ अच्छा काम करती हैं। इन्हें कोई भी कृषक अपने हाथ से बना सकता है। एक ८-१० इंच व्यास के घंटे लोहे के घेरे में महीन या जालीदार पपड़े की एक हाथ गद्

स्पर्शक बिप—इनमें मूछ आयल इमनदान (Crude-oil emulsion) एक उत्तम बिप है। यह मिट्टी के तेल और सामुन र्ना द्रव्य होता है। एक मन पानी में एक सेर दवाई घोलकर र द्वारा छिड़का जाता है।

शाम के मौर (फून) में जो कीट (Jassids) लग जाते उनके लिये फिश-आयल-रोजिन सोप (Fish-oil-rosin-sop) का छिड़काव बहुत अच्छा रहता है। एक मन पानी में सेर औषधि घोलनी चाहिए।

स्पर्शक बिप में मिट्टी का तेल भी काफी अच्छा रहता है। कीट प्रकार से आशुष्ट होकर जमा हो जाते हैं उनको आसानी से के द्वारा मारा जा सकता है। फलों के पेड़ों पर मिट्टी के के टीन जिनमें थोड़ा पानी और थोड़ा मिट्टी का तेल हो, दिये जायें और उन पर लालटेन या कोई दूसरी चीज जला टांग दी जाये, तो कीट उससे खिंचे चले पायेंगे और पानी गिर कर मर जायेंगे।

कीट का जीवन-चरित्र—कीट की पहचान के लिए का जीवन रहस्य जानना बहुत जरूरी है। स्थानाभाव के एण यहाँ विस्तार में न जाकर संक्षिप्त रूप में कुछ वर्णन रा जाता है, ताकि फलों की खेती करने वाले हानि पहुंचाने ते कीट को पहचान कर उन्हें ठीक समय पर नष्ट कर सकें।

कीट अण्डे से पैदा होने वाला जीव है और अपनी जीवन गली के अनुसार दो भागों में विभाजित किया जा सकता है एक

और चूपक पर उपरोक्त विष का अन्ध्रा प्रयोग होता है। अन्य विष में चूपक कीट नहीं मारे जा सकते, क्योंकि अन्य विष तो पौधों के अंग पर ही रह जाता है और वे ही अपने गुँह की नज़रों की पत्तियों के अन्दर डाल कर रस चूने हैं।

आन्तरिक विष—लेड आर्सेनेट (Lead arsenate) रशीरा और मैन्थिया का बना हुआ लवण होता है। एक मन पानी में दो-दो छटांक दवा का घोल बनाना चाहिए। यह छिड़कने के यन्त्र (Sprayer) द्वारा छिड़का जाता है। उसी तरह से लेड मोमेट का भी उपयोग किया जाता है।

फलों की मक्खियों को मारने के लिए एक मन पानी में तीसरे गुँह और पाँच भर लेड आर्सेनेट (Lead arsenate) का घोल बना कर पड़ों पर या लकड़ी या टीन के तख्तों पर लगा कर पड़ों पर जगह-जगह बाँध देते हैं। मक्खियाँ आकर इस पर जमा हो जाती हैं और खाते ही मर जाती हैं।

उपरोक्त तीनों प्रकार के विष का प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए। क्योंकि ये बड़े जहरीले होते हैं। कृषि-विभाग द्वारा ही ये प्रयोग होने चाहियें। नर्सरी के पौधों पर छिड़कने के लिए तम्बाकू का काढ़ा भी उत्तम प्रयोग है। एक सेर तम्बाकू दस सेर पानी में दिन रात भिगोकर अथवा आधे घण्टे तक पानी में लबाल कर जो काढ़ा बनाया जाये उसमें ६ भाग आँर जल मिला कर काम में लाया जा सकता है। मिट्टी के तेल में भीगी हुई राख भी छिड़क सकते हैं। परन्तु ये छोटे पौधों पर ही छिड़की जा सकती हैं, बड़ों पर नहीं।

का अन्त कपड़े की जाली बना कर या आन्तरिक बिप प्रयोग द्वारा किया जाये ।

तितलियों की जाति के कीट—इस जाति के जो कीट दिन में बाहर आते हैं उन्हें तितलियाँ (Butterflies) कहते हैं और जो रात्री में बाहर आते हैं उन्हें पतंग (Moths) कहते हैं । तितली या पतंग दोनों ही में नर-मादा के मेल के पश्चात् मादा पौधों के निकट, जमीन में पौधों पर या पेड़ों पर अण्डे दे देती है, जिनसे बाज़-कीट निकल कर अपना खाना शुरू कर देते हैं और पूर्ण दाढ़ पाने पर पेड़ के ऊपर या जमीन में कोप खनना कर स्थान्तर करते हैं । तरुण कीट यों विशेष हानि नहीं पहुँचाते, क्योंकि वे बहुधा फूलों के रस पर निर्वाह करते हैं, परन्तु अण्डे देकर वंश-वृद्धि अवश्य करते हैं ।

इनको नष्ट करने का यह उपाय है कि यदि कम संख्या में हों तो बाल कीट चुनवाये जा सकते हैं । अधिक संख्या में हों तो पम्प द्वारा आन्तरिक बिप छिड़काया जा सकता है । रोशनी की ओर आकृष्ट करके (टीन में मिट्टी का तेल और पानी डाल कर) मारे जा सकते हैं । कपड़े की जाली में पकड़ कर भी मारे जा सकते हैं ।

गोबरजीले की जाति वाले कीट (Beetles)—इस जाति के कीट की मादा पेशों पर छूट्टे-ककट में अण्डे देती है । अण्डों से बाज़-कीट निकल कर अपना खाने का काम शुरू कर देता है और पूर्ण दाढ़ पाने पर पेड़ में या दूसरे निश्चल पर जमीन में स्थान्तर

धर्म में तरुण कीट का रूप बाल कीट से विस्तृत निराला है। तिरफे रूप की नयी बदलाव, बलिक किसी-किसी जगह खानपान की रीति भी बदल जाती है। भक्षक बाल कीट का अवस्था में घुपक हो जाते हैं। बाल कीट सम्ये-लम्बे (Caterpillars) होते हैं। किसी-किसी की देह पर रों-हुआ करते हैं। इनमें से कुछ के पाँव नहीं होते और कुछ बहुत-से पाँव होते हैं। पूर्ण बाढ़ पाने पर अपने ऊपर एक झिल्ल बनाकर कुछ दिनों तक बिना खान-पान उसमें रह सकते हैं। इनमें इनके पंख भी आ जाते हैं। मिल्ली फटने पर पंख वाले कीट उड़ने लगते हैं।

जिन कीट का रूपान्तर नहीं होता उनके बाल-कीट के रूप में विशेष भेद नहीं होता। आकार बढ़ जाता है और खान-पान की रीति वंसी ही बनी रहती है।

भक्षक कीट जो आन्तरिक विष से मारे जा सकते हैं वनमें टिड्डे, तितलियों की जाति के बाल कीट (Caterpillars), गोदरीले (Beetles), दीमक (White-ants) और फलों की मक्खियाँ सम्मिलित हैं।

टिड्डे (Grass-hoppers, Crickets Locusts) — ये पौधों के कोमल और टरे पत्ते खाते हैं। इनके पंखों में दिये जाते हैं। घाल्यावस्था से लेकर तरुणावस्था तक ये हानि पहुँचाते रहते हैं। इनसे अधिकतर नर्सरी के पौधों को हानि पहुँचती है। जुलाई फरवरी —

हैं जला देना चाहिए। आन्तरिक विष पर आकर्षित करके नुका नारा किया जा सकता है।

चूपक कीट—ये स्पर्शक विष से मारे जाते हैं। इनमें अधि-
तर खटमल की जाति के होते हैं। इनके अण्डे बहुधा पत्ते और
ये कोपल पर दिये जाते हैं, जिनमें से तरुण कीट निकल कर
हों का रस चूसते रहते हैं। जिनके पंख नहीं आते वे पत्तों पर
गिरे २ घूम कर रस चूमते हैं और जिनके पंख आ जाते हैं वे
एक स्थान से उड़ कर दूसरे स्थान पर पहुँच जाते हैं। इनके मुँह
बली के रूप के होते हैं।

मुख्य फलों को हानि पहुंचाने वाले कीट

अंगूर—इसमें पतंग की जाति का एक कीट लग जाता है,
जो पत्ते ही अधिकतर खाता है। बाल-कीट हरे रंग का होता है
और पूरी चाद पाने पर करीब डेढ़-दो इंच लम्बा छोटी उंगली
जितना मोटा होता है। इसकी दुम पर सींग जैसा एक अंग
निकला रहता है। यह कीट भूमि में अपना कोष बनाता है।
तरुण कीट भूरे रंग का करीब एक इंच लम्बा पतंग होता है।
जब पत्ते कटे हुए-से दिखाई दें, तब इसे लता पर दुँटवा कर
मारवा देना चाहिये।

गोबरौले कीट की जाति का एक छोटा-सा कीट भी पत्तों को
बहुत हानि पहुंचाता है। यह पत्तों में छोटे-छोटे बहुत से छेद कर
देता है। काट-छांट के पशुपान् यदि केले के सूखे पत्ते लताओं
पर रख दिये जायें तो ये कीट उन पत्तों पर चढ़ जाते हैं, जिन्हें

करता है। तरुण कीट कोमल पत्ते और फूलों की पंखड़ियाँ खाते हैं। इन्हें भी उपर्युक्त रीति से नष्ट किया जा सकता है।

दीमक (White-ants)—इनका जीवन घड़ा रहस्यपूर्ण है, परन्तु इन्हें और इनकी करतूत को कृपक जानते हैं। इसलिये यहाँ पर उनसे बचाव का उपाय ही बतला दिया जाता है। स्मरण रहे कि तन्दुरुस्त पौधे या पेड़ को दीमक नहीं लगती, लगती भी है तो बहुत कम। जब पौधा कमजोर होता है तो उस पर इन का आक्रमण हो जाता है और लोग समझते हैं कि दीमक से पौधा मर गया। दीमक विशेषतः सूखी लकड़ियों पर घावा करती है। इसलिए बगीचे में इधर उधर सूखी टहनियाँ अथवा लकड़ियाँ नहीं पड़ी रहने देना चाहिये। सिचाई से भी दीमक का बसा कुछ कम हो जाता है। छोटे पौधों को बचाने के लिए पौधे के तने के चारों ओर दो फीट की दूरी तक नीम की खली या मिट्टी में मिला दी जाए तो दीमक तने के निकट नहीं आती। रोपने के पूर्व ही खली डालनी चाहिए।

फल की मक्खी (Fruit-fly)—आम, फूट आदि फलों के छिलकों में छेद करके यह मक्खी अण्डे दे देती है, जिनमें से बाल-कीट निकल कर गूदे में प्रवेश कर जाते हैं। पूर्ण बाढ़ पाने पर बाहर निकल जमीन में कोप बना कर रूपान्तर करते हैं। एक सप्ताह में कोप से मक्खी निकल आती है। व्याधि-ग्रस्त फलों के सुधार का तो कोई उपाय नहीं है। व्याधि अधिक फैलने न पावे इसलिये जिन फलों में मक्खियों के बाज-कीट पाये जायें

जब तक छोटे-छोटे फल न घन जायें,, छिड़काव करना चाहिये।
छिड़काव यदि सुबह के वक्त किया जाये तो अच्छा रहता है।
क्योंकि उस समय कीट अचेतन्यावस्था में रहते हैं।

आम की मक्खी—आम की मक्खी ही आम के फलों पर
भी आक्रमण करती है। लेड क्रोमेट या लेड आर्सेनेट वाला विष
पानी में मिला कर छिड़कना चाहिए।

आम का घुन—यह पाव ईच से कुछ बड़ा अनाज के घुन
जैसा काले और भूरे रंग का एक घुन होता है, जिसकी मादा
छोटे-छोटे फलों पर अंडे देती है। बाल-कीट अंडों से निकलते
ही छिलके में छिद्र करके अंदर घुस जाते हैं। ज्यों-ज्यों आम
बढ़ता है, छेद बन्द होता जाता है और बाहर से कुछ भी पता
नहीं चलता बाल-कीट गूदे खा जाते हैं और जब गुठली की मींगी
घनती है तो उसे खाने लग जाते हैं। पूर्ण बाद पाने पर रूपान्तर
करके तरुण कीट बाहर निकल आते हैं और दूसरे माल की
फल पर आक्रमण कर बैठते हैं। फसल न होने पर मिट्टी या
छाल में छिपे रहते हैं।

मौर आने लगे तब से पेड़ों की सिंचाई की जाये और धड़
पर मूड़-आयल इमल्शन का छिड़काव किया जाये तो बहुत कुछ
बचाव हो जाता है। सिंचाई से भूमि के अन्दर के और औषधि
से छाल में बिभ्राम करने वाले कीट मर जाते हैं। जिन फलों
पर आक्रमण हो चुका हो, उन्हें हट्टे करके जला देना चाहिए।

छोटे पेड़ों या पौधों को बचाने के लिए उन पर चढ़ाई, घाम
 म की टट्टी या ताड़ के पेड़ों की छाया करना पड़ती है। बड़े
 पेड़ों का बचाव विशेषतः तीन रीतियों से किया जा सकता है।
 रीत—(१) मिचार्ड, (२) धुआँ, या (३) गर्मी पहुँच कर।

(१) मिचार्ड—जिस दिन पाला गिरने की संभावना हो,
 उस दिन यथा शक्ति (जितनी धन पड़े) मिचार्ड कर दी जाये।
 इसमें बहुत ठंडी हवा चलनी हो और आसमान बिजुल मार
 रहा हो उस दिन रात को पाला गिरने की संभावना रहती है।
 इसी एक बार गर्मी होने से इतना शीघ्र ठंडा नहीं होता, जितना
 गर्म वातावरण का वायु ठंडा हो जाता है। जब मिट्टी में पानी
 ना रहता है तो उसके अन्दर की गर्मी जल्दी से नष्ट नहीं होती।
 इसी इतना देना चाहिए कि मिट्टी गीली-गीली रहे। यदि पानी
 बहुत कम होगा तो हमसे लाभ नहीं होता, किन्तु पानी भरा भी
 नहीं रहना चाहिए।

आम के और फल वाले दिन भी बहुत गुणमान हो
 जाता है। ऐसे अवसर पर यदि पृथ्वी पर पानी का निरन्तर बहाव
 रहा जाये तो पृथ्वी गुर्मीने का सहने नहीं पाने।

(२) धुआँ—पत्ते और पान की धोई-धोई दूर दूर तक
 फैला कर उनमें आग लगा दी जाये और ऊपर से मीठी पान टाक
 दी जाये, ताकि लपटे लपटे बंधने का बंधन बांधे धुआँ निकलने लगे।
 यह धुआँ बाँधी-बाँधी पर बार-बार लपटा रहता है जिससे पेड़
 का पौधे पर पाने का पूरा-पूरा आनन्द नहीं रहता। यदि रात्र से
 इस परदे की हवा से भी आग लगा देनी चाहिए। बड़े-बड़े

प्रकरण ६

पौधे तैयार करने की युक्तियाँ

साधारणतः फलों के पौधे दो तरह से तैयार किये जाते हैं—
बीज से या कलम से। बीज से तैयार होने वाले पौधों को बीजू
और दूसरों को कलमी कहा जाता है। पौधे तैयार करने की
साधारणतः प्रचलित युक्तियाँ निम्नलिखित हैं।

बीजू पौधे तैयार करना

बीज से तैयार किया हुआ पौधा बहुत मजबूत और दीर्घजीवी
होता है। इसमें परिश्रम भी अधिक नहीं करना पड़ता। पौधा
आँधी, लू, पाला आदि हर प्रकार की व्याधी का सामना भली
प्रकार कर सकता है। चश्मा आदि करने के अभिप्राय से भी
पौधे पहले बीज से ही तैयार किये जाते हैं। आम, लीची, आता-
फल, पीता, खट्टी, मिठा, आड़ू, शहतूत, फालसा, अमरुद,
जामुन और घेर बीज से ही तैयार किये जाते हैं। बीजों को
फलों से निकालते ही धो देना चाहिए। क्योंकि फल से निशाला
हुआ बीज जितना अधिक हवा में रखा जावेगा, उसकी पैदा करने
की शक्ति कम होती जाती है। इसी कारण भिन्न-भिन्न पौधों के
बीज लगाने का नमय भी प्रत्येक-प्रत्येक है—

आलवना, या टावर का सेल (Conitor) भी घुमाई जाये जिसे काम में लाया जाता है। छोटे-छोटे हिस्सों में रख कर लगा देने में काफी धुंधा हो जाता है और पाला नीचे घतरने पाता।

(३) जब वातावरण का तापमान ३० F. H. से नीचे हो जाता है तब पाला गिरता है। इसलिये वातावरण को इस प्रकारों तक गर्म करने की युक्ति विदेशों में काम में लाई जाये है। कुछ यन्त्र ऐसे बने हुए हैं जिनमें सस्ता तेल जला कर गर्म करते हैं। (तापमान जानने के लिये एल्कोहल के थर्मामीटर जिनका एल्कोहल लाल रंग का रंगा हुआ हो, अच्छे होते हैं क्योंकि इनके अक्षर रात में भी स्पष्ट पढ़े जाते हैं। इन्हें ऊपर से ४-५ फीट की ऊँचाई पर लगा देते हैं) यदि बाग में बहुतमूल्य फलों की हो और ईंधन सस्ता हो या आसानी से मिल सके तो आग जलाकर हवा को गर्म किया जा सकता है। विदेशों में अलार्म थर्मामीटर से भी काम लिया जाता है। सदी पाला गिरने की दृढ़ तक पहुँच जाती है तो थर्मामीटर से अलार्म की घंटी बजने लगती है और माली आदि जाग अंगीठियाँ (Heater) जला देता है। दस एकड़ बाग में लग ३० हीटर्स और ०.६ गैलन कूड़ आयल प्रति घंटा काम आता।

इनके अलावा फलों के पृष्ठों पर जब सूक्ष्म जन्तु (Fungus or Bacteria) का आक्रमण भी होता है जो सूक्ष्मदर्शक की सहायता के बिना नहीं देखे जा सकते। उनसे बचाने के अलावा कृषि विभाग के कार्यकर्त्ताओं की सहायता लेनी चाहिए।

स्वस्थ हों। बीज जमीन में इतना गहरा लगाया जाये जितनी उसकी मोटाई हो। छोटे बीज, जैसे अमरुद, शहतूत, पपीता, फालसा, खट्टी, मिठा और नींबू ये सब छोट कर बोये जाते हैं। बड़े बीज, जैसे आम, आड़ू आदि बीजों के व्यास के बराबर गहराई पर लगाए जाते हैं। बड़े बीजों के ऊपर मिट्टी भली-भांति दबा दी जाती है, ताकि छिद्र न रहने पाये। नहीं तो बीज को नमी और गर्मी न मिलने से अंकुर न फूटेगा।

सिंचाई

बीज बोने के बाद हजारे या भांफ से पानी दे दिया जाये। ध्यान रखें, कि सिंचाई से जमीन केवल गीली हो, क्यारी पानी से भर न जावे। ज्यादा पानी से न केवल हैम्प आफ फंगस की शंका रहती है, बल्कि बीज जमते भी कम हैं। नन्हे-नन्हे पौधे निकलते ही पानी की अधिकता से मुर्मा जाते हैं। इसलिए जब तक पौधे बड़े न हो जावें पानी सावधानी से देना चाहिए। अर्थात् जब भूमि ऊपर से सूखी दिखाई दे, तब देना चाहिए।

क्यारियों में खर-पतवार उग आते हैं और उनसे फसल को बहुत हानि पहुचती है। ऐसे बीजों के लिए बड़ा घातक सिद्ध होता है जो महीने बाद अंकुर फेंकता है। घास बीजों की खुराक चुरा लेती है। प्रथम तो उसे फूटने ही नहीं देता, और यदि फूट भी निकले तो उसे बढ़ने में रुकावट पैदा करता है। इसलिए क्यारी में घास-पत होते ही नष्ट कर देना चाहिए।

नाम पौधा	बीज बोने का समय	अंकुर निकलने का समय
आम	जून से अगस्त	२२ दिन
आड़ू	सितम्बर-अक्टूबर	५ मास
अमरुद	मार्च, जुलाई, अगस्त, सितम्बर	२२ दिन
बेर	मार्च	३० "
जामुन	जुलाई	२० "
फालसा	मई-जून	१० दिन
लोकाट	एप्रिल-मई	२ मास
मिठा	सितम्बर-अक्टूबर	२० दिन
नींबू	अगस्त-सितम्बर	२० "
लीची	जून-जुलाई	३० "
पपीता	फरवरी-मार्च, जुलाई से सितम्बर	१२ दिन
सीताफल	सितम्बर-अक्टूबर	३० दिन

बीजों को चाहे गमलों में बोया जाये, या दुमट जमीन

निकास का प्रबन्ध अवश्य होना चाहिए, अन्यथा सफलता कम होगी। बीज बोने के पश्चात् पत्ती की खाद और पतली तह बालू की बीजों पर चढ़ा दें। बालू देने से यह लाभ होगा सिंचाई के पश्चात् जमीन की सतह ऊपर से सूखी होगी। नीचे तर रहेगी, इससे नन्हें पौधे 'डैम्प आफ कंगस' (Damping off) की व्याधि से सुरक्षित रहेंगे। यह अधिक नमी के कारण पौधों पर आक्रमण करती है।

वे पर आड़ू की कलम चढ़ाना स्वजातीय पौधों के मेल के उदा-
 ण हैं और महुआ या खिरनी के पौधे पर सपाटू की, आड़ू के
 पौधे पर आलुबुखारे की कलम चढ़ाना विजातीय पौधों के संलग्न
 होते जाते हैं। कलम की सफलता मुख्यतः चार बातों पर निर्भर
 है—(१) पौधों के स्वास्थ्य पर, (२) तैयार करने के समय पर,
 (३) युक्ति की जानकारी पर, तथा (४) पश्चात् की देख-भाल पर।

(१) पौधों का स्वास्थ्य—याद रखें, कि टहनियों या फल-
 ल कर्तों जो भाग पौधों के हों वे पत्तों और शाखों के मेल की
 जगह पर पत्तों और शाखा के बीच में से निकलते हैं जिन्हें हिंदी
 में आँख, चश्मा या कली कहते हैं और अंग्रेजी में टहनियों देने
 वाली को बुड बड (Wood-bud) और फूल-फल वाली को
 फलबुर और फूल फल बुड (Flower and fruit bud) कहते
 हैं। पौधों की याद के लिए बुड बड स्वस्थ होनी चाहिये, इसलिए
 जो टहनियाँ कलम तैयार करने के लिए चुनी जायें वह अखण्ड
 पत्तों वाली चुन कर, यह देख लेना चाहिए कि बुड बड (चश्मे)
 अखण्ड हों, फीट आदि लगे हुए न हों। इसी भाँति जिस पौधे पर
 कलम चढ़ाई जाये, (जिसको आगे बीजू के नाम से पुकारा
 जायेगा) वह स्वस्थ हो, घड़ में कोई व्याधि न हो।

(२) कलम बांधने का समय—जब पौधा याद पर होते हैं
 उस समय रस का संवाहन उनमें बढ़ी तेजी में होता है इसलिए
 यदि याद के प्रारंभिक काल में कलम तैयार की जाये, तो भली-
 भाँति लग जाते हैं। यह समय पौधों की जाति के अनुसार वर्ष

कलमी पौधे तैयार करना

गृष्टिकर्मा ७ नियमानुसार उन्नकोटि के फलों या केले के रसांत नर-नारी के मेल में होता है। तन्मयति शास्त्र के सिद्धि से धनपत्रियों में भी नर-नारी फल की गोज करके बल्लभ रंगार को भगवद्भक्त कर दिया है। गृथक-गृथक गुरु बाने देते के नर-मादा फूलों के तत्त्वों को मिला कर कई उत्तमोत्तम फल और फल-वृत्त तैयार किये हैं। यदि ऐसी युतिचौ नहीं मिलती तो फूलों में गुण स्थिर रखना यदि अमंभव नहीं तो कल अवश्य था। इनके सिवाय बीजू पौधों की अपेक्षा कलमी पौधे फल देना बहुत जल्दी आरम्भ करते हैं।

कलमी पौधे दो प्रकार के होते हैं—एक वे जो स्वभाविक रीति से तैयार होते हैं और दूसरे वे जो कृत्रिम रीति से तैयार किये जाते हैं। पहले प्रकार के पौधे, पेड़ स्वयं तैयार कर देते हैं, जैसे केले के पौंच (Suckers), स्ट्राबेरी का टॉट (Offsets), अनानास के सकर्स, रामबाण के पौंच। इनके स्थानान्तर कर देने से ही पौंचे या पेड़ दूसरी जगह हो जाते हैं।

कृत्रिम रीति से पौंचे तैयार करने में मनुष्य को कुछ परिश्रम करना पड़ता है। ये कई तरह से किया जाता है, परन्तु मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है—एक-वृत्ती, अर्थात् जिसमें एक ही वृक्ष का कोई अंग काम आता है और दूसरी द्विवृत्ती, अर्थात् जिसमें दो स्वजातीय या विजातीय पौधों को संलग्न किया जात है। नारंग के पौंचे पर आम की अथवा आड़ (Peach)

। नोक चरती और पनजी होगी है। इस नोक में धीजू पौचे। छाल चरमा बिठनाने के लिए महलियत से ऊपर उठाई जा सकती है।

(३) मोम में तर कपड़े की धजियाँ, पीता या मोटी सुतली (ममे कलमें बाँधी जायें और पौचे फटने न पावें।

जहाँ काम अधिक होता है वहाँ मलमल की ६-१० इंच लंबी फाड़ी हुई पट्टी को एक पनली-मी लकड़ी पर लपेट कर रोल ऐसा बना लेते हैं कि लकड़ी पर छेद-दो इंच मोटी हो कपड़े की हो जाये। इस रोल को फिर एक भाग राल और एक भाग मोम के गर्भ मिश्रण में डुबो देते हैं। मोम अन्दर तक बेश होने के बाद कपड़ा तैयार हो जाता है। ठंडा होने पर पड़ा रोल पर चिपका रहता है और आवश्यकतानुसार फाड़ कर काम में लाते हैं।

थोटे काम के लिए किसी मजबूत कपड़े पर गर्म-गर्म मोम लगा देने से ठंडा होने पर वह कपड़े में रंज जाता है फिर इस कपड़े की आध इंच चौड़ा धजियाँ फाड़ कर काम में लाई जा सकती हैं। सुतली की अपेक्षा कपड़ा उत्तम होता है, इससे कड़ भी अच्छी हो जाती है और पौचे की छाल भी कटने लगी पाती।

(४) कलम, मिट्टी और मोम—जब कलमें बाँधी या लगाई जायें तो जहाँ पर बे काटी या छीली जाती हैं वहाँ पौधों पर घाव हो जाते हैं। ऐसे घाव यदि वैसे ही छोड़ दिये जायें तो

इन पाँचों मगों में इन्हें अधिक आदर कर रहे हैं।
 ही पाना अधिकार उना में है और दोनो के उर
 समान है। ये दोनों शत्रुओं में बचाने के लिए बार बार मिलते
 मिलते पड़ता है। मिट्टी बिना मूल्य के तैयार हो जाती है।
 मोम तैयार करने में अत्यन्त कुछ व्यय करना पड़ता है।
 मोम एक बार तैयार करने में बहुत दिनों तक लगता है।
 मिट्टी बार-बार तैयार करनी पड़ती है।

कलमी मिट्टी—दो भाग मिट्टी में एक भाग मोम
 महीन भूसा और आवश्यकतानुसार जल मिला कर उसे
 पना लेनी चाहिये कि जिससे वह पौधों पर चिपक सके।
 और गोबर इसलिए मिलाते हैं कि जिससे धूप से मिट्टी छरी
 पाये। कहीं-कहीं भूसा न मिला कर पुरानी रईसी मिट्टी
 मिश्रण को मढ़ा देते हैं।

कलमी मोम—यह राल और मोम के मिश्रण से तैयार
 जाता है। चार भाग राल और एक-भाग मोम, तथा एक
 भाग का तेल मिला कर गर्म कर लेते हैं।

इसलिए जहाँ बीमर का भर हो वहाँ कलम लगाने की जगह मिट्टी में नीम की गली बिना देनी चाहिए। यदि गली न हो गमनों में या लकड़ी के घड़नों में लगा कर उन्हें मचान कर दिया जाये। गमनों में लगाने से दूसरा लाभ यह होगा आवश्यकता पड़ने पर गमने छड़े या गम स्थान में उठा कर जा सकते हैं। जो पौधे कलम से तैयार हो सकते हैं उन्हें गन्तव्य करने में विशेष व्यय नहीं पड़ता, क्योंकि फलमें ही गली से भेजी जा सकती हैं।

कलम की लम्बाई इतनी होनी चाहिए कि जिसमें चार-पाँच या चट्ठे (Buds) हों (जहाँ शाख से पत्तों का मेल हो है वहाँ परदे होते हैं) अर्थात् करीब पाँच पत्ते होने दें। बहुधा एक बीमर की लम्बाई काफी होती है। कलम के दो मुँह निरधरे फटे हुए होने चाहिए। नीचे का कटाव पत्ते भेज की जगह से कुछ नीचे होना चाहिये। कलम लगाते व सीधी न लगा कर टेढ़ी लगाई जाये तो अच्छी जमती है। इस की दो आँखें जमीन में और तीन ऊपर होनी चाहिये व ऊपर वाली तीन आँखें उपर-नीचे अथवा जमीन-आसमान तरफ न रह कर बाजू में रहनी चाहियें। इस प्रकार से लगाई कलम को यदि पानी मिलता रहे तो वह १५-२० दिनों में ही के अंकुर फँक देती है। नामपाती, अंजीर आदि की कलमें भी भाँति लगाई जाती हैं।

दाव कलम (Layering)—इसमें प्रायः एक साल की लकी को सुका कर उसके मध्य भाग को मिट्टी में दबा देते हैं।

घन पर पानी लगाने से व्याधियां आक्रमण कर बैठती हैं, या झोड़ी अपना अधिकार जमा लेते हैं और पौधों की जान पर घनती है। ऐसे शत्रुओं से बचाने के लिए घाव पर मिट्टी या मोम लगाना पड़ता है। मिट्टी बिना मूल्य के तैयार हो सकती है और मोम तैयार करने में अवश्य कुछ व्यय करना पड़ता है। परन्तु मोम एक बार तैयार करने से बहुत दिनों तक चल जाता है। मिट्टी बार-बार तैयार करनी पड़ती है।

कलमी मिट्टी—दो भाग मिट्टी में एक भाग गोबर, कुछ महीन भूसा और आवश्यकतानुसार जल मिला कर उसे ढेरी बना लेनी चाहिये कि जिससे वह पौधों पर चिपक सके। भूसा और गोबर इसलिए मिलाते हैं कि जिससे धूप से मिट्टी फटने न पाये। कहीं-कहीं भूसा न मिला कर पुरानी रूई भी मिला देते हैं मिश्रण को सड़ा देते हैं।

कलमी मोम—यह राल और मोम के मिश्रण से बनाया जाता है। चार भाग राल और एक-भाग मोम, तथा एक भाग अलसी का तेल मिला कर गर्म कर लेते हैं।

डाली या कलम लगाना

कटिंग (Cutting)—कलमी पौधे तैयार करने की सबसे सरल युक्ति यही है। कहीं से अच्छे पेड़ की, एक साल की या वाली डाली फाट कर जहाँ चाहें वहाँ खेत में या नर्सरी में लग दी जाती है। देसी फलमें बहुधा वरमात में लगाई जाती है और वे जल्दी लग भी जाती हैं। इन्हें बहुधा दीमक हानि पहुँचाती

इसलिए जहाँ शीमर का भर हो वहाँ कलम लगाने की जगह मिट्टी में नीच की गली बना देनी चाहिए। यदि गली न हो तो गमनों में या लकड़ी के चरमों में लगा कर उन्हें मचान रख दिया जाये। गमनों में लगाने से दमग लाभ यह होगा आवश्यकता पड़ने पर गमने टूटे या गर्म स्थान में उठा कर ले जा सकने हों। जो पौधे कलम से तैयार हो सकने हों उन्हें तान्त्र करने में विशेष व्यवस्था नहीं पड़ता, क्योंकि कलम ही पानी से भेजी जा सकती है।

कलम की लम्बाई इतनी होनी चाहिए कि जिसमें चार-पाँच नय या चरम (Buds) हों (जहाँ शाख से पत्तों का मेलना है वहाँ चरम होते हैं) अर्थात् करीब पाँच पत्ते होने हिये। बहुधा एक बीने की लम्बाई काफी होती है। कलम के नों मुँह निरखे कटे हुए होने चाहिए। नीचे का कटाव पत्ते भेज की जगह से कुछ नीचे होना चाहिये। कलम लगाते समय सीधी न लगा कर टेढ़ी लगाई जाये तो अच्छी जमती है। तम की दो आँखें जमीन में और तीन ऊपर होनी चाहिये। ऊपर वाली तीन आँखें ऊपर-नीचे अथवा जमीन-आसमान। तरफ न रह कर बाजू में रहनी चाहियें। इस प्रकार से लगाई कलम को यदि पानी मिलता रहे तो वह १५-२० दिनों में हों के अंकुर फँक देती है। नामपाती, अंजीर आदि की कलमें सी भौंति लगाई जाती है।

दाव कलम (Layering) — इसमें प्रायः एक साल की हनी को मुका कर उसके मध्य भाग को मिट्टी में दबा देते हैं।

उन पर पानी लगने से व्याधियां आक्रमण कर बैठती हैं, या रोगों की अपत्ता अधिकार जमा लेते हैं और पौधों की जान पर धमकाने लगी है। ऐसे शत्रुओं से बचाने के लिए घाव पर मिट्टी या कोयला लगाना पड़ता है। मिट्टी बिना मूल्य के तैयार हो सकती है और मोम तैयार करने में अवश्य कुछ व्यय करना पड़ता है। पत्तु मोम एक बार तैयार करने से बहुत दिनों तक चल जाता है। मिट्टी बार-बार तैयार करनी पड़ती है।

कलमी मिट्टी—दो भाग मिट्टी में एक भाग गोबर, कुआँ महीन भूसा और आवश्यकतानुसार जल मिला कर उसे फैला देना लेनी चाहिये कि जिससे वह पौधों पर चिपक सके। भूसा और गोबर इसलिए मिलाते हैं कि जिससे घूप से मिट्टी फटने से बचाये। कहीं-कहीं भूसा न मिला कर पुरानी रुई भी मिला देते हैं। मिश्रण को सड़ा देते हैं।

कलमी मोम—यह राल और गोम के मिश्रण से बना जाता है। चार भाग राल और एक-भाग मोम, तथा एक भाग जलसी का तेल मिला कर गर्म कर लेते हैं।

डाली या कलम लगाना

कटिंग (Cutting)—कलमी पौधे तैयार करने की सबसे सरल युक्ति यही है। कहीं से अच्छे पेड़ की, एक साल की छड़ वाली डाली काट कर जहाँ चाहें वहाँ खेत में या नर्सरी में लगा दी जाती है। देसी प्रलम्ब बटुषा घरमात में लगाई जाती है और ये अच्छी लग भी जाती है। इन्हें बटुषा रोमछ दानि पट्टुवाती

इसलिए जहाँ दोमट का भर हो वहाँ कलम लगाने की जगह मिट्टी में नीम की खली बिना देनी चाहिए। यदि खली न ले तो गमनों में या लकड़ी के खरों में लगा कर उन्हें मचान रख दिया जाये। गमनों में लगाने से दूसरा लाभ यह होगा कि आवश्यकता पड़ने पर गमन छँटे या गम स्थान में उठा कर ले जा सकते हैं। जो पौधे फलम से सँभार हो सकते हैं उन्हें तान्तर करने में विशेष ध्यान नहीं पड़ता, क्योंकि फलमें ही पत्तानी से भेजी जा सकती हैं।

कलम की लम्बाई इतनी होनी चाहिए कि जिसमें चार-पाँच तैंग या घट्टे (Buds) हों (जहाँ शाख से पत्तों का मेल होता है वहाँ घट्टे होते हैं) अर्थात् करीब पाँच पत्ते होने चाहिये। बहुधा एक घीने की लम्बाई काफी होती है। कलम के दोनों मुँह निरखे फटे हुए होने चाहिए। नीचे का कटाव पत्ते के मेल की जगह से कुछ नीचे होना चाहिये। कलम लगाते समय सीधी न लगा कर टेढ़ी लगाई जाये तो अच्छी जमती है। कलम की दो आँखें जमीन में और तीन ऊपर होनी चाहिये और ऊपर वाली तीन आँखें ऊपर-नीचे अथवा जमीन-आसमान की तरफ न रह कर बाजू में रहनी चाहियें। इस प्रकार से लगाई हुई कलम को यदि पानी मिलता रहे तो वह १५-२० दिनों में जड़ों के अंकुर फँक देती है। नामपाती, अंजीर आदि की कलमों में इसी मौति लगाई जाती है।

दाय कलम (Layering)—इसमें प्रायः एक साल की टहनियों को मुड़ा कर उसके मध्य भाग को मिट्टी में दबा देते हैं।

टहनी अगर जमीन की सतह के पास हुई तो जमीन में,
मचान पर गमले रखकर उनमें दवा दी जाती है। फिर
दिन से ढाई महीने तक पौधों की जाति के अनुसार ऐसी
तैयार हो जाती हैं। यदि टहनी सख्त हो तो लगाते समय
पर की करीब एक इंच जगह की छाल चाकू से छुदा ले
है, अथवा टहनी में एक इंच लम्बा चीरा देकर नीचे के
को बीचों बीच से काट देते हैं और फिर ढाली मुकाफ
दी जाती है। ढाली हिलने-डुलने या ऊपर न उठने पावे
लिये एक खूँटा गाड़ कर उसमें बाँध दिया जाता है। ज
जाती है तो मुख्य पौधे अथवा पेड़ से पृथक कर उसको
जगह उठाकर लगा देते हैं। अंगूर, अंजीर आदि की कलमें
भाँति लगाई जा सकती हैं। दाब कलम गमले में भी तैयार
जाती है। इसके लिये आसान तरीका यह होगा, कि एक
में आमने-सामने की बाजू में दो कटाय ऐसे बनाये जायें
उनमें ढाली ठीक से जम जाये। कटाय ३-४ इंच गहरे
चादियें। जब छीली हुई ढाली गमले में जमा दी जाये तो मि
मिट्टी से कटाय षंद कर दिये जायें। गमले में मिट्टी, पाल
पत्तों का मिश्रण भरना चाहिये। पानी देने के लिए एक बने
महीन छेद करके गमले पर रख दिया जाये और उस बर्तन
हर समय सजी होतें ही पुनः जल-पूर्ण कर दिया जाये।
करने से कलम को आवश्यकतानुसार पानी मिलता रहेगा।

ग्रंटा बाँधना (Gooty)—यह भी दाव फलम का ही एक तर है। भेद केवल इतना है कि दाव फलम में टहनी मिट्टी गाँव जाती है और इसमें मिट्टी टहनी पर लगाई जाती है। बाँधने के लिए एक माल की आयु वाली आधा ईंच मोटी १ पर एक-दूसरे से एक ईंच की दूरी पर दो गोल कटाव इतने लगायें कि चारों तरफ से वेवल छाल ही कटे। फिर उस पर एक लम्बा चीरा लगा कर उसे धाकू या हाथ से निकाल अव एक ईंच चौड़ी छाल चारों ओर से छूट जायेगी। इस हुई जगह पर मिट्टी बाँध देने से वह ढाली नई जड़ें फँक दे। मिट्टी बाँधने की महल रीति यह है कि आठ दस ईंच चौड़े चट्टी के टुकड़े का एक कोना कटाव से दो ईंच की पर धड़ की तरफ इस तरह से बाँध दो कि फैलाने से चट्टी फार (Funnel shaped) हो जाये। फिर उसमें मिट्टी भर चट्टी को लपेट करके दूसरा मुँह दूसरी ओर बाँध दो। मिट्टी तो भरनी चाहिए कि कटाव के चारों ओर करीब डेढ़-दो ईंच जाये। मिट्टी बहुत गीली नहीं होनी चाहिये। वह सिर्फ इतनी हो कि जोर से दवाने से बंध जाये और छोड़ने पर जरा-से ब से फिर बिखर जाये। अधिक गीली मिट्टी की अपेक्षा यदि १ ही मिट्टी लगाई जाये तो जो जड़ें फँकी जाती हैं वे स्वस्थ १ मोटी होती हैं। मिट्टी को बाँधने के पश्चात् उसके ऊपर शाखा में, अथवा एक बाँस गाड़ कर उसमें एक मिट्टी का न, जिसके पौधे में एक छेद हो, बाँध देना चाहिए। छेद में

एक कपड़ा इस प्रकार दुंग दिया जाए कि पत्ती
 गिराने को आसानी पड़े। पौधों के रूप में गिरे।
 गिराती होने से पड़ने की पुनः भर देना चाहिए।
 कि मिट्टी हर समय नीची मनी रहे। मिट्टी के नीचे बनी
 यह दहनी जड़े पंक्त होती। जब जड़े कम पड़ी के बराबर
 हुई दिगई दें, तो उसके १२-१३ दिन बाद पंक में दहनी
 करके नमारी में लगा देना चाहिए। ऐसी कलमें नेंदू
 लोफाट आदि की मरार की जाती है।

दां-दुधी कलमें—इसमें स्वजातीय अथवा रिजर्डी
 का संयोग किया जाता है, जिस पौधे के साथ कनी (Budding)
 दहनी (Grafting) या गने (Inarching) का भेज दिया जाता
 यह पमीन से ग्राफप्लाथ लेकर ऊपर घाने फलनी भागको देना
 और कलमी भाग भोजन तैयार करके अपना तथा मातृ-दुध
 वाले पौधे का पोषण करता है। ऐसे संयोग से कई लाभ होते हैं।
 इसमें इच्छानुसार पौधा छोटा-बड़ा किया जा सकता है,
 नासपाती की कलम बीही (Quince) पर लगाई जायेतो पेड़ बड़े
 हो जाते हैं। साथ ही पौधों की मिट्टी और जलवायु अपनाने
 योग्यता बढ़ जाती है। बहुधा ऐसा भी देखने में आया है।
 बहुत अच्छे स्वस्थ पौधे भी स्थानान्तर करने से नई भूमि
 जलवायु में मर जाते हैं। ऐसी स्थिति में बीजू पौधा जहाँ न
 पौधा लगाना हो उस स्थान से लाकर कलम बांधी जाये
 कलम लग जाने पर वहाँ वापस भेज दिया जाये, तो यह अच्छे

मोगा। इस रीति से जब एकाध पेड़ तैयार हो जाये तो फिर हलम बाँध कर उक्त स्थान पर दूसरे पेड़ धासानी से तैयार किए जा सकते हैं।

पौधों के रूप, रंग और स्वाद में भी परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे मंतरे का चंद्रमा जमेरी पर बांधा जाये तो ढीले छिलके वाले, कुछ बड़े लेकिन खट्टे फल होते हैं। पैदावार बढ़ जाती है और फलों का रंग लालिमायुक्त होता है। इसके विपरीत यदि मीठे नींबू पर चंद्रमा चढ़ाया जाये तो पल मीठे, पीले रंग के और चिपके हुए छिलके वाले होते हैं। पैदावार लेकिन कुछ कम होती है।

चंद्रमा चढ़ाना (Budding)—इस रीति में यह प्रयत्न किया जाता है कि किसी उत्तम पेड़ की टहनियों की आँख (चंद्रमा) लेकर उम्मी जाती के अथवा किसी दूसरी जाती के छोटे पौधे पर लगा दी जाती है। आँख नहीं बढ़ती हुई स्थिति में टहनियों में लेनी चाहिए। एक अच्छी टहनियों काट कर बाजू पौधे के पास ले जाकर वहाँ आँख निकालें।

बाजू पौधे के घड़ पर जमीन से २-३ इंच ऊँचा करीब दोइ इंच लम्बा, मिर्क छात्र कटे इतना गहरा एक बीरा लगाया जाता है और पेड़ मुड़ा कर चाकू (Budding knife) के पतले पल के से छात्र और वलके नीचे के काष्ठ का सम्बन्ध जुड़ा दिया जाता है इस मुभी हुई जगह में टहनियों की आँख बिठना दी जाती है, जिसमें पौधे वाले काष्ठ के साथ इसका सम्बन्ध हो जाये।

फिर पौधे को सीधा करके कपड़े की धाँजी से मजबूत बाँध
 चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि आँख, बाँधते समय खुली
 रहे, पट्टी के नीचे दब न जाये। बाँधने के बाद कलमी मिर्च
 मोम लगा देना चाहिए।

आँख निकालना—लाई हुई स्वस्थ टहनी पर तेज काट
 तरह चलाओ कि पत्ते की जगह से आधा इंच ऊपर से चला
 नीचे के काष्ठ का कुछ भाग लेता हुआ पत्ते से तीन इंच
 निकल आये। फिर कटे हुए काष्ठ को छुड़ा कर छाल सेती
 लेनी चाहिए कि वह पौधे पर जहाँ बिठलानी हो ठीक से
 जाये। पत्ते को आधा काट कर नीचे का भाग लगा रहने
 चाहिए। जब यह पत्ता ४-५ रोज में अपने आप गिर जावे
 समझ लो कि चरमा लग गया। यदि सूख कर वहीं चिपका
 तो सफ़लता सन्देह जनक होगी। चरमा 'जहाँ' तक हो उठता
 ओर चढ़ाना चाहिए और चढ़ाने के बाद पौधे पर कुछ छाया
 भी प्रवन्ध करना चाहिए। इस प्रकार से चढ़ाया हुआ चरमा दो
 तीन सप्ताह में जब नया कोंपल फेंक दे तो बाँध को काट देना
 चाहिए और बीजू पौधे का ऊपरी भाग चरमे की जगह से २
 इंच की ऊँचाई से काट दिया जाये तो ठीक होगा। इस २-६ इंच
 के टूट के साथ नया कोंपल बाँध दिया जावे तो वह सीधा हो
 जायेगा और जब वह सीधा हो जाये तो यह टूट भी काट दिया
 जा सकता। इस प्रकार से संतरे की कलमें लगाई जाती हैं।

उपरोक्त रीति में बीरा सीमो लगाया था, परन्तु सहूलियत
 के लिये जिनमें छाल आमानी से छूट सके और धरम सहूलियत

बिठला जा सके यह चीरा अंग्रेजी अक्षर 'टी' (T) के आकार का या टल्दी (J.) के आकार का, अथवा धन या गुणा + x) के बिन्हों जैसा लगाया जा सकता है । परन्तु इन सबकी पेक्षा लम्बा चीरा ही उत्तम रहता है । क्योंकि उसमें पौधा स्वयं अपनी छाल से दबा कर चरमे को पकड़ लेता है । इस प्रकार चरमे को अंग्रेजी में शील्ड बडिंग (Shield budding) कहा जाता है ।

इनके अतिरिक्त दो लम्बे और एक आड़ा चीरा लगाकर छाल को उलट करके चरमा बिठलाया जाता है और फिर छाल को सीधा करके बांध सकते हैं । इसको अंग्रेजी में प्लेटबडिंग (Plate Budding) कहते हैं । जब चीरा अंग्रेजी अक्षर 'एच' (H) के आकार का लगाया जाता है और छाल ऊपर नीचे दोनों ओर लौटाई जाती है तो उसे एच-बडिंग (H-budding) कहा जाता है । यदि छाल सहूलियत से न निकले तो चाखू से धर्गाकार छीलकर उसे निकालते हैं और छोले हुए भाग पर चरमा बांधना पड़ता है तो इसे फ्लेट-बडिंग (Flat-budding) और जब चारों ओर की छाल छुड़ा कर चरमे वाली छाल इस तरह काट कर बिठलाई जाये कि सब जगह टक ले तो उसे रिंगबडिंग (Ring-budding) कहते हैं जब चरमा की छाल इस भांति निकल आती है कि वह चाखू छोड़ कर नली के रूप में ऊपर निकल आवे और पौधे की टहनियों पर जैसे ही उतार कर बिठला दी जाये तो उसे ट्यूब्यूलर बडिंग (Tubular budding) कहते हैं ।

int) कहते हैं रिंग या ट्यूबूलर बॉटिंग द्वारा फाड़।
 घुरगारा आदि की फलमें लगाई जाती हैं। चैत्र मास में जड़
 की नई फाँपलें निकलती हैं, उस वक्त जो चरमा लेना है।
 ऊपर-नीचे दो गोल घीरे इस प्रकार लगा दिये जायें कि ऊ
 भाग कट जाये और नीचे का कटाव सिर्फ छाल की
 जितना ही हो। फिर बायें हाथ से टहनियों की पकड़ कर।
 हाथ के अंगूठे और पहली अंगुली से चरमा खींचा व
 जल्दी से नली के रूप में निकल आता है। इसी तरह से
 पौधे का चरमा छुड़ा कर उस जगह पर नया चरमा लगा
 चाहिए।

दो-तीन सप्ताह में ही ऐसा चरमा लग जाता है।

भेंट कलम (Inarching)—इसमें अच्छे गुण वाले
 की टहनियों साधारणतः स्वजातीय और कभी-कभी विजातीय
 के साथ बांध दी जाती है। आम के पौधे के साथ आम
 टहनियों का मेल स्वजातीय मेल का उदाहरण है। सपाट की
 का महुआ या खिरनी के पौधे के साथ बाँधना विजातीय
 का मेल कहा जायेगा। बीजू पौधा या तो गमले में लगाया
 है या जिस पेड़ से कलम बाँधनी होती है उसके नीचे मिट्टी
 छोटी ढेरी लगा कर उसमें लगा दिया जाता है। जब टहनियों
 हो, अथवा कलमी पौधा दूर भेजना हो तो गमले में 6
 बाँधिये, अन्यथा पेड़ के नीचे लगाना ही उत्तम होता है।
 प्रकार की फलमें 2-3 महीने में हो जाती हैं। इसलिए यदि

॥ १॥

में धीजू पौधा लगाया जाये तो उसे बराबर पानी देना पड़ता है और कभी-कभी ग्याद भी देना पड़ता है। मिट्टी में लगाये हुए पौधों को इतना जल्दी-जल्दी पानी नहीं देना पड़ता और घूँकि उसको जड़ों में फैलाव के लिए काफी स्थान मिलता है इसलिए ग्याद भी नहीं देना पड़ता। जो पौधे बाहर भेजे जाते हैं, उनकी जड़ें अधिक फैलने न पायें इसलिए गमलों में लगा देते हैं। जब फलम बांधी जाने वाली टहनियाँ बहुत ऊपर हों तो नीचे वाली मोटी शाखा के साथ गमला बांध दिया जाता है, या मचान पर भी रख सकते हैं।

बांध की क्रिया—धीजू पौधे की जड़ इतनी मोटी एक साल की आयु की स्वस्थ टहनियाँ चुन कर दोनों का मिला कर देख लेना चाहिए। बाद में दोनों पर चाकू से दो निशान ऐसे लगाये जायें जो एक दूसरे से दो इंच की दूरी पर हों। फिर पौधे पर ऊपर के कटाव से चाकू लगा कर हमें नीचे के कटाव तक इस भाँति लाओ कि छाल के साथ कुछ काष्ठ भी चला आवे। उसी भाँति फलमो टहनियों को भी छील दो और फिर पौधा और टहनियों के छीले हुए भागों को बराबर मिला कर इन्हें मोम में डुबा कर कपड़े की घञ्जी या गस्सी से बाँध दो। स्मरण रहे, कि कटे हुए भाग बराबर मिल जाने चाहिये। नहीं मिलने से या तो दो टहनियाँ जुड़ेंगी ही, नहीं और यदि जुड़ भी गईं तो पौधा कमजोर रहेगा। छार की हवा लगते ही टूट जायेगा। बराबर मिल जाने से छाया के नीचे के वृद्धि-कोष (Cambium cells) मिल जाते हैं और

ind) कहते हैं रिंग या ट्यूब्यूलर बडिंग द्वारा आइस का
 बुखारा आदि की कलमें लगाई जाती है। चैत्र मास में जब आ
 की नई कॉपलें निकलती हैं, उस वक्त जो चरमा लेना हो ऊ
 ऊपर-नीचे दो गोल चीरे इस प्रकार लगा दिये जायें कि ऊपर
 भाग कट जाये और नीचे का कटाव सिर्फ छाल को हटा
 जितना ही हो। फिर बायें हाथ से टहनी को पकड़ कर दा
 हाथ के अंगूठे और पहली अंगुली से चरमा खींचा जाये
 जल्दी से नली के रूप में निकल आता है। इसी तरह से दो
 पौधे का चरमा छुड़ा कर उस जगह पर नया चरमा बतार दे
 चाहिए।

दो-तीन सप्ताह में ही ऐसा चरमा लग जाता है।

मेंट कलम (Inarching)—इसमें अच्छे गुण वाले
 की टहनी साधारणतः स्वजातीय और कभी-कभी विजातीय पौधों
 के साथ बांध दी जाती है। आम के पौधे के साथ आम
 टहनी का मेल स्वजातीय मेल का उदाहरण है। मपाद की टह
 का महुआ या खिरनी के पौधे के साथ बाँधना विजातीय पौ
 का मेल कहा जायेगा। बीजू पौधा या तो गमने में लगाया जा
 है या जिस पेड़ से कलम बाँधनी होती है उसके नीचे मिट्टी से
 छोटी ढेरी लगा कर उसमें लगा दिया जाता है। जब टहनी ऊँच
 हो, अथवा कलमी पौधा दूर भेजना हो तो गमने में लगाना
 चाहिये, अन्यथा पेड़ के नीचे लगाना ही उत्तम होता है। इ
 प्रकार की कलमें २-३ महीने में हो जाती हैं। इसलिए यदि गमने

में धीजू पौधा लगाया जाये तो उसे घराबर पानी देना पड़ता है और कभी-कभी ग्याद भी देना पड़ता है। मिट्टी में लगाये हुए पौधों को इतना जल्दी-जल्दी पानी नहीं देना पड़ता और धूँक टमकी जड़ों में फेलाव के लिए काफी स्थान मिलता है इसलिए ग्याद भी नहीं देना पड़ता। जो पौधे बाहर भेजे जाते हैं, उनकी जड़ें अधिक फैलने न पावें इसलिए गमलों में लगा देते हैं। जब कलम बांधी जाने वाली टहनी बहुत ऊपर हो तो नीचे वाली मोटी शाखा के साथ गमला बांध दिया जाता है, या मचान पर भी रख सकते हैं।

बांध की क्रिया—धीजू पौधे की जड़ इतनी मोटी एक साल की आयु की स्वस्थ टहनी चुन कर दोनों का मिला कर देख लेना चाहिए। बाद में दोनों पर चाकू से दो निशान ऐसे लगाये जायें जो एक दूसरे से दो इंच की दूरी पर हों। फिर पौधे पर ऊपर के कटाव से चाकू लगा कर इसे नीचे के कटाव तक इस भाँति लाओ कि छाल के साथ कुछ काष्ठ भी चला आवे। उसी भाँति कलमी टहनी को भी छील दो और फिर पौधा और टहनी के छीले हुए भागों को घराबर मिला कर इन्हें मोम में डुबा कर कपड़े की धाँजी या रस्सी से बांध दो। स्मरण रहे, कि कटे हुए भाग घराबर मिल जाने चाहिये। नहीं मिलने से या तो दो टहनी जुड़ेंगी ही, नहीं और यदि जुड़ भी गईं तो पौधा कमजोर रहेगा। खोर की हवा लगते ही टूट जायेगा। घराबर मिल जाने से छाया के नीचे के वृद्धि-कोष (Cambium cells) मिल जाते हैं और

संयोग जल्दी हो जाता है। बांधने के पश्चात् बाँध पर कलमी मोम या कलमी मिट्टी लगा देनी चाहिए। जहाँ हवा बहुत चलती हो वहाँ पेड़ की टहनियों को भी बाँध गाड़ कर बांध देना चाहिए, ताकि पौधे और पेड़ की टहनियों में खींचातानी होकर रगड़ न लगे। जब मेल ठीक हो जाये तो बाँध के ऊपर से बाजू के सिर से और नीचे से टहनियों को काट कर पौधों की नर्सरी में हटा देना चाहिए। जब पौधा नर्सरी में लगाया जाये उस वक्त पुराने बाँध को काट कर नया बाँध देना चाहिए। ताकि बढ़ते हुए पौधे की छाल पुरानी बाँध से कट न जाये। जब सम्बन्ध भली-भाँति हो जाये तो रस्सी काटने के बाद चाकू से छील कर उसका निशान भी मिटा देना चाहिए। उपरोक्त रीति से आम और सफाई की कलमें होती है।

पेयन्द् बाँधना (Grafting)—इस क्रिया में बीज पौधे का सिरा काट दिया जाता है और उस पर किसी चुने हुए पेड़ की टहनियों लगा दी जाती है। जिस भाँति चरमा चढ़ाने की कई युक्तियाँ हैं वसी भाँति फलम बिठाने की भी कई युक्तियाँ हैं। मुख्य युक्तियाँ नीचे दी गई हैं।

(१) जड़ पर कलम बिठाना (Root-grafting)

(२) जड़ और घड़ के मेल की जगह बिठाना (Crown grafting)

(३) घड़ पर बिठाना (Stem-grafting)

(४) रंगारों पर लगाना (T...

इनमें से पहली दो युक्तियां बहुत कम व्यवहार में लाई जाती हैं। दूसरी दो से कभी-कभी लाभ उठाया जाता है। पुराने संतरे के पेड़ में नई टहनियां तीसरी रीति से और पुराने अथवा बंध्या आम से फल प्राप्त करने के लिए चौथी युक्ति काम में लाई जाती है। इन सब में मुख्य अभिप्राय यह रहता है कि बीजू पाँचे या पेड़ के धड़ अपना पोषण कर अच्छे फल देने लगे। जब कलम और स्तम्भ की मोटाई एक-सी होती है तो निम्न-लिखित क्रियाओं द्वारा सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है।

साधारण कलम (Splice-grafting)—स्तम्भ और कलम को तिरछे काट से मिलाना।

जीभी कलम (Tongue-grafting)—उपरोक्त रीति से काट कर दोनों के बीच में लम्बा चीरा लगा कर इस रीति से मेल किया जाये कि जिसमें तीन सतह हो जायें अथवा स्तम्भ में जाली का आकार बनाकर उसमें बैठने जैसी कलम को छील कर लगाना, यानी उल्टी काठी कलम लगाना।

काठी कलम (Saddle-grafting)—स्तम्भ के दोनों बाजू में घुरा बत्ता कर बीच में पैनी धार-भी बनाना और उन पर बैठने जैसा बटाव कलम में लगाकर बैठाना।

जब धड़ मोटा होता है तो उसे चीर कर उसमें एक या दो कलमों को बाजू पर लगा दी जाती है (Cleft-grafting) अथवा ऊपर से बाजू लगा कर दाब पुड़ा कर उसमें कलम बिटला दी जाती है (Ring or side-grafting) वही जाती है।

पुराने पेड़ की टहनियों में नई कलमें जब कनेक्ट प्राविष्ट या गिड प्राविष्टग द्वारा बांधी जाती हैं तो इस क्रिया को 'टाप वर्किंग' (Top-working) कहते हैं।

उपर्युक्त रीति में से छिन्नी भी क्रिया द्वारा जब कलम बिठाना होती है तो फिर मोम-रंजित घग्गी या रस्सी से बांध दी जाती है और पाप पर कलमी गाम या मिट्टी लगा दी जाती है, जिससे कोई व्याधि आक्रमण न कर सके।

टाप वर्किंग—भारतवर्ष में यह क्रिया पुराने आम के वृक्षों में नई टहनियां लगाने के लिये कहीं-कहीं ठीक सिद्ध हुई हैं। इसके लिये पुराने पेड़ की काट-छांट इस प्रकार की जाती है कि जिसमें नई टहनियां जमाने पर पेड़ का आकार ठीक बना रहे। जिन टहनियों में कलमें बांधी जाती हैं वे करीब आधा इंच मोटी होनी चाहिए। कलमें बांधने वाला पहले आवश्यकतानुसार कलमें तयार कर उन्हें पानी में भिगो कर गीले कपड़े में रख लेता है। फिर वे कलमें, एक तेज चाकू, रस्सी या कपड़े की धज्जियां और एक हाथ लम्बा सोटा एक टोकरी में रख कर अपने साथ पेड़ पर ले जाता है। जिस टहनियों पर कलम बांधनी होती है उस पर चाकू रख कर सोटे से ठोकता है, टहनियां फट जाती हैं जिसमें कलम बिठला कर चाकू खींच लेता है और बांध देता है। बांधने के बाद कलमी मोम लगा दिया जाता है।

पौधे लगाने का समय—जहाँ तक हो पौधे उसी दिन लगा

—जिनमें जिस दिन नसरी से उन्हें हटाया जाये। यह क्रिया

हो समय है जहां पौधों का जन्म-स्थान और लगाने का स्थान दूसरे के निकट हों। यदि पौधे बाहर भेजने हों अथवा अन्य किसी कारण वशा उस रोज न लगाये जा सकें तो उनके बचाव। पूरा प्रयत्न होना चाहिए ताकि उनमें ऐसी निबलता न आये कि सम्हल हो न सकें। प्रत्येक पौधों की जड़ों के साथ मिट्टी रहना बहुत जरूरी है। मिट्टी सूख कर बिखर न जाये मलिये घाम, चट्टी या केने की छाल में बांध कर रखना चाहिए और थोड़ा-थोड़ा पानी भी देते रहना चाहिए जिससे मिट्टी में खरो नी रहे। बाहर से आये हुए पौधों को जल्दी लगाने का अवकाश हो अथवा स्थायी भूमि तैयार करने में कुछ विलम्ब हो, या कमखोर दर्राई हों तो उन पौधों को तुरन्त खोल कर नर्सरी में लगा देना चाहिए। फिर जब स्थायी जमीन में लगाना हो, तो खरो से उठाकर निर्धारित स्थान पर लगा सकते हैं।

पौधे लगाने का साधारणतः उत्तम समय वर्षा और शीतकाल का प्रारंभिक या अन्तिम समय ठीक होता है। गर्म जाड़े में लगाने में अधिक सर्दी या पाला पड़ने से पौधों के मर जाने का भय रहता है। गर्मी में सिंचाई का पूरा प्रयत्न हो तो जाड़े के अन्त में और नही तो बरसात में ही लगाना चाहिये। चाइ फाल्गुन आदि जा पेड़ जाड़े में खरने पत्ते गिरा देते हैं, उन्हें जाड़े में ही लगाना ठीक है।

पौधे लगाने की रीति—पौधों की जड़ का पौड़ाव के अनुसार दो-तीन फीट खाना के छोर खनने हो गहरे गहरे

निर्धारित स्थान की दूरी पर गर्मी में अथवा लगाने के कुछ सप्ताह पूर्व तैयार करा लेना चाहिए। खोदी हुई मिट्टी को दो-तीन सप्ताह तक धूप और हवा खिलाने के पश्चात् नीचे की दो-तिहाई मिट्टी में खाद मिलाकर उसे गढ़े में डाल करके ऊपर से दूसरी एक तिहाई मिट्टी भरवा देनी चाहिए। प्रत्येक गढ़े की मिट्टी में ऊँचा कि खाद क वर्णन में दिया गया है, पेड़ की उपयोगितानुसार बीम सेर से एक मन सड़ा हुआ गोबर का खाद और दो-ढाई सेर हड्डों का चूर्ण मिलाना चाहिए। फलों के लिए हड्डी का खाद बड़ा अच्छा होता है। क्ररीव-करीव सभी प्रकार के फलों को उपर्युक्त मिश्रण से लाभ पहुँचता है।

खाद मिला देने के पश्चात् गढ़ों को भरवा देना चाहिये और जब दो-एक बारिश के बाद मिट्टी जम जाये तब पौधों की जड़ों की जमावट इतनी मिट्टी खोद कर पौधे लगाने चाहिये। पौधे लगाने समय यह देखना चाहिये कि जड़े मुड़ने न पायें और थोड़ी-थोड़ी मिट्टी डाल कर उनको दबा दिया जाये, ताकि मिट्टी के साथ जड़ों की पकड़ अच्छी हो जाये और कोई जगह खाली न रह जाये। जड़ के निकट खाली जगह रह जाने से वह सूख जाती है। इस रीति से जब गढ़ा भर जाये और मिट्टी दबा दी जाये तो पानी देकर बाद में २-३ इंच मोटी तह ढीली मिट्टी के ऊपर दे देनी चाहिए। इस तह से एक तो धूप से पानी उठने नहीं पायेगा और दूसरे यदि कहीं मिट्टी दनी तो इस मिट्टी में वह जगह भर जायेगी और सब मिट्टी समान की मगद के बराबर

दो-चूरी कलमें लगाते समय हम घात का ध्यान रखना
 दिए कि जिस स्थान पर बीजू पौधे के साथ कलम बाँधी हो
 स्थान जमीन में ठहर रहे ताकि बीजू पौधे से यदि कोई शाखा
 कल जाये तो वह तोड़ दी जाए ।

सहारा (Staking — पौधे लगाने के पश्चात् वे सीधे
 खड़े रहें और हवा से टेढ़े न हो जायें अथवा गिर न पड़ें इसलिए
 सहारे की आवश्यकता होती है । इसके लिए पौधे के धड़ से
 ०-१२ इंच की दूरी पर दोनों ओर मजबूत बाँस या लकड़ियाँ
 गाड़नी चाहिये और उनके ऊपरी मुँह एक और लकड़ी से जोड़
 देने चाहिये । इस लकड़ी के बीचों-बीच यदि पौधा बाँध दिया
 जाए तो वह सीधा रहेगा । सहारे के लिए स्वयं आवश्यकतानुसार
 लकड़ी लेकर गाड़ सकते हैं ।

फलदार पेड़ों के बीच की फालतू जमीन में इच्छानुसार
 तरकारियाँ मटर, टमाटर, मिर्च आदि बोकर उनसे भी लाभ
 उठाया जा सकता है ।

प्रकरण ७

काट-छांट

फलादार वृक्षों के काट-छांट की भी आवश्यकता होती है। यह दो प्रकार से की जाती है। एक जड़ों की और दूसरी शाखाओं की।

जड़ों की काट-छांट — जड़ों की काट-छांट परोक्ष रूप से जुताई और खाद देने के समय होती रहती है। अपरोक्ष रूप से इस क्रिया का उपयोग उस समय किया जाता है जब पेड़ पुराना हो जाता है या फल न देकर पौधे टहनियाँ और पत्ते ही अधिक देते हैं। ऐसे पौधों की जड़ों की काट-छांट पतझड़ के समय करनी चाहिए। पेड़ों को अधिक ऊँचा न बढ़ने देकर उनकी जड़ों की काट-छांट करनी पड़ती है। स्थानान्तर किये जाने वाले पौधों की जड़ों की काट-छांट भी की जाती है, ताकि उनकी जड़ें अधिक दूर तक न फैल जायें। कभी-कभी बीजू पौधे जब पेड़ों के नीचे कलम बांधने के लिये लगाए जाते हैं तो उनकी मूसला जड़ें काटनी पड़ती हैं, ताकि फैलने वाली जड़ें ज्यादा बनें और अपना भोजन ऊपरी जमीन से लेती रहें।

बड़े पेड़ों की जड़ों की काट-छांट करने के लिये पेड़ के घड़ के नीचे लगावतसार तीन हाथ से पांच हाथ की दूरी पर

में और एक हाथ चौड़ी और डेढ़ हाथ गहरी खाई खोद कर
ना चाहिए और जड़ें ज्यादा हों तो कुल्ल को तेज छुरे से काट
ना चाहिए। इस खाई को २-३ सप्ताह तक खुली रख कर
गली हुई मिट्टी में खाद मिलाकर पुनः उसी में भर देना
है।

शाखाओं की काट-छांट--शाखाओं की काट-छांट कई
एकों से की जाती है। लेकिन यह काट-छांट वृक्षों की जाति पर
रहै।

पहली काट-छांट पेड़ों के सुन्दर आकार के लिए की जाती
जिन शाखाओं की याद अधिक हो, जो घनी हों, अथवा
धीरे २ बढ़ने वाली हों वे काट दी जाती हैं और साधारण
वाली को छोड़ दिया जाता है, ताकि पेड़ का पैलाव चारों
परावर हो। ऐसा करने से पौधों को रोशनी, धूप और हवा
झी मिलती है और उनके अंग-अंग मजबूत हो जाते हैं। फल
बड़े, सुन्दर रंग वाले और अधिक संख्या में प्राप्त होते हैं।
धी रक्षा का प्रबन्ध भी सुचारु रूप से किया जा सकता है।
इयकता पड़ने पर चारों ओर औपधियों का छिड़काव भी
की जा सकता है।

उपरोक्त प्रकार की काट-छांट की ओर प्रारम्भ से ही ध्यान
ना अच्छा होता है। आड़, खरदाल, नासपाती, सेव इत्यादि
पौधे, जिनमें बड़े पेड़ों में काट-छांट बराबर करनी पड़ती है,
डेढ़-दो फीट ऊँचे हो जायें, तो उनके बीच वाला कोपल सोढ़

देने से धड़ में से नये कोंपल निकलेंगे। इन नये कोंपलों में से ४-५ फीट रख कर शेष को धड़ के निकट से ही तोड़ देना चाहिये जो ४-५ रखे जायें उन्हें भी इस रीति से रखना चाहिये कि वे धड़ के चारों ओर रहें। ऐसा करने से पेड़ छोटे और मजबूत होते हैं और शाखाओं का फैलाव भी चारों ओर बराबर हो जाता है। पेड़ों के अधिक ऊँचे न होकर छोटे ही रहने में अनेक लाभ हैं। उनकी काट-छाँट आसानी से हो सकती है। फल सहूलियत से तोड़े जा सकते हैं। लू या पाले से रक्षा की जा सकती है। आवश्यकता पड़ने पर औपधियाँ अच्छी तरह छिड़की जा सकती हैं।

नींबू, माल्टा, सन्तरा इत्यादि जैसे पेड़, जिनमें बड़े पेड़ों में काट-छाँट विशेष नहीं करनी पड़ती, उनके पौधों के बीच की कोंपल तीन-चार फीट ऊँचाई से तोड़नी चाहियें और धड़ पर पाँच-छः कोंपल छोड़नी चाहियें।

आम और लीची इत्यादि पेड़ जिनके बीच की टहनी और बाजू की टहनियाँ करीब-करीब एक साथ ही बढ़ती हैं और जिनमें विशेष काट-छाँट की आवश्यकता नहीं होती उनके पौधों के बीच के कोंपल नहीं तोड़ना चाहिये, सिर्फ यह देखना चाहिये कि धड़ पर पाँच-छः कोंपल से अधिक न हों। उपरान्त आवश्यकतानुसार छोड़ देने की चाहियें। ये इतनी अधिक न हों जिनमें हवा का आवागमन और प्रकाश रुके; और न इतनी कम हों कि बहुत-सी जगह खाली रह जाये और सूर्य की तेज धूप से नई कोंपलों को हानि पहुँचे।

दूसरी काट-छाँट मूरी, व्याधिग्रस्त और कीट भक्षित या आक्रमित शाखाओं की की जाती है, ताकि घंकार शाखायें टूटा ली जायें और कीटादि नष्ट हो जायें ।

तीसरी काट-छाँट उस समय की जाती है जब वृत्तों में शाखाओं और पत्तों की घाट अधिक हो और पेड़ कम फलते हों । ऐसी स्थिति में कुछ शाखाओं और कुछ जड़ों की काट-छाँट कर दी जाये तो पेड़ भली-भाँति फल देना आरम्भ कर देते हैं ।

कभी-कभी अधिक फल देने वाले पेड़ों की शाखाओं की काट-छाँट भी करनी पड़ती है, ताकि अन्य जो शाखायें है वे स्वस्थ हों । जब पेड़ की शक्ति पत्तों को बनाने में लग जाती है तो शाखायें स्वस्थ नहीं होती और कभी-कभी मारे बोम्ब के टूट भी पड़ती है । ऐसी स्थिति में फल वाली कुछ टहनियाँ काट दी जाती हैं । बहुत ही ऐसा भा होता है कि पेड़ों को आराम देने के लिए शाखाओं और जड़ों की छंटनी करनी पड़ती है । बहुत से पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी याद घराघर बनी रहती है, किन्तु फल कम आने लगते हैं । उनमें अधिक फल प्राप्त करने के लिए कुछ समय तक पानी रोककर जड़ों और शाखाओं की काट-छाँट करनी पड़ती है; जैसा कि आटे, आलू, पुस्तारा के लिये किया जाता है ।

। इस तीसरी प्रकार की काट-छाँट का सम्बन्ध ग्राद से भी है । जब फल अधिक आने हों और शाखायें कमजोर हों तो नवजन-पूर्ता ग्राद देना चाहिये और जब शाखाओं की घाट

अधिक ही और फल कम आते हों तो स्तुर और पेट खाद देना लाभप्रद सिद्ध होते हैं)।

चौथी काट-छांट उस समय की जाती है जब फल प्रायः जाते हैं, जैसी कि लीची की होती है। फल डालियों से न निकल जाते हैं क्योंकि जिस टहनियों में फल आ जाते हैं, फिर नई फलती। नई टहनियां ही फल देती हैं। काट-छांट से नई टहनियां बहुत निकलनी हैं।

पाँचवीं काट-छांट कलम बाँधने के लिए की जाती है। पुराने बड़े वृक्षों में जब फल नहीं आते तो उनकी टहनियां काट कर नई कलमों में बाँध दी जाती हैं।

छठी काट-छांट कलियों की होती है। जब किसी शाखा पर आवश्यकता से अधिक फलों की कलियां निकल आती हैं तो उन्हें तोड़ दिया जाता है।

सातवीं काट-छांट पेड़ों के तनों की छाल की होती है, बहुत आम के पेड़ों में ऐसा देखा जाता है। जब पेड़ों में फल नई आते और पत्ते व शाखाएं बहुत बढ़ती जाती हैं तो जमीन से ३-४ फीट की ऊँचाई पर दो इंच चौड़ी छाल जगह-जगह चारों ओर काट दी जाती है। अगर पूरी छाल छुड़ाई जाये तो इस रीति से छुड़ाना चाहिए कि एक जगह आधे धड़ तक छुड़ा कर उससे कुछ ऊपरी दूसरी ओर ये आध भाग की छुड़ाई जाए। एक ही जगह पूरे चक्कर के रूप में छाल छुड़ा देने से यदि कहीं कटाव काफी गहरा हो जाये तो पेड़ के मर जाने का भय रहता है। पेड़, जड़ द्वारा ली हुई खाद पदार्थों को पत्तों तक पहुँचाता है, वहाँ पर उनके पोषणार्थे भोजन तैयार होता है और यह फिर

दूसरे अंगों में यानी फल, फूल, शाखाएँ, घड़ और जड़ों इत्यादि के लिये जाता है। जब इसकी चाल जड़ों की तरफ अधिक होती है तो पेड़ नहीं फलते। छाल के काट देने से जड़ों की तरफ जाने वाले हमके मुख्य मार्ग बन्द हो जाते हैं और इसका उपयोग फल बनाने में हो जाता है।

इनके सिवाय जब पेड़ों पर उनके शत्रु, पौधे (Parasites) लग जाते हैं तो उन्हें हटाने के लिए भी थोड़ी-बहुत काट-छाँट करनी पड़ती है, जैसे अमरबेल (Dodder) का लगना या आम पर लाल फूल वाले पौधे (Loranthus) इत्यादि के जमने पर उन्हें पृथक् करना।

काट-छाँट कैसे की जाये

मोटी या बड़ी शाखा जब काटनी हो तो उन्हें आरी से काटना चाहिए। कटाव घड़ के बिल्कुल पास या जिस शाखा से यह शाख निकली हो उसके निकट से ही लेनी चाहिए ताकि काटने के बाद कोई टूँठ न रहने पाये। ऐसी शाख को काटने से पहले नीचे की ओर करीब डेढ़-दो ईंच की दूरी पर एक कटाव लगा देना चाहिये और फिर ऊपर से आरी चलानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जायेगा तो कटती हुई शाख गिरते ही अपने साथ घड़ की भी कुछ छाल लिये हुए गिरेगी और इससे पेड़ को हानि पहुँचेगी। जब शाख गिर जाए तो टूँठ रह जाये उसे भी काट कर धराधर कर देना चाहिए। नीचे का कटाव पड़ले से ही घड़ के निकट दे देना चाहिए, परन्तु ऊपर से आने वाली आरी का कटाव उसे मिल जाना चाहिए। यदि शाख बहुत बड़ी हो तो

उसके छोटे-छोटे टुकड़े करके काटना चाहिए, नहीं तो बड़े
समय अपने साथ कई छोटी शाखाओं को लेती हुई
पतली शाखायें पेड़ छाँटने की कैंची (Tree furcer) से
छोटी २ शाखायें छोटी कैंची (Secateurs) से काटनी
तेज छुरे या चाकू से या हंसुआ से भी छोटी टहनियाँ
सकती हैं। काट-छाँट के बाद हर एक कटे हुए स्थान पर चरस
(Coal-tar) या सफेदा (White lead) और तेली (मक्खन)
का उबला हुआ तेल लगाकर छोड़ना चाहिए, ताकि वहाँ
ब्याधि का आक्रमण न हो।

काट-छाँट का विषय बड़े महत्व का है इसके लिए ब्रह्मा ही मुख्य क्रियात्मक अनुभव होना बहुत जरूरी है। ब्रह्मा का भी बढ़ाया जा सकता है। यदि काट-छाँट साधनी पूरी हो लिखी जायें तो हम एक ही विषय पर एक पुस्तक लेका दे जायें। स्थानान्तर के कारण यहाँ पर आदर्शक बातें ही सीधी में लिखी गई हैं। साधारणतः यह ध्यान रखना चाहिये कि जिस पेड़ों के पत्ते माल में एकबार गड़ जाते हैं या गड़ाना आसानी होता है उनमें प्रति वर्ष कई बार के मार-म होने के पक्षों का छाँट होना चाहिये। जो पेड़ गड़ हो गये हैं, उनमें विशेष काट-छाँट नहीं करनी पड़ती। इसी भाँति ये पेड़ जो पड़ने के ठीक बाद-बाद और बीतान के पक्ष बाजार-बाजार क्षेत्रों में हो गये हैं। इनके ठीक बाद-बाद जाने पेड़ों को काट-छाँट करके बाजार करने वाले पेड़ों को विशेष कुछ आधिकारिक करनी पड़ती है।

प्रकरण ८

वर्गीकरण और खेती की विस्तारित रीति

पत्तों के पृष्ठों का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया जा सकता है। यथा—

(१) वनस्पति शास्त्रानुसार—इस रीति से वर्ग निर्माण में कुछ अंश तक पेड़ों के गुण-अवगुण तथा उनके संबंधन की रीति और र्याद की मांग का पता चलता है।

(२) पृष्ठों के आकारानुसार—इसका विस्तार पूर्वक वर्णन पहले ही किया जा चुका है।

(३) उपयोगानुसार यथा—

(क) ताजे पत्त—जोकि पकने पर माजे ही खाये जाते हैं।

(ख) सूखे पत्त—पत्तों के पक जाने पर उन्हें सुखा लेते हैं और तब व्यवहार में लाते हैं।

(ग) अन्य उपयोग—इसमें उन पत्तों की भोली है जो पटनी-मुरब्बा आदि के काम आते हैं।

इन तीनों में से पहली रीति से वर्ग निर्माण करना अच्छा है, परन्तु पत्तों की जाति के नाम हिन्दी या अंग्रेजी दोनों भाषाओं में नहीं है। वे सब लैटिन भाषा में हैं, इसलिए जन-साधारण के लिये उनका उपयोग लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकता। इस दुसरे

में हमने तीसरी रीति का उपयोग किया है और फलों में से फल चुने गये हैं जो अधिकतर यहां होते हैं।

तीसरे वर्ग के पृथक-पृथक उपवर्ग में निम्नांकित फल शामिल हैं।

ताजे फल—अंगूर, अनार, अनानास, अमरुद, आम, आड़ू, ककड़ी, कटहल, कमरुख, केला, खजूर, खिरनी, गुआ, जामुन, चकोतरा, तरबूज, तुरंज, तेंदू, दिलपसंद, नासपाती, नींबू, पपीता, फालसा, बिही, घेर, बेरी (गूज-बेरी, बोक बेरी, सूखी बेरी, रामफल, रेंदा, लीची, लोकाट, शफाल, शरीफ, सन्तरा, सपाट्ट, सिंघाड़ा और सेब इत्यादि।

सूखे फल—अखरोट, अंजीर, काजू, खुथानी, चिलगोश, चिरींजी, नारियल, पिस्ता और बादाम इत्यादि।

चटनी-मुग्घा आदि के फल—आलुबुखारा, औरंग, इमली, कर्गैदा, कंध, वाम्पी (आमपीच) इत्यादि।

उपरोक्त वितरण को बिल्कुल सीमायुक्त ही नहीं समझ लेना चाहिए। क्योंकि इनमें से बहुत-से फल ऐसे हैं जो ताजे भी खाये जाते हैं और सुखाकर भी, अथवा उनसे चटनी, अचार, मुग्घा आदि भी बनाये जाते हैं, जैसे आम। इसी भाँति अंजीर के गणना ताजे और सूखे दोनों प्रकार के फलों में की जा सकती है।

ताजे फलों की खेती

अंगूर (Grapes—Vites vinifera)

अंगूर का प्राचीन देश अमेरिका माना गया है। इसकी खेती प्रायः देशों में भी अधिकतर होती है।

सीमाप्रान्त और बिलोचिस्तान की तरफ के अंगूर अच्छे होते हैं। दक्षिण में नामिक, पूना, औरंगाबाद आदि स्थानों में भी अंगूर होते हैं।

फलों का रंग आकार, स्वाद और छिलके की मोटाई के अनुसार अंगूर कई तरह के होते हैं। परन्तु साधारणतः हम इन्हें दो भागों में बाँट सकते हैं। अथान्—एक बिना बीज के और दूसरे बीज वाले। बिना बीज के बहुधा हरे या मोतिया के गोल और छोटे दानों के होते हैं। बीज वाले हरे मोतिया, काले या बैंगनी रंग के गोल या लम्बे दाने वाले पहले की अपेक्षा बड़े होते हैं।

अंगूर का पौधा ढाली, दाब कुलम या गूटी से तैयार किया जाता है। इसके लिए एक साल की उम्र की स्वस्थ टहनी जिसकी छात्र का हरा रंग मिट कर भूरा हो गया हो, काम में लानी चाहिए। ढाली बरसात में और गूटी वर्षा के अन्त में लगाने चाहियें। पौधों का चालान देवदारु के बक्कों में किया जा सकता है।

भूमि और खाद—दुमट भूमि में यह अच्छा होता है। जिस मिट्टी में पानी लगता हो अंगूर ठीक नहीं होते। गर्मी में चार सौ मन गोबर का खाद और लगभग तीन मन हड्डी का खाद (या चूरा) प्रति एकड़ के हिसाब से डाल कर जुताई अच्छी तरह करवानी चाहिए। अंगूर के लिये मटली का खाद भी बहुत अच्छा रहता है। चार भाग सरसों या एरंडी की रखी में एक

अगर वही का गुण जितना दुबला मिश्रण तब इस में वही के
कोई मरना मत दे दिया जाये।

बोझा मीठा—बोझा में का जड़े के अलाव में २८ से
के अलाव पर कलमें या बोझे लगाने चाहिए। अगर के पत्तों
जिसे कुछ मरने का खतरा कमजोर होता है। इनके जिसे ही
को २५०, ५५० या १००० लगाने होते हैं। अगर तो यही
कि २५० जोड़ ऊंची दूधवाँ लगाने की जावे ताकि लगा को पूरा और
इस में पूरी मिलती रहे और पत्तों के मोड़ने में भी मदद
हो। कहीं कहीं मिर्चा लगाने की दर ईट-पुने के समान कमजोर
जलमें एक या दो बार लगा दिये जाते हैं और लगा तार के साथ
पर बढ़ा दी जाती है। बोझा लगाने की तरह अंगूर के पत्तों के
पारी और मिर्चा की ऊंची दीवार बना दी जाती है और साथ
इसमें बोझे मथानों पर बढ़ाई जाता है कि पुटनों के वन वन
वर वस मोड़ जिये जायें। बर्सा मान्त में कहीं-कहीं पंगला
(*Erythrina indica*) नाम का पेड़ अंगूर की लता के साथ
लगा दिया जाता है जिस पर लता बढ़ जाती है। बर्सा के पूर्व
दस्ता की ६-६ फीट लम्बी फलमें अंगूर के पेड़ से नौ-दस ईंच
की दूरी पर लगा दी जाती है। अंगूर की जड़ गहरी खोली जाती
है और इनकी दिखली होती है। इसलिए अंगूर की लता को
हमिन्दी बुँवती।

निर्धार्य और काट-छाँट—सिंचाई आवश्यकतानुसार होनी

चाहिये। सब फल पकने लगें तब पानी नही—

क्योंकि ऐसा करने से मवाद बिगड़ जाता है। जब पौधा लग जाये तो बीच की फुनगी तोड़ देनी चाहिए, ताकि नये कोपल फूट जायें। प्रति वर्ष फल मिल जाने के पश्चात् अथवा जाड़े में जिन टहनियों में फल मिल जाय उन्हें पाँच-छः इंच छोड़ कर आगे का शेष भाग काट देना चाहिये। इन छोड़ी हुई टहनियाँ में से जो नई टहनियाँ निकलती हैं उन पर अंगूर बँठते हैं। जब फल के गुच्छे बैठ जायें तो उनके आगे एक-दो इंच टहनी छोड़ कर बाकी काट देनी चाहिए। ऐसा करने से फलों की वाढ़ अच्छी होती है। फल बैठ जाने पर लता के तने पर तार या सुतली बांध दी जाये तो पत्तों द्वारा जो भोजन तैयार होता है और जिमका कुछ भाग जड़ों के पोषणार्थ नीचे की ओर जाता है उसमें कुछ रुकावट हो जाती है और उसका उपयोग फलों की बनावट लिए हो जाता है। फलों का आकार बढ़ जाता है और कुछ मिठास भी अधिक हो जाती है। अंगूर को पाले से भी विशेष हानि पहुँचती है। इस-लिए जब पाला गिरने के लक्षण दिगवाई दें तो पूर्व वर्णित ढेरियों में आग लगा कर धुआँ करना चाहिये।

फल की तयारी और चालान—कलम लगाने के समय से दो-तीन साल की आयु की होने पर लतायें फलने लगती हैं और ४०-४५ साल तक अच्छी फलती रहती हैं। फल आने के समय से ४-५ महीने में फल तैयार होते हैं। एक-एक पेड़ से १०-१२ सेर बढ़िया अंगूर मिल जाते हैं। सीमाप्रान्त की तरफ अंगूर भाद्रपद और आश्विन में प्राप्त होते हैं। मैदानों में जो

जमाने में पालन होने दे। वर कम होनी दे। दलित जमाने में मध्य जमाने (कारवी) में अंगूर मिलने शुरू हो जाते हैं।

अंगूर का जल बहुत कोमल होता है, इसलिए छोटी-छोटी टोकरियों में या जमाने गूदे के परतों में पाँच-छः मेर के समान मरीचक भाग या केने के गूदे जमाने के साथ भरकर भेजना चाहिए। विभिन्न भाषाओं के लिए एक-एक मेर की टोकरियाँ बना कर उन्हें इकट्ठी रग कर ढोटे में भेज सकते हैं। प्रत्येक गुच्छे में में दो-तीन बीजों में मराम और बहुत छोटे अंगूर काट देने चाहिए गुच्छों को मग या तोड़ना चाहिए जबकि वे कभी-कभी एक चुके, अर्थात् तोड़ने पर २-४ रोज बाद उपयोग के योग्य हो जायें। गुने हुए अंगूर छोटी टोकरियों में रुई में भी भेजे जाते हैं।

उपयोग और गुण—ताजे फल ऐसे ही खाये जाते हैं। दार (सूखे अंगूर) औषधि और मिठाई आदि में छालने के काम आती है। अंगूर पल्लवों के और ग्रासी व बुखार को मिटाने वाले होते हैं। वायुजनित रोग में भी इनका सेवन करना चाहिये। ये आँखों के लिये हितकारी और दस्तावर होते हैं। अंगूर रक्त-शोधक होता है।

अनार दाड़िम

(*Pomegranate-punica granatum*)

अनार हमारे देश में प्रायः सभी जगह पाये जाते हैं। परन्तु मसकनी या काबुली अनार जैसे मोठे और छोटे बीज वाले होते हैं, वैसे नहीं होते। अहमदाबाद के आसपास धौलका के

निकलवर्ती स्थानों में जो अनार होते हैं वे अपने बीज की मिठास और नमी के लिये प्रसिद्ध हैं। वहां पर यदि काबुली अनार लगाये जायें तो बहुत ही कम फलते हैं और मसकती जाति तो बिल्कुल फलती ही नहीं। अनार के पौधे बीज डाली या दाब कलम से तैयार किये जाते हैं। बीज और डाली बपोकाल में और दाब कलम जाड़े के अन्त में लगानी चाहिए। इसके पौधे मजबूत होने के कारण टोकरियों में भेजे जा सकते हैं।

भूमि और खाद—यों तो ये सब प्रकार की जमीन में हो जाते हैं, परन्तु कच्चार और अधिक खटिक वाली भूमि में अच्छे होते हैं। गर्मी में खेती की जुलाई के पश्चात् पन्द्रह २ फीट के अन्तर पर दो ढाई फीट गहरे और उनमें हो व्यास के गड़े बना कर उनकी मिट्टी में आधा मन के लगभग गोबर का खाद और दो सेर के लगभग दूधो का चूर्ण और यदि अम्लदार मिट्टी हो तो उसमें सेर के करीब बुझाया हुआ घूना मिला देना चाहिए। पेड़ों में प्रति वर्ष पौष-माघ में आठ-दस सेर खाद दिया जा सके तो अच्छा है।

पौधे लगाना—उपर्युक्त रीति में तैयार किये हुये गढ़ों में दो साल की आयु के पौधे घरसात में लगाने चाहियें।

मिचार्ड और काट-छाँट—मिचार्ड आवश्यकतानुसार होनी चाहिये। काट-छाँट जाड़े के प्रारंभ में सूर्यो, तथा घनी और उन टहनियों की जिनमें मिलने की आशा हो, थोड़ी-थोड़ी काट-छाँट करना चाहिये।

कमल की तैयारी—गेपने के समय से चार-पांच सप्ताहों तक फल देने योग्य हो जाते हैं। चालीस-पचास साल तक जीवित रह सकता है। मध्य परसात से फल आना शुरू है। प्रायः दो-तीन महीने तक आते रहते हैं। बहुत से अनार ऐसे हैं जो पकने पर फट जाते हैं। कुछ सिर्फ अपना रंग बदलते पड़ने तक होते हैं, पकने पर लाल या कुछ मसुरी लिये हुए जाते हैं। पंद्रहवार औसत दर्जे पचास-साठ अच्छे फल एक पेड़ से प्राप्त हो जाते हैं।

चालान—फलों की टोकरी, चटाई, क्रेट या बक्सों में रखकर उनके चालान किया जा सकता है। ये जल्दी सड़ा जाते हैं। दूर भी भेजे जा सकते हैं।

उपयोग और गुण—रस चूम कर बीज फेंक दिये जाते हैं। अनार का शरबत भी बनाया जाता है, जो गर्मी में ठंडा होता है। यह औषधि में भी उपयोग किया जाता है। पेड़ की छाल चमड़ा रंगने के काम आती है। फूल की पंखड़ियां जो गिर जाते हैं, इकट्ठा करके रंगाई के काम में लाई जाती हैं।

अनार ठंडा, त्रिदोषनाशक, हृदय रोग, ज्वर, दाह और कंठ-रोग में लाभदायक है। यह कृमिनाशक भी होता है। दिलका पेचिश रोकने के लिये औषधि के रूप में सेवन कराया जाता है।

अनानास (Pineapple—Ananassa sativa)

आसाम, बंगाल, मलाबार-तट, लंका और मध्य प्रदेश में इसकी विशेष पैदावार होती है। यह पहाड़ों पर खी-कहीं हो जाता है।

मैदानों में जहाँ तरी है वहाँ यह अच्छा होता है। इसके पौधे जड़ के पास से निकलने हुए नये पौधों (Suckers) द्वारा तैयार किये जाते हैं। पौधों के सिरे पर जो पोच (Bulb-bills) निकलते हैं उनसे भी पौधे तैयार किये जा सकते हैं। लेकिन इन पौधों में यह दोष होता है कि वे देरी से फलते हैं। पौधे टोक-रियों में भेजे जा सकते हैं।

भूमि और खाद—मुली हुई दुमट या धलुआ-दुमट अम्ल-धाली मिट्टी इसके लिये अच्छी होती है। गोधर का खाद तीन मौसम जिसमें एक शतांश दृढ़ी का पूर्ण और इतनी ही राख मिला कर ढालनी ठोक होती है। फिर जुताई के पीछे बीन-बीन फीट की दूरी पर नालियाँ बनवाकर उनसे निकली हुई मिट्टी से बीच की भूमि ऊँची कर देनी चाहिये वहाँ आरम्भ होने पर प्रति पौधा एक मुट्ठी मरसों, नीम या परण्टी की खली दे दी जाये तो फलों की खाद अच्छी होती है। मटली का खाद भी इसके लिये अच्छा रहता है। यदि आसानी से मिल सकें तो टाल सकते हैं। इन्द्रिय खाद में मन सदा मन एमोनियम सल्फेट या सोडियम नाइट्रेट एवं मन के लगभग सुपरफॉस्फेट और उतनी ही मात्रा में पोटे-शियम सल्फेट प्रति एकड़ के हिसाब से देना चाहिये।

पौधा रोपना — उपरोक्त रीति से तैयार की हुई नालियों के बीच की ऊँची भूमि पर सबसे दो-दो फीट की दूरी पर ४-५ ईंच गहरे भाइर-आइवन (कमल-मिटर) से लगाने चाहिये। सबसे लगाने से पहले उन्हें छुने जायें कि जो लम्बा और खाद

हो। पट्टा में छे मध्यम नदी चुनने चाहिये। मध्यम को मुला पौ
में अलग करके नीचे के पौ छोड़ देना चाहिये। कुछ दिन तक
मुला हवा में धोड़ कर तब लगाने में अच्छा रहता है।

मिर्गाई और काट-छांट-पौधे लगाने के समय से आत-
म्यकमानुसार मिर्गाई करनी चाहिये और जब फल बैठने लगे तब
से पानी जल्दी-जल्दी देना चाहिये। हर तीसरी चौथी फसल के
बाद जमीन बदल देनी चाहिये।

फल की तैयारी-लगाने के बाद बारह में पन्द्रह महीने
में फल मिजना आरम्भ हो जाता है। प्रतिवर्ष आवण-माद्रपद
में फल मिजने रहते हैं। पके हुए फल रंग और सुगंध से पहचाने
जा सकते हैं। जब नीचे का आधा फल कुछ रंग बदलने लगे तब
तोड़ना प्रारम्भ करना चाहिये।

चालान-फल फाकी सख्त और मजबूत होता है, इस लिए
टोकरियों में रखा कर भेजा जा सकता है। लकड़ी के बक्सों में
सुरक्षित रहता है।

उपयोग और गुण—ऊपर का मोटा छिलका निकाल कर
घीय का गूदा खाया जाता है जो बड़ा स्वादिष्ट, पाचक और बल-
वर्द्धक होता है। पेट के लिए अत्युत्तम वस्तु है।

अमरूद (Guava—Psidium guyava)

यह मैदानी फल है जो कि पहाड़ों पर होता ही नहीं। इसके
फल आकार में कई तरह के होते हैं। कोई गोल तो कोई लम्बो-
गोल, किसी-किसी की शक्ल तो ठीक तोमड़ी जैसी होती है।

किमी का दिलका माक और चिरुना-मा होता है, किमी का ऊँचा मोचा और मुरदुरा-सा। कोई कंध या चेल जितना बड़ा होता है तो कोई कागजी नीनू में भी छोटे होते हैं। इसी भाँति गूदा भी आम तौर पर दो रंगों का होता है—एक सफेद और दूसरा गुलाबी। अमरुद इलाहाबाद और मिर्जापुर के अधिक प्रसिद्ध हैं। इलाहाबादी अमरुदों में फरेला और सफेदा ये दो जाति के फल अच्छे होते हैं। दोनों का गूदा मोठा, सफेद और कमबीज का होता है। अमरुद के पौधे बीज से या भेंट कलम द्वारा तैयार किये जा सकते हैं। कहीं-कहीं गूदी से भी तैयार करते हैं। ये काम बरसात में होना चाहिए। भेंट-कलम के लिए बीजू पौधे नर्मरी में तैयार करके गमलों में लगा देने चाहियें। जाड़े में प्राप्त होने वाले पके फल के बीज सुखा कर राग के साथ बरसात में भी भली भाँति रखे जा सकते हैं। इन बीजों को बरसात शुरू होने पर लगा देना चाहिए।

आठ-दम फीट लम्बी-चौड़ी नर्मरी के लिए आठ-दम सेर अच्छा सड़ा हुआ ग्याद देना चाहिये। एकाध महीने में ही अंकुर फूट आते हैं। इन्हें ज्यों-ज्यों वे बढ़ते जायें, त्यों-त्यों छांटते जाना चाहिए। साकि निचल पौधे हटाये जा सकें और मफल को अपने बाद के लिए पूरा स्थान और खुराक मिलती जाये। पौधे से पौधा दो-दो फीट के अन्तर पर होना चाहिए। दो साल की उम्र के पौधों को खेतों में लगा सकते हैं। अथवा उन पर फलमें बांधी जा सकती हैं।

अमरुद के पौधे काफी मजबूत होते हैं, इसलिये टोभीने में इसके पौधों को कहीं भी भेजा जा सकता है। केवल निरंतर करते रहना चाहिए।

भूमि और खाद—इसके लिए बलुआ-दुमट जमीन बने गई है। वैसे ये हो जाते हैं सब प्रकार की जमीन में। पेड़ काटा जाता है। इसलिये यदि थोड़ा बहुत पानी लग जाये तो सहन लेता है। सर्दी भी सहन कर लेता है। गर्मी के दिनों में ऊर्ध्व जुताई के पश्चात् धारह से पन्द्रह फीट की दूरी पर तीन फीट की व्यास के उतने ही गहरे गड़े बनवा कर भरते समय बरसी मिट्टी में पचीस तीस सेर गोबर का खाद और करीब दो सेर हड्डी का चूर्ण मिला देना चाहिये। दो-एक वृष्टि के पश्चात् उस मिट्टी जम जाये तब पौधे लगाने चाहिये। प्रति वर्ष बैशाख-ज्येष्ठ (एप्रिल-मई) में जड़ें खोल (उखाड़) कर गोबर, पत्ते और हड्डी का मिश्रण दे देना चाहिये। मिश्रण में एक रातोंरा हड्डी ठीक होगी।

पौधा लगाना—वर्षा के प्रारम्भ में या जाड़े के अन्त में करीब दो साल की आयु के पौधे लगाना ठीक रहता है।

सिंचाई और काट-झांट—सिंचाई आवश्यकतानुसार होनी चाहिए। इतनी काट-झांट बहुत लोग करने की नहीं। परन्तु अण्डे फल प्राप्त करने के लिए काट-झांट आवश्यक होनी चाहिये। छोटे पौधे इस तरह करने दिये जायें कि अण्डे के पक्ष पर ३-४ शाखाएँ और अण्डे के शाखा पर ३-४ अण्डाणुएँ तक काट-झांट में निहाल होनी चाहिए। ऐसा करने से फल अधिक प्राप्त हो सकते हैं।

फसल की तैयारी—बीजू पौधे ५-६ साल में और कलमी ३-४ साल में फल देना शुरू कर देते हैं। कच्चे फल हरे और पकने के बाद थ्रंगूरी या सफेद रंग के हो जाते हैं। प्रतिवर्ष पहली फसल श्रावण में आश्विन तक (जुलाई-से-सितम्बर) और दूसरी जाड़े में नवम्बर से फरवरी तक मिलती है जहाँ तक तो सके जाड़े की फसल ही लेना उत्तम है। जाड़े के अन्त में दो-तीन बार सिपाई करके एक दम पानी बन्द कर देने से गर्मी में फूल आकर आप ही भड़ जाते हैं। इस रीति से गर्मी की फसल रोकी जा सकती है। यदि गर्मी ही की फसल लेना हो तो ग्याड माप में देकर सिपाई बराबर करते रहना चाहिए। अमरुद के पेड़ों का एक बार लगाने के बाद बीस-पच्चीस साल तक अच्छी आमदनी देते रहते हैं। यों देने को ४०-५० साल तक भी फल देते रहते हैं। प्रति पृष्ठ (अमरुद सस्ते बिकने पर भी) दो-टार्ड रुपये की आय का औसत पड़ता है। प्रति वर्ष एक-एक पृष्ठ से २०-२५ सैर फल प्राप्त हो जाते हैं।

पालान—घाँस की टोवरियों में घास रख कर अमरुद बट्टी भी भेजे जा सकते हैं। परन्तु सस्ते बिकने के कारण अधिक दूर भेजने में विशेष लाभ नहीं होता।

उपयोग और गुण—फल खाये जाते हैं। बीनी के साथ सूँटे की बरफी और लेची (Gelly) भी बनाई जाती है, लेकिन ये अमरुद समान होते हैं।

आम (Mango—Mangifera indica)

आम पहाड़ी इलाकों को छोड़ कर मैदानों में तराई पाया जाता है। आम कई जाति का होता है और एक ही जगह के आम के पृथक-पृथक स्थान में पृथक पृथक नाम हैं। जल और भूमि के हेर-फेर से खाद में थोड़ा-बहुत अन्तर पड़ता है। कुछ मुख्य-मुख्य जाति के नाम नीचे दिये जाते हैं। इनमें हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं—एक बीजू वाली और छोटे छोटे और पतले रस वाले होते हैं। ये चूस कर खाये जाते हैं इनकी गुठली रेशदार होती है। कलमी आम अधिकतर रस रहित बड़े और गाढ़े रस वाले होते हैं। ये बहुत बड़ा होकर खाये जाते हैं। कलमी पौधे भेंट कलम से बहुत बड़ा बन जाता है, इसे किये जाते हैं। जो कलमें अन्तिम परसता में बाँधी जाती हैं, वे अच्छी रहती हैं। पौधों का चालान कोट में होना चाहिए।

आयल इंजन गाइड ले०—प्रो० नरेंद्रनाथ B. Sc.

इस पुस्तक में गैस व आयल में चलने वाले हर किसम के अपटूटेड इंजनों का कैरोसिन अथवा पेट्रोल पर चलने वाले हर किसम के कम्बसयन इंजनों के काम करने के तरीके, कनेक्टिंग रॉड-पुंजों का विस्तार के साथ वर्गों विधियों द्वारा किया गया है। इसके अनिवार्य पुंजों और इंजनों में होने वाली गलतियों को जानना और ठीक करना और हर प्रकार की रिपेयरिंग का वर्ग वर्ग से विधियों द्वारा किया गया है। मूल्य १) रु० दस मात्र।

पता—देहाती पुस्तक भण्डार, पारसी बाजार, देहली ६।

पं. क्र. सं.	पं. क्र. सं.	पं. क्र. सं.	पं. क्र. सं.
१	१	१	१
२	२	२	२
३	३	३	३
४	४	४	४
५	५	५	५
६	६	६	६
७	७	७	७
८	८	८	८
९	९	९	९
१०	१०	१०	१०
११	११	११	११
१२	१२	१२	१२
१३	१३	१३	१३
१४	१४	१४	१४
१५	१५	१५	१५
१६	१६	१६	१६
१७	१७	१७	१७
१८	१८	१८	१८
१९	१९	१९	१९
२०	२०	२०	२०
२१	२१	२१	२१
२२	२२	२२	२२
२३	२३	२३	२३
२४	२४	२४	२४
२५	२५	२५	२५
२६	२६	२६	२६
२७	२७	२७	२७
२८	२८	२८	२८
२९	२९	२९	२९
३०	३०	३०	३०
३१	३१	३१	३१
३२	३२	३२	३२
३३	३३	३३	३३
३४	३४	३४	३४
३५	३५	३५	३५
३६	३६	३६	३६
३७	३७	३७	३७
३८	३८	३८	३८
३९	३९	३९	३९
४०	४०	४०	४०
४१	४१	४१	४१
४२	४२	४२	४२
४३	४३	४३	४३
४४	४४	४४	४४
४५	४५	४५	४५
४६	४६	४६	४६
४७	४७	४७	४७
४८	४८	४८	४८
४९	४९	४९	४९
५०	५०	५०	५०
५१	५१	५१	५१
५२	५२	५२	५२
५३	५३	५३	५३
५४	५४	५४	५४
५५	५५	५५	५५
५६	५६	५६	५६
५७	५७	५७	५७
५८	५८	५८	५८
५९	५९	५९	५९
६०	६०	६०	६०
६१	६१	६१	६१
६२	६२	६२	६२
६३	६३	६३	६३
६४	६४	६४	६४
६५	६५	६५	६५
६६	६६	६६	६६
६७	६७	६७	६७
६८	६८	६८	६८
६९	६९	६९	६९
७०	७०	७०	७०
७१	७१	७१	७१
७२	७२	७२	७२
७३	७३	७३	७३
७४	७४	७४	७४
७५	७५	७५	७५
७६	७६	७६	७६
७७	७७	७७	७७
७८	७८	७८	७८
७९	७९	७९	७९
८०	८०	८०	८०
८१	८१	८१	८१
८२	८२	८२	८२
८३	८३	८३	८३
८४	८४	८४	८४
८५	८५	८५	८५
८६	८६	८६	८६
८७	८७	८७	८७
८८	८८	८८	८८
८९	८९	८९	८९
९०	९०	९०	९०
९१	९१	९१	९१
९२	९२	९२	९२
९३	९३	९३	९३
९४	९४	९४	९४
९५	९५	९५	९५
९६	९६	९६	९६
९७	९७	९७	९७
९८	९८	९८	९८
९९	९९	९९	९९
१००	१००	१००	१००

मरेली और मदारनी के नाम
मे शिखार है. मरेली और शिखार।
गुग नमं और मीठा होना है।
बड़े और नीले मुरखे के बिये।
उलम भातों के खल में पकना है
हरमग के बिये उलम जानि
हरमगद हा मरनिम ब्याम।
मरेली और गुगनी मीठी होनी है।
मरेली और बरिह बल
मरेली।
मरेली और गुगनी जानि।

नाम आवृत्ति	पद्यने का समय	पद्य का पद्यन	गुण आवृत्ति
लोहापरी लाज कृष्णभोग	जुलाई, अगस्त जून, जुलाई	आध सेर	सुन्दर भीठा, लाज और पीठा। सुन्दर भीठा, दंगल का प्रसिद्ध आम। चतम व्यवसाय के लिए अच्छा है। अन्य जातियों में सर्वोत्तम। भीठा, खादिष्ट यू पी० का उत्तम आम। लाज, पीठे रंग का लघु पद्यने वाला।
फजरी बड़ा	अगस्त	एक सेर	
लंगड़ा वनारसी	जुलाई	आध सेर	
टुसहरी	जुलाई	डेढ़ पाव	
आमनफोर्ड	अगस्त	ढाई पाव	
राम मोला	अगस्त, सितम्बर	ढाई पाव	

नाम ज्ञानि	पढ़ने का समय	फल का वजन	गुण आदि
शेमुगिया	अगस्त	डेढ़ पाव	सुगंधित, मोठा खूब फलने वाला
चींगा	अगस्त	आध सेर	उत्तम, मईगा बिकने वाला ।
उरीर	जून	एक पाव	नर्म चम्पई रंग का बगल का प्रसिद्ध ग्राम ।
सुरैया	जुलाई	तीन छटौंरु	सुन्दर मोठा सुगंधित ।
पंरी	"	एक पाव	सुन्दर खादिष्ट दक्षिणी भारत का आम ।
मुहागी	"	आध सेर	सुन्दर, निर्दोष, रेशा-रहित, मो. ।
देगम पम्पई	जून-जुलाई	डेढ़ पाव	मुशिदाबाद का उत्तम आम ।
गोवा बर्गिषी	अक्टूबर	डेढ़ पाव	मोठा, सुन्दर खूब फलने वाली ।

राजा बाला सपेदा

राहड़ो

लखनवी सपेदा

शरदनी धारी

शरदनी अल्लापुरी

शरदनी पात्री

मनौजिया

मन्नीरावदी सपेदा

सितम्बर

अगस्त

"

जुलाई

"

"

अगस्त सितम्बर

जून

फल का वजन

एक पाव

एक पाव

एक पाव

डेढ़ पाव

एक पाव

एक पाव

तीन छटौं

दो छटौं

गुण आदि

हरा तोड़कर पाल दवाने से
सूख मीठा होता है।
अगेती फसल उत्तम जाति।

फल बहुत अधिक देता है।
पतला रस, स्वादिष्ट और मीठा
सुगंधित, स्वादिष्ट और मीठा।
पाली कच्चे का सुगंधित, रेशा-
रहित आम।

पतले रस वाला स्वादिष्ट आम
लोक विख्यात, मीठा और
अधिक फलाने वाला

नाम जालि	पलने का समय	फल का वचन	गुण आदि
गुरमदी यात्रा	अगल	तीन छटांक	मुजस्फरगढ़ की सुविख्यात जाति महंगा विक्रता है।
नोरम	जुलाई	तीन छटांक	रसदार, मीठा, उत्तम।
मुठरा बन्नाम्भी	मई-जून	तीन छटांक	तेज मिठाम वाला लोक-प्रिय।
गयनम	जून	आध सेर	सुगंधित, सुन्दर, सुस्वादु।
आरु मागी	जून में अक्टूबर	तीन छटांक	स्वादु, साल में कई बार फलता है।
पुनिया	अगल	एक पाव	हरा व लाल रंग का मीठा आम
कुरेविया	अगल-मिनम्बर	तीन छटांक	करैले जैसा पतले रस का मीठा आम।
हाथी मोय	जुलाई	आध सेर	हाथी जैसा बड़े आकार का मीठा आम।
गोगाय भोग	अगल	एक पाव	सुन्दर, स्वादिष्ट, खूब फलने वाला

भूमि और खाद—जिस जमीन में पानी न लगता हो, ऐसे हर प्रकार की भूमि में आम हो जाता है। अच्छी तरह जुता करने के बाद गर्मी में कमजोर भूमि में पचास, तीस और अच्छी उपजाऊ में तीस-पैंतीस फीट की दूरी पर गड्ढे खुदवाने चाहिए। बीजू पेड़ के लिये यदि ४० फीट की दूरी पर भी बतखों और तो अधिक न होगा। एक-एक गड्ढा तीन फीट व्यास का और उतना ही गहरा होना चाहिये। मिट्टी को कुछ दिनों तक सूखिलाने के बाद भरते समय पहले भरी जाने वाली दो-तिहाई मिट्टी में दो सेर हड्डियों का चूर्ण, पाँच सेर लकड़ी की राख और फरीस एक मन गोबर के साथ पत्तों का मिश्रण मिला देना चाहिये और बाद में बची हुई एक तिहाई मिट्टी भी भर देनी चाहिये। अगर एक दो बार दृष्टि हो जाये और गड्ढों में भरी हुई मिट्टी ठीक से बैठ जाये तो पौधे लगा सकते हैं। आम को बहुत एक बार लगाने के परधान खाद नहीं देते, परन्तु ऐसा करना ठीक नहीं। कम-से-कम प्रथम पाँच वर्ष तक हर साल खाद सपरवश दिया जाना चाहिये। खाद में यदि प्रतिवर्ष न भी सही तो जिस मात्रा में खाद की बहाल हो उस साल जरूर देना चाहिये। जहाँ पानी दिया जाये वहाँ जाड़े के अन्त में पूरा आने के पहले गोबर, पौधों की राख और हड्डियों का चूर्ण देना दिया जाना चाहिये। जहाँ पानी की व्यवस्था हो वहाँ बरमान के समय में देना चाहिये। आम बहुत दूर तक आम अच्छा लगते हैं। एक साल की आम अच्छी फूटती हैं और एक साल तक अच्छा खाते हैं। इसलिए जहाँ परमान में खाद देना हो वहाँ पौधों को पानी देने में देना

चाहिए। खली या सोडियम नाइट्रेट का खाद देना हो तो फूल आने लगे तब देना चाहिए। खली पाँच शतांश नवजन वाली पाँच-छः मन प्रति एकड़ के हिमाच से और सोडियम नाइट्रेट मन सवा मन के हिमाच से देना चाहिये। नीम की गली मिल सके तो अच्छी होती है। खास कर छोटे पौधों के लिये इसका उपयोग करना चाहिए, ताकि दीमक हानि न पहुँचा सके।

पौधा लगाना—पौधा चाहे बीजू हो या कलमी दो-ढाई साल की आयु का हो जाए तो लगा देना चाहिये। अधिक आयु के पेड़ ठीक नहीं होते। बीजू पौधे रोपने या कलम के लिए नर्सरी में तैयार किये जाते हैं। नर्सरी की क्यारियाँ ८-१० फीट लम्बी चौड़ी बना कर ८-१० इंच तक उनकी मिट्टी गोड़ देनी चाहिये। गाड़ते समय प्रति एक सौ वर्ग फीट के लिये लगभग १०-१२ मेर सड़े हुए गोबर का अथवा धकरी या भेड़ों की मींगनी का खाद दे देना चाहिये। खाद में पानी देकर बीज बो सकते हैं। बीज करीब दो-दो फीट की दूरी पर लगाने पड़ते हैं। बीज ताजे हो अच्छे होते हैं। पुराने होने से उपज शक्ति नष्ट हो जाती है। नये कोपल पर लगे हुए और टाक पके फलों के बीज उत्तम होते हैं। कुछ लोगों का ऐसा अनुभव है कि ऐसे बीज से पैदा होने वाले पेड़ में गुण परिवर्तन नहीं होता अर्थात् जिस पेड़ के बीज होते हैं उसी के गुण नये पौधे में पाये जाने हैं। पौधे लगाने का उत्तम समय बरसात या जाड़े का अन्त है। आन को सर्द में बोनी जरूरी हानि पहुँचती है। इसलिए नये जाड़े में नही लगाना

चाहिए। हवा से पौधे टूट न जायें, इसलिए सहाय लगाने चाहिए।

सिंचाई और काट-छांट—पौधे यदि जाड़े के अन्त में लग जायें तो लगाने के साथ ही पानी देना चाहिए और गर्मी के बराबर देते रहना चाहिए। पूर्ण बाद पाये हुए पेड़ों को मौ (फूल) आने लगे, उस समय से आवश्यकतानुसार जल देना ठीक होता है। काट-छांट सूखी या व्याधि-ग्रस्त टहनियों की होनी चाहिए। छोटे पौधों की काट-छांट आकार के लिये की जाती है। कलमी पौधों पर बांध के नीचे से कोंपल निहल जायें तो उन्हें तोड़ देना बहुत जरूरी है। आम के पेड़ पर लाल फूल वाला पौधा 'बांझी' जम जाता है, उसे तुरन्त काट देना चाहिए नहीं तो वह पौधा आम के पेड़ से रस चूस कर अन्त में पोषण करता रहेगा।

फसल की तैयारी—दस-बारह साल की आयु के होने पर बीजू और पाँच-छः बरस की आयु के कलमी पौधे फल देना शुरू करते हैं। कलमी आम करीब पचास-सगवन मात्र तक और बीजू लगभग सौ बरस तक अच्छे फल देने रहते हैं। व्यवसायिक दृष्टि से कलमी आम दस साल से लेकर आसीस पचास साल तक अच्छे समझने पादियें। कुछ ही आम पेड़ें होते हैं जो प्रसिद्ध न फल देकर हर दूसरे बरस अच्छे फल देने हैं। इनकी भाँति में आम उच्छ-आदाद (मई-जून) में पकने लगते हैं। मराठ प्रदेश और बिहार प्रान्त में आम के अन्तःस्थानों में आम

होकर माटपद (मों से अगमन-मिनम्बर) तक मिलने रहते हैं ।
 वनमी आमों में मिठया दम्बर, कृष्णभोग, मान्दा (बनारसी
 लंगड़ा), मीपिया, गुकुन, मेन्दूरिया और भदैया क्रमानुसार पकते
 रहते हैं । दम्बरों की तरफ फलमी आम हाफूज (Alphonse)
 और पायरी मॉ-जून से मिलते हैं । दक्षिण भारत में चित्र-यैशाग
 से प्रारम्भ होकर आपाद-श्रावण तक मिलते हैं । दक्षिण भारत में
 अरकाट और मलीम के आम अच्छे होते हैं । यहां के प्रचलित
 आमों के नाम दिलपमन्द, सोतापरी, काला पहाद, नवाब-पसन्द
 शकरपारा आदि हैं । बाल्टेर के आम-पास राजमान्य, नल
 कल्याण, स्वर्ण-रेखा आदि नाम के आम अच्छे माने गये हैं ।
 बीजू आम की फसल घटुधा महीने-डेढ़ महीने तक चलती है ।
 जब आम के पेड़ पर से दो-एक पके हुए गिरें तब समझना
 चाहिए कि आम उतारने (तोड़ने) योग्य हो गए हैं ।

चालान—बाहर भेजना हो तो लकड़ी के बक्सों में बन्द
 करके ही भेजना चाहिए । पास की मंडियों में गाड़ियों के द्वारा
 भेजे जा सकते हैं । करीब डेढ़ फुट व्यास के बीच में आठ-दस
 ईंच गहरी टोकरी ऊपर तक भर कर उस पर दूसरी टोकरी उलटी
 रख दी जाती है । फिर दोनों को रस्मियों से जकड़ कर ढिब्यों
 में डाल देते हैं । माल गाड़ी का पूरा ढिब्बा (Wagon) इसी
 प्रकार भर कर भेज देते हैं । यदि पकाना हो तो कलपी आम बेसे
 ही मचान पर रख दिये जायें तो धीरे-धीरे पक जाते हैं । जल्दी
 पकने के लिये आम को घाम या पुआल (Rice straw) में

दवा कर पका सकते हैं। पकने पर अधिकोश आनें ६० पीला, कुछ लाल और पीला और कुछ का मेन्दुरिया होना है। माल्दा और कृष्णभोग पकने पर भी हरे ही रहते हैं।

उपयोग और गुण—बीजू आम घूत कर और इन्हें तराश कर खाते हैं। पका आम बलवर्द्धक, दस्तावर और हृत्कारक होता है। दूध के साथ रस का सेवन करने में शीत होता है। इसमें खाद्योत्प्रेरक 'सी' पर्याप्त मात्रा में होता है। कुरर आम खट्टा और पित्त कारक होता है। आम में भूने हुए चूने का शर्बत लू (गर्म द्रव्य) लग जाने पर अच्छा लाभ पड़ता है। बीजों का गूदा कब्जकारी होता है और इमीलिए दम रोगों के काम में लाया जाता है। गौर (फूल) ग्रीष्मी, कफ, पित्त और रक्त-विचार में व्यवहार में लाये जाते हैं। नये पत्रों में भी दूध से जैसा गुण होता है। आम के रस को गुग्गा कर आमोद का रस पावक बनाते हैं, जो रगने में बड़ा हार्दिक और कफिहार होता है।

आड़ू, मतालू (Peach—*Prunus persica*)

बहुधा जलिन के आड़ू, गीमाकान्त को तरफ होते हैं। वन लकी मंदिर, शाह और बीजी ऐसी लोक गाँवों की हैं। ये लकड़दार गूदे में जाते हैं। इसका फल लकड़दार होता है। इसमें बीज बहुत ज़्यादा होता है। इस पर एक रस होता है जो हरे में होता है। फल का पत्रा बदल कर लेता है। इसका रस हरे में होता है। फल में बीज (बीज) में रस होता है।

जू पीचे तैयार करने के लिए बोज नर्मरी में आठ-दस ईंच की
 नीचे पर ताजे ही लगा देने चाहिये। यह बहुत बिलम्ब से अंगुर
 कने हैं। घरमात में लगाये हुए पीचे चेत्र में जाकर चदमा चढ़ाने
 गये होते हैं। जिस हाली पर चदमा चढ़ाया जाये वह करीब
 १५ ईंच मोटी होनी चाहिये।

पीचों का चालान फांट में किया जाये तो ठीक होगा।

भूमि और खाद—इसके लिए बलुआ-दुमट जमीन अच्छी
 होती है। गढ़े तीन-तीन फीट व्यास के और उतने ही गहरे हो-
 नीय फीट की दूरी पर गर्मी में बनवा कर पचीस-तीस मीट्र
 करीब गाबर, सड़े पत्ते और दही का पुरा नीचे की दो फीट में
 में मिला देना चाहिये। दही करीब दो मंत्र काफी होगी। दूरे-
 दूरे भड़ने लगे तो जड़े खाल पर दस-पन्द्रह दिन बाद
 मिट्टी भर देनी चाहिये।

पीचा लगाना—यहाँ शत्रु में या जाड़े के बाद
 लगाया जाता है। इसमें पेंड पाणीय की सहायता
 लगाये जा सकते हैं।

करके जड़ें खोल कर मड़वाना चाहिये। इसमें रस बने आते हैं।

फमल की तैयारी—पेड़ लगाने के समय से तीनों साल फल आने शुरू होकर सात-आठ साल तक अच्छे फल आने लगे हैं। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ में फल मिलने हैं। पटने पर हरे रंग के और गुलाबी रंग धारण कर लेते हैं। बगोछान आरंभ होते ही फल में एक प्रकार का कीट लग जाता है और फिर रोग आने लगते हैं। प्रति वृत्त लगभग पच्चीस फल बनकर आते हैं। दो-तीन रियों में रस कर फलों की कड़ी भी भोज मकाने है।

उपयोग और गुण—यह भोज ही माने जाते हैं। हृमिनशर, पेट के दर्द को मिटाने वाले और हृदय रोगों के लिए भी फलों का रस निकाला जाता है जो रोगों के लिए

हो जायें और कुछ रंग बदली नजर आवें तब ककड़ियाँ होने योग्य होती हैं। दूसरी फसल के लिए बीज, अच्छे फलों को का सुखा कर, राख या नेपथलीन की गोलियों के साथ रस सकते हैं।

उपयोग और गुण—छोटी और पूर्ण बड़ फल हुए दोनों ककड़ियाँ वैसे खाई जाती हैं। इनकी तरकारी भी बनाई जाती है। बीज के गूदे से मिठाई भी बनाई जाती है। ककड़ी स्वादिष्ट और ठण्डी होती है। रक्त-पित्त आदि विकारों को शान्त करती है।

कटहल, फणस

(Jack-fruit—*Artocarpus integrifolia*)

कटहल के पेड़ की उम्र-ज्याँ आयु बढ़ती जाती है, लेकिन इसमें फल भी बड़े-बड़े आते हैं और शाखा से पद पर जो जमीन में फैलना शुरू होते हैं। एक २ पेड़ में पचीस-तीस को से लगा कर सौ-दूढ़ सौ अच्छे फल प्राप्त होते हैं। पीरे बीज को तैयार किये जाते हैं। साधारण कटहल ८-१० सेर से लेकर बड़े कोई १५-२० सेर के भी हो जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नई शाख पर के कटहल के बीज लगाये जायें तो उनमें पैदा होने वाले पेड़ जल्दी फलने दें। बीज पर्याप्त मात्रा में लगाने चाहियें।

भूमि और तार—उमड़ कटार भूमि इनके लिए अच्छी होती है। इनकी कटार की कटार कड़ी नहीं लगाने जानी। १। एकड़ के बगीचे में दो या तीन पेड़ हो लगाने का ही माने है। कान को हार इनको भी गंदे गंधा करके लगाने देना चाहिये।

बक्स और आल्मारी आदि बनाने के काम में लाई जाती है। पत्तों की पत्तलें बनाई जाती हैं। —

कमरख (Kamarach—Anerrhoa carambola)

इसके पौधे बीज से तैयार किये जाते हैं। बीज ताजे हैं पौप-भाघ में बोये जाने चाहियें। इनके पौधे टोकरियों में रखा जा भेजे जा सकते हैं।

भूमि और खाद—ये सब प्रकार की भूमि में हो जते हैं। दो फीट व्यास के उतने ही गहरे गढ़े बनवाकर उनही मिट्टी में लगभग आधा मन दहड़ी मिश्रित गोबर का सड़ा हुआ गाद निर देना चाहिए। गढ़ों में १२ से १५ फीट का अन्तर होना चाहिये। प्रति वर्ष जाड़े में काट-छांट के बाद खाद दे देना चाहिये।

पौधा लगाना—इसके पौधे बरमान में लगाये जाते हैं।

सिंचाई और काट-छांट—मिषाई आवश्यकतानुसार होनी चाहिए। काट-छांट जाड़े में होनी चाहिए। जब पेड़ों में पत्तें लिये जायें तब काट-छांट करनी चाहिए।

फलन की तैयारी—सब साल साल की आगु वाले पीले फल देना प्रारम्भ करते हैं और प्रति वर्ष आदिपत्र काटने में काम करते हैं। फल दूर नहीं भेजे जा सकते। महीने वर्षों बादवाले में टोकरियों में रखा जा बिछी के लिए भेजे जा सकते हैं।

उपयोग और गुण—यह फल फलों की पीली हो जाते हैं। फल युक्त बीजे मिठा कर हुआ शरबत बनाया जाये तो यह शक्ति और ठंडा रहता है। इसका उपयोग भी बहुत हो सकता है।

। कमरस शीतल और प्राही होते हैं। यह कफ और वादी
 प्राक है। फल के रस में कपड़ों के दाग जल्दी छूटते हैं।
 सका फल ३-४ इंच लम्बा और पाँच धारी वाला होता है। पेड़
 गन्ध-बीस फीट की ऊँचाई के होते हैं। वे पहाड़ों पर नहीं होते
 मैदानों में होते हैं।

केला (Plantain—Musa Sapientum)

केले हमारे देश में प्रायः सब जगह होते हैं, परन्तु गर्म और
 तरी वाला वातावरण इनके लिये अच्छा होता है। केले की भी कई
 जातियाँ हैं। परन्तु मुख्यतः हम इनको दो श्रेणियों में बाट सकते
 हैं। एक वे जो यों ही खाये जाते हैं और दूसरे वे जो तरकारी के
 रूप में पका कर खाये जाते हैं। दोनों जातियों में कई उपजातियाँ

गा पात्र भर समोनिगम मण्डपे गा एक सेर गली और एक
दोहरा गम दा राला जाना भी उत्तम होगा ।

पौधे लगाना—उपरोक्त रीति में तैयार किये हुए गद्दों
पर शत्रु में देने के मकर्म । मकर्म लगभग ३ इंच व्यास
पुट डेढ़ पुट ऊंचे और स्वस्थ होने चाहियें, लगाने चाहियें
जब तक ये पूर्ण बाढ़ पाकर फल देने योग्य होते हैं, तब तक
इनकी जड़ के निकट दूसरे पौधे निकल आते हैं और फल का
पर जन धम्म काट दिये जाते हैं तो नये पौधे उनका स्थान
लेते हैं ।

सिंचाई और काट-छांट—सिंचाई आवश्यकतानुसार करनी
चाहिये । जिन धम्म से फल प्राप्त हो जायें उन्हें काट कर फेंक
देना चाहिये । क्योंकि वे एक बार ही फलते हैं । फले हुए पौधे के
पास दो पौधों से अधिक हों तो वे उखाड़ देने चाहियें । इन दोनों
में से एक पौधा बड़े पेड़ की आधी ऊंचाई का और दूसरा छोटा
ही होना चाहिये । ऐसे पौधे जमीन की सतह पर से निकले हुए
नहीं होने चाहियें । अधिक पौधे रहने से फलने वाले पेड़ को
पूरी खुराक नहीं मिलती इसलिए फल छोटे होते हैं और पक्के
भी देरी से हैं ।

फलों की तैयारी—अच्छी जमीन और अनुकूल वातावरण
होने से एक साल में फल प्राप्त होने लगते हैं । यदि वातावरण
ठीक न हुआ तो डेढ़ साल तक फल आने लगते हैं । एक धम्म से
फल एक बार ही प्राप्त होता है । परन्तु इतने

और पौधे तैयार हो जाते हैं। इसी रीति से नये थम्भ तैयार होते हैं। एक खेत में ५-६ साल तक फल ले लेने के बाद भूमि को बदल देना चाहिए। थम्भ के बीच में जो फूल की डंढी निकलती है उसी में फल आते हैं। डंढी और फल दोनों मिल कर धड़ कहलाते हैं। प्रति एकड़ करीब तीन सौ धड़ हर साल प्राप्त हो जाते हैं। थोड़ी-बहुत फसल साल भर मिलती ही रहती है। जब धड़ में दो-एक कंले पीले पड़ जायें तभी उसे काट कर रख देना चाहिए, पाँच-छः दिन तक सब कंले पक जाते हैं। व्यवसायी लोग जल्दी पकाने के विचार से ज़मीन में या भट्टी में कंले के सूखे पत्तों के साथ रख कर कुछ धुआँ देते हैं जिसमें गर्मी पहुँचती है और कंले की सारी धड़ एक साथ तैयार हो जाती है। जो कंले बाहर भेजे जायें, तोड़ते समय यदि धड़ के कटे हुए भाग पर मोम लगा दिया जाये तो फल काफी दिनों तक अच्छे बने रहते हैं। उनके छिलके जल्दी काले नहीं पड़ने और वे धड़ से जल्दी-जल्दी गिरते भी नहीं। बम्बई प्रान्तीय कृषि-विभाग ने यह भी बतलाया है कि लगभग आधा सेर मोम १०० धड़ों के लिए काफी होता है।

उपयोग और गुण—पक्का बंला पापक, शीतल, और पुष्टिकारक होता है। नेत्र रोग में इसका सेवन लाभ पहुँचाता है। बच्चे बने के काटे की रोटी में वायु विचार (Dyspepsia) दूर होते हैं। कंजे के फूल की तरबारी ज्वर नाराज लेडिन बिहनी आदि होती है। कंजे के थम्भ से मरहट आदि मज्जाये आने

हैं। इनमें सन भी प्राप्त किया जाता है, जिससे रस्सियां और कपड़े इत्यादि भी बनते हैं। कहीं-कहीं थम्भ की राख कपड़े धोने के काम में भी ली जाती है। पत्तों का उपयोग पत्तलों के लिये किया जाता है और धीड़ी आदि भी इनसे बनाते हैं। फूल, फल और थम्भ के बीच का सफेद भाग तरकारी बनाने के काम आती है। कच्चे केले का चूर्ण फलाहार के काम में लाते हैं। बेशक बड़ा उपयोगी फल है।

खजूर—अरबी (Dates—Phoenix dactylifera)

खजूर—देशी—(Phoenix sylvestris)

पहली जाति का खजूर अरब की तरफ से आता है और वही इसकी खेती होती है। खजूर के लिए सूखा और गर्म वातावरण अच्छा रहता है। वर्षा भी आठ इंच से कम ही ठीक रहती है। भारतवर्ष में सिंध और ब्रिलोचिस्तान ऐसे ही स्थान हैं। इसलिये खजूर की यह जाति वहाँ भी हो जाती है। इसके पेड़ ७०-८० फीट से लेकर प्रायः सौ फीट की ऊँचाई तक पहुँच जाते हैं। इनमें नर और मादा पेड़ भी होते हैं। फल मीठे, रसीले और अच्छे गुदे वाले होते हैं। इनके पेड़ सक्र्स (पेड़ की जड़ के पास से निकलने वाले पौधे) से तैयार किये जाते हैं। पौधे कहीं भेजने हो तो टोकरियों में भेजे जा सकते हैं।

दूसरी जाति का खजूर यहाँ सब जगह पाया जाता है। इस पेड़ की औसत ऊँचाई ३० फीट से अधिक नहीं होती। इनमें नर

नहीं होने, इसलिए इनको धीजू में तैयार किया जाता है जिन्हें ताड़े की बर्षाशुमु में पो देना चाहिए। इनका गुदा बहुत पतला होता है इसलिए फल प्राप्ति के लिये इन्हें कोई नहीं लगाता। ये मैदानों और जंगलों में अपने आप हो जाते हैं।

भूमि और म्याद गरजूर की अर्घी जाति के लिये धलुआ जमीन ठीक रहती है। इसको २० फीट के अन्तर पर लगाना चाहिए दो-दो फीट व्यास के और उतने ही गहरे गढ़े धनवाकर धनकी मिट्टी में करीब २०-५ सेर गोबर का खाद, दो सेर हड्डी का घूर्ण और थोड़ा नमक या शोरा भी मिला देना चाहिए। एक बार पेड़ लगा देने के बाद खाद बीच की भूमि में लगा दिया जाता है। पेड़ की जड़ें खोली नहीं जाती, बल्कि उन पर मिट्टी ढलाई जाती है।

पौधे लगाना—उपयुक्त रीति से तैयार किये हुए गढ़ों में बरसात में पौधे लगाने चाहियें। जो सकर्स लगाये जायें उन्हें तीन-चार साल की आयु के होने पर पेड़ से पृथक् करके लगाना चाहिये। एक पेड़ में १०-१५ सकर्स हो जाते हैं। ये सकर्स पेड़ की १५ से २० वर्ष तक की आयु में ही होते हैं, बाद में नहीं होते। वैसे पेड़ पाँच-पाँच सौ वर्ष की आयु तक भी फल देते रहते हैं।

सिंचाई और काट-छाँट—पहले कुछ साल तक गर्मी में जल्दी-जल्दी पानी देना पड़ता है। बाद में आवश्यकतानुसार देते हैं। यदि सकर्स ज्यादा हों तो वे हटा दिये जायें और

पुराने पत्ते तथा फलों की मूमी छड़ियां भी हटा देनी चाहियें।
पेंगा करने में नई कं लिये जगह मिल जायेगी।

कमल की तैयारी—पीपे लगाने के समय से साठ-अठ्ठा
मास की आयु के होने पर पेड़ फल देना प्रारंभ कर देते हैं।
परन्तु १५-२० साल की आयु के पेड़ अच्छे फलते हैं। करीब
७०-८० वर्ष तक फल मिलते रहते हैं। इसके पेड़ दो सौ साल
तक भी फल देते हैं ऐसा कुछ लोगों का अनुमान है। फाल्गुन
में नर पेड़ों में फूल खिलते हैं जिनमें कीट को आकर्षित करने
के लिये सुगन्धित मीठा रस रहता है। कीट द्वारा फूलों का केसर
मादा फूल तक पहुँचता है। फल अच्छे बैठें इसलिये बहुधा नर
फूल के खिलने के पड़ने पेड़ से हथे (Spatha) हटा कर रस
लिये जाते हैं। जब मादा फूल खिलते हैं, तब उनके पास पेड़ों पर
लगा दिए जाते हैं। प्रत्येक सौ मादा पेड़ों के पीछे एक नर पेड़
अवश्य होना चाहिये। फल ज्येष्ठ-आषाढ़ से आश्विन तक मिलते
रहते हैं और एक-एक पेड़ पर से डेढ़ मन मे दो मन तक फल
प्राप्त हो जाते हैं। देशी खजूर के फल ज्येष्ठ-आषाढ़ में मिलते हैं।

चालान—छोटे-छोटे बक्सों में या चटाई के बोरो में इन
खजूरों को चाहे कहीं भी भेजा जा सकता है। ये खजूर लाल
और काले दो रंग के होते हैं। काले बाले का बीज छोटा होता
है और फल भी लाल की अपेक्षा मीठा होता है।

उपयोग और गुण—ताजे फल दूध में छान कर या घने
ही खाये जाते हैं। सूखे फल जिन्हें छहारा, खारक या खजर

भी करने हैं औषधिक काम भी आते हैं और वैसे भी खाये जाते हैं। बोज पशुओं को खिलाये जा सकते हैं।

खजूर शीतल, हृदय के लिये हितकारी और पुष्टिकारक होता है। खांसी, दमा, क्षयरोग आदि व्याधियों में इसका सेवन गुणदायक माना गया है।

खजूर के पत्ते और शाखाये पंखे, चटाइयां, और छोटी-छोटी पैलियां आदि बनाने के काम में लाई जाती हैं। खाली छदियों में टोकरियां बनाई जाती हैं और पत्ते सहित छदियों की भाड़ बनाई जाती हैं। इसका रस पीने में मीठा और शीतल होता है। ताजा रस पीना लाभकारी है। यदि ५-६ घण्टे बाद रस पिया जाये तो वह नशा करता है। बंगाल की तरफ खजूर के रस से गुड़ भी बनाया जाता है।

खरबूजा Melon—Cucumis melo

भूमि और खाद—नरी-नाने के बीच वाली जमीन में देड़ फुट चौड़ी और आठ-दम इंच गहरी नालियां बनवा कर उनमें गोबर और पत्ते का ताजा हुआ खाद लगभग देड़ सौ मन मिट्टा देना चाहिए। नालियों में तीन फीट के अन्तर पर बतर्त जावे।

बोझाई—माघ-चतुर्गुन (जनवरी-फरवरी) के नालियों में इनके बोझ तीन-तीन फीट की दूरी पर बाने चाहिये। प्रति एकड़ देड़ गेर बोझ की आवश्यकता होती है। जहां तक हो संभव लगे ही लगाने चाहिये। दो-तीन सप्ताह के बोझ लगाने से कुछ फल आने में देर नही होगी।

सिंचाई और काट-छाँट—आवश्यकतानुसार सिंचाई करें।

जब फल पकने लगें तो पानी बहुत कम देना चाहिए। जब पौधों के ३-४ पत्ते आ जायें, तो बीच का कोंपल तोड़ देने से ठीक रहता है। क्योंकि ऐसा करने से नये कोंपल निकलते हैं, जिनके तीसरे-चौथे पत्ते पर फूल आ जाते हैं। यदि न आयें तो इनकी पुनगी (Growing point) भी तोड़ देनी चाहिए। ऐसा करने से फल अच्छे बनते हैं। फल बैठ जाने पर प्रत्येक उपलता पर दो-तीन फल छोड़ कर आगे की पुनगी तोड़ देनी चाहियें। प्रति पौधा आठ-दस फल से अधिक नहीं रहने देने चाहियें। क्योंकि अधिक फल रहने से उनकी बाढ़ अच्छी नहीं रहती।

फसल की तैयारी—बोने के समय से दो-ढाई महीने में फल पकने शुरू हो जाते हैं। जब फलों का रंग पीला या सफेद हो जाये और उनमें से मीठी सुगन्ध निकलने लगे तब तोड़ने चाहियें। फल कहीं भेजने हों तो हंडाकार टोकरियों में रख कर भली भाँति सिसियों से बांधने के बाद भेज सकते हैं।

उपयोग और गुण—कच्चे फलों की तरकारी बनाई जाती है। पके हुए फल बीसे ही या चीनी के साथ खाये जाते हैं। बीजों की मिठाई बनती है। उन्हें तल कर नमकीन बना कर भी खाते हैं। खरबूजा दस्तान और पलदायक होता है। बीज टहने, गैस्ट्रिक और अधिक पेशाब जाने वाले होते हैं।

खिरनी Khirni—Mimusops hexandra

यह मैदानी इलाकों में जंगलों में पाई जाने वाली घीऊ है।
 इन खाने में स्वादिष्ट होते हैं, इसलिए बगीचों में यदि एक-दो
 दि इसके भी लगा दिए जायें तो अच्छा ही हो। पौधे तैयार करने
 के लिए ज्येष्ठ में ताजे बीज बोये जाने हैं।

भूमि और खाद—सभी प्रकार की मिट्टी में यह हो जाती
 है। दो-एक पेड़ यदि कहीं लगाने हों तो पेड़ लगाने की साधारण
 उक्ति के अनुसार लगा सकते हैं।

पौधा रोपना—बरसात में ही इसका पौधा लगाना ठीक
 होता है।

मिचौड़ी और काट-छाँट—प्रथम दो वर्ष केवल गर्मी के दिनों
 में पानी दिया जाता है। बाद में देने की आवश्यकता नहीं रहती।
 सूखी टहनियाँ काटते रहना चाहिए।

फसल की तैयारी—बीज लगाने के समय से दस-बारह साल
 बाद पेड़ों से फल मिलने लगते हैं। प्रति वर्ष आगहन-पौष में
 फूल कर गर्मी में फल देते हैं। फल जब पीले पड़ जायें तब तोड़ने
 चाहियें।

यह कोई खास घात नहीं है इसलिए दूर नहीं भेजी जा
 सकती।

उपयोग और गुण—ताजे फल बीसे ही खाये जाते हैं। उन्हें
 सुखा कर भी खाते हैं। खिरनी बलदायक, शीतल और भारी
 होती है। रक्त रोगियों के लिए इसका सेवन अच्छा माना
 गया है।

गुलाव जामुन (Rose apple—*Eugenia Jambos*)

इसके फल खट-भीठे छोटी सेब के आकार के गुलाबी रंग के होते हैं। यह उष्ण वातावरण में अच्छा होता है। पौधे मध्य वर्षा ऋतु में लगाने चाहियें।

भूमि और खाद—यह सब प्रकार की मिट्टी में हो जाता है, परन्तु दुमट या कछार भूमि में अच्छा होता है। गड़े पन्द्रह २ फीट की दूरी पर गर्मी में बनवा कर उनकी मिट्टी में आधा मन के लगभग खाद मिला देना चाहिए। गड़े डेढ़-दो फीट गहरे हों।

पौधे लगाना—पौधे लगाने का उत्तम समय बरसात का है।

फसल की तैयारी—इसका पेड़ बहुत देर से तैयार होता है। यह १४-१५ साल की आयु का हाकर फल देता है। प्रति-वर्ष वर्षा-कालगुन में फूल और ज्येष्ठ-आषाढ़ (मई-जून) में फल प्राप्त होते हैं। फल छोटे बक्सों में भेजे जा सकते हैं।

उपयोग और गुण—फल वैसे ही ग्राये जाते हैं। इनका रस भी अच्छा बनता है। इसके फल कक और गाँसी को करते हैं।

चक्रांतरा

Pomelo Grape Pruite—*Citrus decumana*)

यह नींबू या मंतरे की जाति का सबसे बड़ा फल है। इसका रस भी कासी मोटा होता है। एक जाति इसकी बुल भी मिलती है जिसे पेनेरो कहते हैं। अमेरिका में बहुत ही अच्छा बनता है।

निकट' कहते हैं, परन्तु यह कुछ खट्टी होती है। इसका पौधा ज, दाव फलम, भेंट फलम या चडमा चढ़ा कर ही तैयार करना चाहिये। क्योंकि दाव फलम वाला इतना अधिक फल नहीं लाता जितना चडमे वाला देता है। चडमे बाने पेड़ के फल भी बढ़े हैं। चडमा घरसात या इसके अन्त में चढ़ाना चाहिये।

भूमि और म्हाद—जिस भौति मंत्र के लिए जमीन तैयार करनी है उसी भौति इसके लिये भी करना चाहिए। चूंकि पेड़ का फैलाव मन्तरे के पेड़ से अधिक होता है, इसलिए २०-२० फीट के अन्तर पर होने चाहियें। प्रतिवर्ष घरसात शरभ में म्हाद दे देना चाहिये।

पौधा लगाना—घरसात ही इसके लिये अच्छा मौसम है।

मिचौड़ी और झाड़-छांट—आवश्यकतानुसार मिचौड़ी और झाड़-छांट मूसों तथा कपाधिषम टहनियों की होनी चाहिए।

फसल की तैयारी—लगाने के समय से बीजू पौधे आठ-दस साल के और फलमी ५-६ साल के बल देने लगने हैं। इन्हें भी मार्च (जनवरी) तथा अप्रैल (जून) में पृथक् से हैं, परन्तु अधिकतर बल मार्च वाले पृथक् से अप्रैल से निकल (अगस्त-अक्टूबर) तक आने हैं। पत्तों का पतन होने की भौति ही इनकी भी किया जा सकता है।

उपयोग और गुण—इसका रस घृत वर स्यादा जाना है। इसका शक्ति भी बना दीने है। स्वाद के विचार से विष्णुद्वय के फल की समान बल स्यादा है। अर्बुकाद टंडक दृष्टि

घाला, हाज्मा बढ़ाने वाला हिचकी रोकने वाला और साँसी आदि विकारों में लाभदायक होता है।

जामुन (Jamun—*Eugenia jambolana*)

जामुन की भी दो जातियां होती हैं, एक बड़ी और दूसरी छोटी। बड़ी जाति वाले को कहीं-कहीं 'शाय जामुन' भी कहा जाता है। जामुन मैदानी इलाकों में होते हैं; पहाड़ों पर यह नहीं होते। इसके ताजे बीज आपाढ़ में बोनने चाहियें।

भूमि और खाद—यह फल सभी प्रकार की जमीन में होता हुआ देखा गया है। इनके खेत के खेत नहीं बोये जाते। बहुधा जंगलों में ये अपने आप ही पैदा होते रहते हैं। बड़े जामुन के दो-एक पेड़ यदि बागीचे में लगा दिये जायें तो अच्छा है। अन्य फलों के पेड़ों के लिये जिस प्रकार गढ़े तैयार किये जाते हैं, इनके लिये भी उसी तरह तैयार करके खाद देना चाहिए।

पौधा लगाना—यदि बीज ही लगाना हो तो वर्षा ऋतु के प्रारंभ में और यदि तैयार पौदा ही लगाना हो तो बरसात में कभी भी लगाया जा सकता है। इस पेड़ को अपने फैलाव के लिए पचीस-तीस फीट घेरे की जमीन छोड़नी चाहिए।

सिंचाई और काट-छांट—पहले दो साल तक पानी देना चाहिए, फिर देने की आवश्यकता नहीं होती। फल आने लगें उत वक्त से यदि थोड़ा २ पानी दिया जाये तो फल अच्छे आते हैं। सूखी टहनियां काट कर निकाल देनी चाहिए।

फल की तैयारी—इस प्रकार माल का होने पर पेड़ फल निकाल कर देने हैं और हर साल वर्षा के आरंभ में फल आते होते हैं। टोकरीयों में रख कर बाजार भेजे जायें।

उपयोग और गुण—फल वैसे ही खाये जाते हैं। नमक मिर्च मिना कर खाने से स्वाद आर भी अधिक हो जाता है। श्मशानिरका बहुत तेज होता है। फल दाहनाशक और पेट के रोगों को हरने वाला होता है। ममूदे फूलने पर छाल का काढ़ा बना कर गुल्ले किये जायें तो लाभ पहुँचता है। सिरका पित्तनाशक होता है।

तरबूज, कलिंगर, हिन्दवाना

(Water melon—Citrullus vulgaris)

यह गर्मी का फल है। मैदानों में प्रायः सब जगह ये हो जाते हैं। छोटे-बड़े सभी आकार के तरबूज बाजार में विक्रते हैं। साधारण व्यास ६-१० इंच और लम्बाई ११-२ फीट तक होती है।

भूमि और खाद—इसके लिये बलुआ मिट्टी अच्छी रहती है, लेकिन दुमट या बलुआ-दुमट में भी लगाने से हो जाते हैं। यदि नदी-तट की बलुआ भूमि में लगाया जाये तो ५-५ फीट की दूरी पर नालियाँ बना कर खाद नालियों के बालू में मिला देना चाहिए। यदि साधारण खेत में लगाना हो तो दो सौ मन प्रति एकड़ के हिसाब से खाद देकर जमीन की जुताई खूब गहरी करवा देनी चाहिए। अन्तिम जुताई के बाद नालियों ५-५ फीट (बना दी जायें)

बोआई—माघ-फाल्गुन (जनवरी-फरवरी) नालियों में चार-चार फीट की दूरी पर इसके बीज बो देने चाहियें ।

सिंचाई और काट-छाँट—साधारण सिंचाई करते रहना चाहिए । जब फल पकने लगें तो सिंचाई कम करके इतनी होनी चाहिए कि लताएं सूखने न पायें । प्रायः एक लता में आठ-नौ फल से अधिक लहों लगने देना चाहियें, क्योंकि अधिक लगने से लता कमजोर होकर फल पुष्ट नहीं होने पाते । बीज लेना हो तो प्रति लता ४-५ फल से अधिक न लगने दें ।

फल की तैयारी—वैशाख ज्येष्ठ तक फल पक जाते हैं । इसके पहचानने में कठिनाई होती है । लेकिन तोड़ते समय यदि फल जल्दी ही डंठल से अलग हो जाये तो समझना चाहिए कि वह पक गया है । ऐसे फल जब तोड़े जाते हैं तो जोड़ की जगह साफ गोल चिन्ह बन जाता है । अनुभवी लोग फल को ठोंक कर ही पहचान जाते हैं कि वह पक गया है या नहीं । कच्चा फल तोड़ते समय कुछ कठिनाई से टूटता है और पका फल जरूरी ।

ब्याप्तान—बाहर जाने वाले फलों को डंठल समेत ही भेजा जाता है । फल टोकरियों में ही रग कर भेजे जा सकते हैं । बीज रखना हो तो पके हुए फल का बीज गूदे से गुड़ा कर धो-मुगा कर रखें ।

उपयोग और गुण—फलों के अन्दर का साज गूदा खाया जाता है, संतुल भीग को तरकारी बनाई जाती है । इसके साज गूदे का शरबत भी बना कर पीने में । तरबूज के फल का रस भी होता है ।



की मिट्टी में एक मन के करीब गोबर का खाद और २-२½ डब्डी का चूर्ण भी डाल दिया जाये तो अच्छा हो। जब फल लगे उस समय से हर साल पौष-माघ में जड़ें खोद कर उनमें दे देना ठीक होगा।

गौधा लगाना—वर्षाकाल अथवा शरद ऋतु में पौधे लगाये जा सकते हैं।

सिंचाई और काट-छाँट—खाद देने के बाद गर्मी के दिनों में सिंचाई करते रहना चाहिए। फल पकने लगे तो पानी कम कर दिया चाहिए। पौष-माघ में पत्ते झड़ जाने पर सूखी टहनियों काट-छाँट होनी चाहिए। उस वक्त १४-१५ दिन के लिए जल देनी चाहिये।

पानी देना चाहिए। पेना करने से फल आकार में बड़े और स्वाद में अच्छे रखादिष्ट होते हैं। पत्ते मड़ने लगें तब मध्य जाड़े में काट-झोंट होनी चाहिए। सूखी टहनियों को निकालने के साथ २ ही लम्बी शाखाओं का एक-तिहाई भाग काट दिया जाना चाहिए।

फल की तैयारी—लगाने के बाद ६-७ साल में पौधे फल देने योग्य हो जाते हैं। प्रति वर्ष फल बरसात भर (जून से सितम्बर) मिलते रहते हैं।

चालान—टोकरीयों में रख कर कहीं भी भेजी जा सकती है यदि पतले प्लाई वुड के बक्स में या चटाई और कोट में रख कर भेजी जायें तो और भी अच्छा हो। सुन्दरता बढ़ाने के लिए रंगीन कागज में लपेट कर रक्खा जाता है।

उपयोग और गुण—पक्के फल बीमे ही छील कर खाये जाते हैं। नामपासी हल्की, वीर्यवर्धक, पित्त और कफनाशक होती है।

नीबू Lime—Citrus medica acida (कागजी नीबू)

Citrus medica limonum (जमेरी नीबू)

नीबू भी कई जाति के होते हैं और प्रत्येक जाति के भिन्न-भिन्न नाम हैं। आकार भी इनके अलग-अलग होते हैं। नारियल जितने बड़े से लेकर सुपारी के बराबर तक आकार वाले नीबू पाये जाते हैं। जिन नीबू की खेती विशेष रूप से की जाती है, वे सन्तरे की अपेक्षा कुछ छोटे होते हैं। उन्हें हम दो भागों में

बांट सकते हैं। अर्थात्—कागजी और जमेरी। कागजी
 छिलका पतला, रस सुगंधित और कुछ कम खट्टा होता है। जमेरी
 का छिलका मोटा और रस खट्टा होता है। कागजी नीबू भी
 प्रकार के होते हैं—एक गोल और दूसरे अण्डाकृति वाले।
 कागजी और जमेरी के सिवाय एक जाति का नीबू और भी होता
 है (*Citrus medica var limetta*) इसका रस मीठा होता
 है। नीबू के पौधे धीजू या गूटी से तैयार किये जाते हैं। बीज
 जहाँ तक हों ताजे ही नर्सरी में गिरा देने चाहिये। ये १५-२०
 दिन में अंकुर फँक देते हैं। जब पौधे ४-५ इंच ऊँचे हो जायें तो
 लन्हें उठा कर एक-एक फुट के अन्तर पर लगा दिया जाये और
 जब उस जगह वे डेढ़-दो फीट ऊँचे हो जायें तो निर्धारित स्थान
 पर लगा सकते हैं। धीजू से पौधे बहुधा संतरे की प्रणाली में बाँधने
 के लिए तैयार किये जाते हैं। गूटी या दाघ फलम भाद्रपद के
 अन्त में लगाने से ठीक रहता है।

भूमि और खाद—चलुआ और मटियार को छोड़ कर
 अन्य सभी प्रकार की मिट्टी में नीबू हो जाते हैं। गद्दे १५-१५ फीट
 की दूरी पर संतरे वाली रीति से तैयार करने चाहिये। खाद हर
 साल फल उतरने के बाद जाड़े के अन्त में देना चाहिये।

पौधे लगाना—परसात या जाड़े के अन्त में पौधे लगाने
 चाहिये।

फल की तैयारी और काट-छाँट तथा मिर्चाई—

नीबू में फल आने के समय में लगा कर फल मोड़ने के समय तक

मिठाई घरावर करते रहना चाहिए। काट-छाँट सूखी और व्याधि-
ग्रस्त टहनियों की होनी चाहिये। घीजू ६-७ साल में और कलमी
१-२ साल में ही फल देने लगते हैं। यदि पेड़ ६-७ साल की आयु
वा होकर भी फल न दे तो गंधक के साथ मड़ाई हुई हड्डी का
गूदा (देगो गूदा का बयान) देना ठीक होगा। यों नीचू आते
तो चारहों महीने हैं, लेकिन अच्छी बहार साल में दो बार ही
आती है। एक मावन-भादों (जुलाई-अगस्त) में और दूसरी
भाष-कागुन (जनवरी-फरवरी) में। फलों को टोकरीयों में रख
कर कहीं भी भेजा जा सकता है। दूसरे उन्नत देशों में नीचू पर
अध्या रंग लाने के लिए एक प्रकार की गैस का प्रयोग किया
जाता है, जिसे एथिलीन गैस (Ethylene gas) कहते हैं।
एक हजार घन फुट जगह के लिए एक घन फुट गैस छोड़ी जाती
है। इसके लिए ग्यास प्रकार के कमरे बनाये जाते हैं, तब इस
गैस का प्रयोग किया जाता है।

उपयोग और गुण—कागजी नीचू अधिकतर औषधि के
काम आते हैं। इनका अचार भी पड़ता है। इनके रस को कुछ
गम करने के बाद छान कर थोड़ा-सा नमक डाल घोलों में भर
कर रखवा जाए तो महीनों तक रह जाता है। ऐसा रस दाढ़
और तरबारियों को स्वादिष्ट करने के लिए काम में लाया
जाता है।

जैसे ही नीचू अमिनीपक, कृमिनाशक, रोग-हीन, बलवत् और
स्वस्थ को उत्पन्न करता है। कागजी हड्डी, दाढ़क, कृमिनाशक,
दोह दूर करने वाला और त्रिदोषनाशक होता है।

पपैया, पपीता, एरण्ड ककड़ी

(Papaya—Carica papaya)

लंका की तरफ के पपीते बहुत मोठे होते हैं। पेड़ की ऊँचाई के विचार से पपीते दो प्रकार के होते हैं। एक वे जिनकी ऊँचाई १५-२० फीट होती है और दूसरे वे जो ७-८ फीट से अधिक ऊँचे नहीं होते। फल का वजन पाव-डेढ़ पाव से दो-ढाई सेर तक होता है। पपीते में नर और मादा पेड़ अलग-अलग होते हैं। नर पेड़ से सिर्फ फूल ही निकलते हैं। कोई-कोई ऐसा भी निकल आता है जिसमें नर फूल के साथ मादा फूल भी निकल आते हैं। ऐसे फूल के जो फल लगते हैं, वह छोटे-छोटे ही रह जाते हैं और विशेष स्वादिष्ट भी नहीं होते। अच्छे फल प्राप्त करने के लिए प्रति पचास मादा पेड़ों के साथ एक नर पेड़ भी अवश्य होना चाहिए। नर पेड़ नहीं रहने से फल छोटे और बीज-शून्य रह जाते हैं। पपीते के पौधे बीजू द्वारा तैयार किये जाते हैं। वर्षागर्भ होते ही बीजों को नर्सरी में गिरा देने चाहियें। बीस-पैंस दिन में बीज अंकुर फंक देते हैं। जब पौधे डेढ़-दो फीट ऊँचे हो जायें तब उठा कर खेत में लगा दिए जायें। खेत में लगाते समय पतले तने वाले पौधे चुनने चाहियें। क्योंकि मोटे तने वाले बहुधा नर-पौधे निकल जाते हैं।

भूमि और खाद—दस-दस फीट की दूरी पर डेढ़-दो फीट व्यास के उतने ही गहरे गढ़े खनवा कर उनमें हड्डी मिला हुआ नर मिट्टी में मिलावा दें।

सँपे लगाना - जाड़ा कम होने पर पौधों को लगाना चाहिए ।
 १. जाड़ा पैदों की पहचान बाल्यावस्था में नहीं हुआ करती । इस
 कारण में लगाने के बाद उन में बहुत से नर निबल जाते
 हैं । इसी कारण मरने के लिए कुछ पेड़ बढ़-बढ़े समूहों में भी
 नर रखने चाहिए । कुछ लोगों की सम्मति है कि नर पेड़ का
 नर काट दिया जाए तो यह सादा हो जाता है । यह बात निरास
 नहीं बनी जा सकती । फिर भी अनुभव करना चाहिए ।

[illegible][illegible]

ही जमीन में पौधे लगा देने चाहियें। पपीते में फल करीब-करीब साल भर आते रहते हैं, परन्तु जाड़े में कम आते हैं और जल्दी पकते भी नहीं—जो पक जाते हैं वे मीठे होते हैं। प्रत्येक पेड़ से प्रति वर्ष डेढ़-दो दर्जन उम्दा फल तो प्राप्त हो ही जाते हैं, वैसे छोटे-बड़े लगा कर किसी-किसी पेड़ में ४-५ दर्जन फल भी मिज जाते हैं। पपीते के फल को पेड़ पर पूरा नहीं पकने दिया जाता। जब नीचे का भाग पीला पड़ने लगे तभी तोड़ लिया जाता है।

कहीं भोजना हो तो बाँस की टोकरियों में या लकड़ी के बक्सों में भेज सकते हैं। यदि बक्सों में एक-एक फल रखने के अलहदा खाने बने हों, तो और भी अच्छा हो। क्योंकि ऐसा करने से फल एक-दूसरे से रगड़ते नहीं।

उपयोग और गुण—पपीते का फल पाचक, दस्तावर और बलवर्द्धक होता है। बड़ी हुई तिल्ली या पट की व्याधि के लिए इसका सेवन लाभप्रद होता है। कच्चे फलों की तरकारी बनाई जाती है।

फ़ालसा (Phalsa—*Grewia asiatica*)

इसका फल जंगली करींदे जितना बड़ा घेंगनी रंग का गट-मिठा होता है। पौधा बरसात में बीज बोकर तैयार किया जाता है। कहीं-कहीं पके फल तोड़ कर दो-एक रोज के लिए पानी के पड़े में छोड़ देते हैं और बाद में नर्मरी में लगा देने हैं। तीन साव तक नर्सरी में रखने के बाद रेत में लगाने हैं।

भूमि और खाद—पलुआ मिट्टी को छोड़ कर अन्य सब प्रकार की मिट्टी में हो जाता है। गहरे ८-८ फीट की दूरी पर डेढ़ दो फीट के व्यास के डतने ही गहरे बनवाने चाहियें और जब फिर से वनमें मिट्टी भरी जाए तो उसमें आठ दस सेर हड्डी मिश्रित गोबर का खाद मिलाना चाहिए। काट-छांट के बाद भी खाद दें।

पौधा लगाना—पौधा जाड़े के अन्त में लगाना ठीक होता है। करीब तीन साल की आयु के पौधे लगाए जाते हैं।

सिंचाई और काट-छांट—पौधे लगाने के साथ ही पानी देना चाहिए, घाद में आवश्यकतानुसार दिया जा सकता है। काट-छांट जाड़े में होनी चाहिये। छोटी टहनियाँ इस तरह काटनी चाहियें कि पौधे की ऊँचाई ३ फीट रह जाये।

फसल की तैयारी—पाँच छः साल में पेड़ फलने शुरू होते हैं। हर साल जाड़े में फूल आकर चैत्र-वशाख में फल देते हैं।

इसके फल दूर नहीं भेजे जा सकते। स्थानीय बाजार में ही বিক্রেते हैं।

उपयोग और गुण—पक्के फल वैसे ही खाने के फल भी माने हैं और इनका शर्बत भी बनाया जाता है। कालसा रक्त-विचार, ज्वर और वाती का नाश करता है ये पुष्टिकारक और पेट-दर्द को हरने वाला है। पत्तों से दोने और पत्तन आदि बनाये जाते हैं। फल के अन्दर २-३ बीज निकलते हैं। रंग इसका होता है।

विही—(Quince—Cydonia Vulgaris)

इसका पौधा सेब के पौधे जैसा, लेकिन उसमें कुछ छोटा होता है, इसलिए जब सेब और नासपाती के पौधों को छोटा करना होता है तो विही के पौधे पर फलम बांधते हैं, इसके पौधे क्रलम (डाली) लगा कर तैयार करते हैं। यह बहुत जल्दी लग जाती है। क्रलमें लगानी हों तो जाड़े के अन्त में लगानी चाहियें।

यह सीमाप्रान्त और अफगानिस्तान की तरफ होती है। पहाड़ों पर भी अच्छी हो जाती है। इसकी खेती भी ठीक सेब की खेती के समान की जाती है। इसके फलों की माँग बहुत कम रहती है। लेकिन सेब और नासपाती की क्रलमें बांधने के लिये इसके पौधे विशेष उपयोगी होते हैं, क्योंकि ये बढ़ते बहुत जल्दी हैं। इसका पका हुआ फल खाया भी जाता है और मुरब्बा भी बनाते हैं। ये मीठे और रसदार होते हैं।

बेर—(Ber—Zizyphus Var)

बेर भी कई प्रकार के होते हैं। परन्तु सबको तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है —(१) पैवन्दी बेर, (२) जंगली बेर, तथा (३) मड़िया बेर या मड़वेरी। पैवन्दी बेर इंच-डेढ़ इंच लम्बे, अण्डाकार में अथवा नोकीले होने हैं। इनका छिलका पतला होता है, गूदा भरा हुआ मोटा और मीठा। जंगली बेर गोल, कुछ मोटे छिलके वाले और अधिकांश खट्टे ही होते हैं। आकार में ये छोटी सुपारी के बराबर होते हैं। मड़िया बेर पकने पर लाल रंग के, गोल और गूदा नाम मात्र का। एक तरह का लेसदार रस

भूमि में पाया जाता है। स्वाद में जंगली घेर से कुछ अधिक मीठे और आकार में कांच की छोटी गोली के बराबर होते हैं। प्रथम दोनों जातियों के पेड़ २०-२५ फीट तक ऊँचे हो जाते हैं। तीसरी जाति के घेर झाड़ियों में लगते हैं, जिनकी ऊँचाई ३-४ फीट से अधिक नहीं होती। पैवन्दी घेर नागपुर, बनारस, फरुखाबाद आदि स्थानों में अच्छे होते हैं। दूसरी जाति के घेर सब जगह जंगलों में पाये जाते हैं। तीसरी जाति के घेर राजस्थान और दिल्ली के इलाकों में अधिक होते हैं। बगीचे में यदि लगाने हों तो पैवन्दी ही लगाने चाहियें।

घेर के पौधे धीजू या चश्मे से नैयार किये जाते हैं। धीज लगाने हों तो ताजे ही घीने चाहियें। जब पौधे एक साल की उम्र के हो जाते हैं तब उन पर रिंग फार्मिंग से चश्मा चढ़ाया जाता है। जंगली घेर का घड़ आषाढ़ (जून) में काट देने में जुलाई में वन में नये फोंपल फूट आते हैं, जिन पर कलम चढ़ाई जा सकती है। जिस हाली में चश्मा लिया जाता है, उसे पानी में कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाये तो छाल जल्दी छूट जाती है। चश्मा, बरसान में जब फोंपल निपलते हैं तब चढ़ाना चाहिए। घीने काटने के प्रारंभ तक चश्मा चढ़ाया जा सकता है। पौधे वही भेजने हों तो टोकरियों में रख कर भेज सकते हैं।

भूमि और खाद—पुष्पा जमीन को छोड़ कर और सब तरह की जमीन में घेर हो जाता है। लेकिन भड़बेरी प्रायः पुष्पा में ही अच्छे होते हैं। पकरी बेरी के पेड़ २०-२० फीट

की दूरी लगाये जाने चाहियें। इसलिए जुताई अच्छी तरह कर के बाद गड़े २०-२० फीट के अन्तर पर बनवा लिये जायें। २-२॥ फीट गहरे और उतने ही व्यास के गर्मी के दिनों में तैयार करा लेना चाहिए। निकली हुई मिट्टी में सेर-सवा सेर हरी चूर्ण, कुछ राख और करीब आधा मन गोबर-पत्ते का खाद मिला देना चाहिए। प्रति वर्ष फल आने के बाद जड़ें खोल कर कुछ खाद दे देना चाहिए। यदि सिंचाई न हो सके तो ज्येष्ठ के अन्त में खाद दे दें।

पौधा लगाना—बरसात या जाड़े के शुरू में पौधे लगाने चाहिये।

सिंचाई और काट-छांट—साधारण सिंचाई होनी चाहिए। फूल आने के समय से फलों की बढ़त तक पानी कुछ अधिक देना पड़ता है। फल मिलने के बाद काट छांट करनी चाहिए। करीब २ सत्र टहनियां शाखाओं के निकट से काट देने से शाखायें बहुत जल्दी नये कोंपल फेंक देती हैं।

फसल की तैयारी और चालान—कलमी पेड़ ६-७ साल की आयु में और चीजू १०-१२ साल के होने पर अच्छे फल देते हैं। जाड़े के प्रारंभ में आते हैं, जिसे कहीं-कहीं खीचड़ी भी कहते हैं। फल माघ से चैत्र (जनवरी से मार्च) तक मिलते रहते हैं। पैदावार एक-एक पेड़ से ५-६ मन तक हो जाती है। फल थोरो में भर कर भेजने की अपेक्षा टोकरियों में रगड़ कर भेजना कहीं अधिक अच्छा है। क्योंकि थोरो में बहुत-से घेर बिगड़ जाते हैं।

एक भेजे जाने वाले बीजों को कम धरम तोड़ना चाहिए जब वे रुद्ध होने लगें।

उपयोग और गुण—फल गाने के काम आते हैं। जंगली बीजों का उपयोग या घटनी बनाई जा सकती है। घेर शीतल, शलाकर, पुष्टिकारक होने के अतिरिक्त रक्त साफ करने तथा दाह और प्यास को दूर करते हैं। वज्र घेर पित्त-कारक तथा कफ-घटक होते हैं। मर्दिया घेर अधिक नहीं गाने चाहिये।

बेरीगुज, मकोय, टिपारी--(Gooseberry or)

(Cape Gooseberry—*Physalis peruviana*)

इसका फल जंगली घेर के आकार का पीले रंग का होता है। और मूखे पत्ते जैसे फूल की पहली पंक्तियों (Calyx) में ढका रहता है। इसकी गेती जहाँ वाला नहीं बढ़ता वहाँ हो जाती है। प्रतिवर्ष नये पौधे लगाने पड़ते हैं। पौधे तैयार करने के लिए बरसात में बीज नर्सरी या लकड़ी के गमलों में लगाये जाते हैं। जब बरसात समाप्त हो जाती है और पौधे ४-५ इंच के हो जाते हैं तब उठाकर निर्धारित स्थान पर लगा देते हैं।

भूमि और खाद—अच्छी उपजाऊ दुमट खमीन इसके लिये ठीक होती है। करीब तीन सौ मन खाद और तीन मन हड्डी का चूर्ण प्रति एकड़ डाल कर गर्मी और बरसात में अच्छी जुताई करनी चाहिए।

पौधे लगाना—उपयुक्त रीति से नर्सरी में तैयार किये हुए पौधे खेत में बरसात के अन्त में अर्थात् आश्विन में दो-दो फीट

फी दूरी पर पंक्तियों में लगाने चाहियें। पंक्तियों में ३-३ फीट का अन्तर होना चाहिए।

सिंचाई और काट-छाँट—जब पौधे एक फुट ऊँचे हो जायें तो बीच की पुनगी तोड़ देनी चाहिए। ऐसा करने से नई शाखाएँ अधिक संख्या में निकल आती हैं और फल अधिक प्राप्त होते हैं। सिंचाई आवश्यकतानुसार करनी चाहिए।

फसल की तयारी और चालान—इसके फल जाड़े में तैयार हो जाते हैं और फाल्गुन (मध्य मार्च) तक मिलते हैं। जब फल पीले हो जायें तब तोड़ने चाहियें। फल निकट के बाजारों में टोकरियों में भर कर भेजे जा सकते हैं।

उपयोग और गुण—फल वैसे ही खाये जाते हैं। ये बड़े मीठे और स्वादिष्ट होते हैं। इनका मुरब्बा भी बनाया जाता है। विशेषतः इसी के लिए इनकी खेती होती है।

वेरी-ब्लैक (Black-berry—Rubus fruticosus)

इसके पौधे बीज या टोंटे (Offset) से पैदा करते हैं।

भूमि और खाद—दुमट मिट्टी में यह लगाई जाये तो अच्छा रहती है। इसके लिये एक फुट गहरे गढ़े बनवाकर उनमें २-२½ सेर खाद देना चाहिए। गढ़ों में तीन फीट का और पंक्तियों में चार-चार फीट का अन्तर ठीक रहता है।

पौधे लगाना—बरसात में छोटे टोंटे लगा देना चाहिए।

सिंचाई और काट-छाँट—सिंचाई आवश्यकतानुसार होनी चाहिए। फल ले लेने के पश्चात् या जाड़े के प्रारंभ में जिन

दरतलों से फल प्राप्त हो जायें उन्हें फाट देना चाहिये, क्योंकि फल हर साल नये कोंपलों पर आते हैं ।

फसल की तैयारी—पौधे लगाने के समय से दो साल में फल आना प्रारंभ होते हैं और चैत्र-वैशाख (एप्रिल-मई) में मिलते हैं ।

उपयोग और गुण—फल वैसे ही खाये जाते हैं, परन्तु विशेषतः मुरब्बे के लिये काम में लाये जाते हैं । बेरी और भी कई प्रकार की होती हैं जैसे रास्प बेरी, ब्यूबेरी इत्यादि । इन सब की खेती करीब-करीब ब्लैक बेरी के समान की ।

बेरी-स्ट्रू—(Straw berry—*Fragaria vesca*)

इसका पौधा बहुत छोटा होता है और लताएं इधर-उधर पड़ी रहती हैं । यह मैदानों में भी हो जाता है, परन्तु पहाड़ों पर अच्छा होता है । फल लाल रंग के छोटी लीची जैसे होते हैं ।

भूमि और खाद—टुमट जमीन इसके लिये अच्छी होती है । गर्मी में तीन माँ से चार साँ मन त्याग प्रति एकड़ देकर परमान के अन्त में इसे लगा सकते हैं । खेती की जुताई भली प्रकार करने के पश्चात् खेत के ढालानुसार क्यारियाँ बनाकर इनमें लगानी चाहिए । इसे पारियों पर भी लगा सकते हैं । उस स्थिति में नालियाँ दो-दो फीट के अन्तर पर होनी चाहियें ।

पौधे लगाना—पहाड़ों पर आदिवन-वार्तिक (निम्ब-अबट्टर) या कालगुन क्षेत्र या तो जाड़े के अन्त में लगानी चाहिए । मैदानों में जाड़े के प्रारंभ में लगाना ठीक होगा ।

सतयाँ १५ से १८ इंच की दूरी पर और पौधे एक-एक फुट दूरी पर लगाने चाहियें। यदि पारियों पर लगाना हो तो उपर्युक्त रीति से लगाई हुई पारियों पर बीच में एक-एक फुट की दूरी पर लगा देना चाहिये।

घरसात में इसके पौधे खेत में छोड़ दिये जायें तो मर जाते हैं। इसलिए वहां से उठाकर छाया में लगा देने चाहियें जिसमें घरसात से घन जाये।

निंदाई और सिंचाई—खेत में घास-पात साफ करते रहना चाहिये। सिंचाई आवश्यकतानुसार करें। फल पकने लगें उस समय पानी कम देना चाहिये। फलों की बढ़ के दिनों में क़रीब १५ मन पोटाश का खाद दिया जाये तो फल मोटे भी होते हैं और मोठे भी अच्छे होते हैं। सुन्दरता भी फलों की बढ़ जाती है। उपर्युक्त खाद के अभाव में ८-१० मन राख डालनी चाहिये।

फसल की तैयारी और चालान—मैदानों में चैत्र-वैशाख और पहाड़ों पर माघ-फाल्गुन में फल मिलते हैं।

उपयोग—फल वैसे ही खाये जाते हैं, परन्तु बहुधा मुरब्बा बनाने के काम में लाये जाते हैं। मलाई और चीनी के साथ खाने से स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है।

बेल--(*Bel-Aegle marmelos*)

यह भारतवर्ष में प्रायः सब स्थानों में पाया जाता है। फल गेंद के आकार से लेकर नारियल जितने बड़े होते हैं। पौधा

से तैयार किया जाता है। पौधों का चालान टोकरीयों में मकता है।

भूमि और खाद—इसके खेत के खेत नहीं लगाये जाते। चूंकि फल में अच्छा गुण है, इसलिए बड़े फल वाले बेलों की जाति के एक या दो पेड़ साधारण फलों के लगाने की रीति अनुसार बरसात में लगा देने चाहिये।

सिंचाई और काट-छाँट—सिंचाई साधारण और काट-छाँट खेत में जब भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए बेलपत्र तोड़े जाते हैं, उस वक्त करा देनी चाहिए ताकि दोनों काम एक साथ जायें और पत्तों में कुछ आय भी हो जाये।

फसल की तैयारी—लगाने के समय से ५-८ साल में फल देनेना प्रारंभ होते हैं। पके फल वैशाख-ज्येष्ठ (अप्रैल-मई) में मिलते हैं। फल चूंकि बड़े सस्ते पिकते हैं। अतः निरुद्वर्ती बाजार में ही गाड़ी भर कर भेजे जा सकते हैं।

उपयोग और गुण—पत्ते शिशु-पूजन में काम आते हैं। पके हुए फल का गूदा बहुत लोग बेसे ही खाते हैं। कुछ लोग दूध और चीनी के साथ शर्बत बना कर गर्मी में पीते हैं। कच्चा फल पाचक होता है। भून कर चीनी के साथ खाया जाये तो दम और पेचिश को रोकने वाला तथा पेट के दर्द को मिटाने वाला होता है। पका फल टंडा और हल्का दमाघर होता है।

रामफल, नीला

(Bullock's heart—Anona reticulata)

इसे कुछ लोग मीनाफल भी कहते हैं, परन्तु हमने अभी तक यह मीनाफल शीताल का बिना है। गूरे के रंग और फीत के आकार में देखा जाये तो इसमें और मीनाफल में बहुत ही कम अन्तर है। शरीर में मीनाफल में गूदा कम मोटा होता है। ऊपरी आकार में दोनों के बीच बड़ा भेद है। मीनाफल की कलियाँ गुप्ती हुई प्रतीत होती हैं और रामफल ऊपर से मार होता है। मीनाफल हरे रंग का होता है और रामफल पकने पर हरे के बैंगनी रंग का हो जाता है। इसकी गंध तीव्र सीताफल (शरीर) के समान होती आदि। जब सीताफल गर्मियों में नदी किनारे तब इसका फल प्राप्त होता है। यही इसकी खेती से लाभ है।

रेन्ता, रेती ककड़ी

Cucumber—Cucumis Var utilitimus

यह गर्मी के दिनों में मिलने वाली ककड़ी है जो पहले हरे और फिर अंगूरी रंग की हो जाती है। छोटे फलों पर कुछ रोये भी होते हैं। फल प्रायः डेढ़ फीट लम्बे और डेढ़-दो इंच तक मोटे होते हैं। लखनऊ की ककड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं।

भूमि और खाद—खरबूजे की भांति यह भी नदी-नालों की पलुआ भूमि में होती है। प्रति एकड़ डेढ़ सौ मन खाद दो फीट

पौधों, छाट-दम डूब गहरी गीन गीन पीट की दूरी पर नालियाँ बन कर खसरी मिट्टी में गिरा देना चाहिये।

सोघाई—माघ-सावन (जनवरी-फरवरी) में उपयुक्त रीति से की हुई नालियों में गीन-गीन पीट दूरी पर दो-दो धीज लगा देने चाहिये। एक एकड़ के लिए प्रायः एक सैर धीज की आवश्यकता होती है।

मिनाई और छाट-छाँट—साधारण मिखाई होनी चाहिये। मिनाई या मोहनी के समय दो-दो पौधों में से एक एक सबल को रख कर निर्बल को हटा दें।

कमल की तैयारी—वैशाख-ज्येष्ठ में इसके फल पक जाते हैं। ककड़ियों कहीं भेजनी हों तो छिछली टोकरियों (जो अधिक गहरी न हों) ऐसी टोकरियों में रख कर भेजने से टोक रहता है। बरनों और गूणों (मुतली की जाली) में रख कर भी भेजते हैं।

उपयोग और गुण—हरी ककड़ियाँ कच्ची खाई जाती हैं। इनकी तरकारी भी बनती है। ये शीतल, हल्की और रुचिकारक होती हैं। दूमरी कमल के लिये धीज रखना हो तो पकी हुई स्थस्थ ककड़ियों से लेकर रख सकते हैं।

लीची—(Lichi—Nepbelium litchi)

यह चीन देश में अधिकता से होती है। भारतवर्ष में देहरादून, सहारनपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, हुगली के आस-पास तथा आसाम के शुद्ध भागों में भी इसकी खेती की जाती है। इसका पौधा दाम कलम या गूटी से तैयार किया जाता है। बत्तर

प्रदेश में दाब कलम वैशाख-ज्येष्ठ (एप्रिल-मई) में लगाई जाती है । गूटी एक साल की आयु की स्वस्थ टहनी बरसात के अन्त में यानी मध्य अगस्त में बांधनी चाहिए । गूटी बाँधने की टहनी को धील कर करीब ३ सप्ताह तक वैसी ही खुलो छोड़ देनी चाहिए और जब कटी हुई छाल के निकट कुछ फूली हुई पाइ-सी नजर आये तब उसमें मिट्टी बाँधनी चाहिए । यदि ३ सप्ताह में भी फूली हुई बाढ़ नजर नहीं आये तो उस टहनी पर मिट्टी न बाँध कर उसे छोड़ ही देना चाहिए । करीब दो ठाँ महीने में गूटी पेड़ से पृथक करने योग्य हो जाती है । बाँधी हुई मिट्टी के बाहर जड़े दिखाई दें तो उसके दो सप्ताह बाद गूटी वाली टहनी को काट कर नर्सरी में लगा देना चाहिए । पीछे कड़ी भेजने से तो उनका चालान टाकरियों में रख कर आमानी से किया जा सकता है ।

भूमि और खाद—कच्चार दुमट जमीन जिसमें नूने की मात्रा अधिक हो इसके लिए अच्छी होती है गड़े तीन फीट व्यास के और उतने ही गहरे पचीस फीट की दूरी पर बनाने चाहिये । प्रत्येक गड़े के मिट्टी में पचीस-तीस गैर गोबर का गाद और दो-ढाई गैर हड्डी पिसी हुई साजनी चाहिये । फस मिशने होने का वक्त में गाद जनपरी में, या मिशने का प्रबन्ध न हो तो पत प्राज करने के पदपान (आवाद—गूँ) में गाद दे देना चाहिये । गोबर के गाद के साथ २ ३ गैर नीम या एगर्डी की जाली, दो हेर हड्डी या कूँ गोबर ३-४ गैर गाद प्रति वर्ग दे देना चाहिये ।

लौरी के लिए मटलो वा खाद भी अच्छा रहता है। मिल सकने
 दो प्रति वृत्त ३-४ मेर दे देना चाहिए।

पौधा लगाना—परमात में पौधे लगाने चाहिए। जाड़े के
 फल तक भी लगा सकते हैं।

निचाई और काट-छांट—सिचाई पहले २-३ साल तक की
 जाती है। बाद में बिहार प्रान्त में नहीं की जाती, परन्तु जहाँ की
 भूमि में तरी कम हो गर्मी में सिचाई अवश्य होनी चाहिए।
 काट-छांट जब फल तोड़े जाते हैं उस वक्त हो जाती है। फलों
 के गुच्छे के गुच्छे तोड़े जाते हैं, इनके साथ कुछ टहनियाँ भी
 काटी जाती हैं। फल दूसरे साल नई खाद आने पर आते हैं।
 अधिक आयु हो जाने पर जब पेड़ नहीं फलते या फल पड़े हुए
 गिरने लगे तो छांटी २ सत्र शाखाएँ काट दी जाती हैं। ऐसा करने
 से जो नई शाखाएँ निकलती हैं उनसे दो-एक साल के लिए अच्छे
 फल मिल जाते हैं। फलों के पकने के समय यदि गरम हवा चल
 जाये तो फल पट्ट बर गिर जाते हैं और यदि उस समय एक
 अच्छी वर्षा हो जाए तो फल बड़े खादिए और बड़े-बड़े हो जाते
 हैं। गर्म हवा से बचाने के लिए हवा की गेद वा प्रदूषण कर देना
 चाहिए।


फसल की तैयारी—पौधा लगाने के समय से पांच-छः
 साल की उम्र होने पर पेड़ फल देना शुरू करते हैं। लगभग
 पचास साल की उम्र तक फल मिलते रहते हैं। फल पड़ने हरे,
 पीले और पकने पर हल रंग के हो जाते हैं। फलों का बखान

उनके दँठल सहित लीची या शीशम के पत्तों के साथ छोटी २ टोकरियों में होना चाहिए। प्रत्येक टोकरी में पाँच-छः सौ लीचियां भरी जा सकती हैं।

उपयोग—लीची का गूदा खाया जाता है जो बड़ा मीठा और रसदार होता है। चीन में लीचियों को सुखा कर इंग्लैंड और अमेरिका आदि देशों में भेजा जाता है। सूखने पर लीचियों का रंग काला हो जाता है।

लोकाट—(Loquat—*Eriobotrya japonica*)

इसकी पैदावार भी चीन और जापान आदि देशों में अधिकता से होती है। वहीं से यह भारतवर्ष में भी आया है। पौधा बीजू, चश्मा, गूटी या भेंट कलम से तैयार किया जाता है। बीज जहां तक हो तजे ही बोये जाने चाहियें। कलम या गूटी आपाढ़-श्रावण में और चश्मा चैत्र मास में चढ़ाया जाता है। पौधे कहीं भेजने हों तो क्रेट में भेजने चाहियें।

भूमि और खाद—यह सब प्रकार की मिट्टी में हो जाता है। गढ़े २०-२० फीट की दूरी पर दो-ढाई फीट व्यास के प्रायः इतने ही गहरे गर्मी में बनवाने चाहिये। प्रत्येक गढ़े की मिट्टी में दो सेर हड्डी का चूर्ण, कुछ राख और आधा मन गोबर का खाद देना चाहिए। जाड़े के प्रारंभ में जड़ें खोल कर दो-एक सप्ताह बाद हड्डी मिली हुई खाद देकर उन्हें बन्द कर देना चाहिए। प्रत्येक पौधे के पीछे पाण्डे नम्र  इतना खाद या

काया पाव नष्टजन पूर्वा कृत्रिम ग्वाद दे दिया जाए तो अम्बदा हो।
एक मेर के करीब दही या घुर्ण भी देना ठीक है।

पौधे लगाना—जाड़े के अन्त में पौधे लगाने चाहिए।

सिंचाई और काट-छांट—आवश्यकतानुसार सिंचाई होनी चाहिए। फल पकने लगें तब भी सिंचाई करते रहना चाहिए। काट छांट जो सूखी और निकम्मी टहनियां हों निकाल देनी चाहियें। जड़ कार्मिक में खोली जायें।

फमल की तैयारी—पाँच छः साल की आयु होने पर पेड़ फलते हैं। प्रतिवर्ष फाल्गुन-चैत्र में फल मिलते हैं। पकने पर फलों का रंग पीला हो जाता है। फल निकट के बाजार में टोक-रियों में रख भेजे जा सकते हैं। दूर के लिए लीची की तरह।

उपयोग और गुण—फल का गूदा खाया जाता है जो गटमिटा होने के कारण स्वादिष्ट होता है। यह शीतल और वृत्ति करने वाला होता है। इसकी चटनी भी बनती है।

शफतालू

(Nectarine—*Amygdalus persica* Uarlacuis)

यह भी एक प्रकार का आड़ू ही है जो पहाड़ों पर अधिक होता है। आड़ू का दिलका रोयेंदार हल्के मलमल जैसा मालूम होता है और शफतालू का साफ होता है। इसकी खेती आड़ू की खेती के समान की जाती है। पौधे लगाने के समय से आड़ू तीन साल में और यह पाँच साल में फल देता है। इसके पौधे आड़ू या आलूबुखारा पर क्रमशः बंध कर तैयार किये जाते हैं।

शरीफा, सीताफल

(Custard apple—Anona squamosa)

यह फल भारतवर्ष में प्रायः सभी प्रान्तों में पाया जाता है और जंगलों में बिना देखभाल के हो जाता है। जहां वर्षा बहुत कम होती है वहां और जहां सर्दी बहुत पड़ती है वहां यह नहीं होता। पौधे बीज से तैयार किये जाते हैं। ताजे बीज ही नर्सरी में बो कर सिंचाई करते रहने से पौधे यथा समय तैयार हो जाते हैं।

भूमि और खाद—यह दुमट और बलुआ-दुमट मिट्टी में अच्छा होता है। गर्मी में पन्द्रह फीट की दूरी पर दो-तीन फीट व्यास के और दो फीट गहरे गढ़े बनवा कर उनकी मिट्टी में दस पन्द्रह सेर हड्डी मिली हुई खाद दे देना चाहिये। फल आने लगें इस समय से प्रतिवर्ष शरद ऋतु में जड़ें खोल कर या बरसात के पहले कुछ खाद दिया जा सके तो अच्छा हो।

पौधे लगाना—वर्षा ऋतु में पौधे लगाये जाते हैं।

सिंचाई और काट-छांट—सिंचाई आवश्यकतानुसार होनी चाहिए। काट-छांट सूखी टहनियों की की जानी चाहिए। पत्ते माघ-फाल्गुन में झड़ते हैं और चैत्र मास में नये पत्ते और फूल आने लग जाते हैं।

फसल की तैयारी—पौधे लगाने के समय से चार-पांच साल में पेड़ फल देने योग्य हो जाते हैं और १५-२० साल तक फल देते रहते हैं। प्रति वर्ष आषण-भाद्रपद (जून-जुलाई) से

श्रीरक्त-श्रगहन (अम्बुश्वर-नक्षत्र) तक फल मिलते रहते हैं। जब फल की कलियों के जोड़ पादर में मफेद होने लगें तब फल तोड़ने चाहियें। ऐसे फल घाव में रग देने से तीन-चार दिन में पक जाते हैं। फलों का चालान घाव की टाकरियों में किया जा सकता है।

उपयोग और गुण—फल मीठे होने के कारण बैसे ही खाये जाते हैं। ये शीतल, पलवङ्क, हृदय के लिये हितकारी और कफकारक होते हैं।

शहतूत, तूत—(Mulberry)

सफेद (Morus alba) काला (Morus Nigra)

ये दो प्रकार के होते हैं—सफेद और काले। पहली जाति के फल इंच-डेढ़ इंच लम्बे या गोल होते हैं। दूसरी जाति के विशेषतः लम्बे ही होते हैं। पाँचे पीठ या कलम (डाली) लगा कर तैयार किये जाते हैं। विशेषतः डाली से ही तैयार करते हैं। फलमें श्रगहन-पौष (नवम्बर-दिसम्बर) में लगानी चाहियें। फलमों का चालान यदि कुछ दूर के लिये करना हो तो कोयले के धूर में करना ठीक होगा।

भूमि और खाद—वेशम के कीड़े पालने के लिये जब यह लगाया जाता है तब खेत के खेत इसके लगाने पड़ते हैं, नहीं तो एक-दो पेड़ ही काफी हैं।

पौधे लगाना—नर्सरी में तैयार किये हुए पौधे मिलें तो चरसान में लगा दें।

सिंचाई और काट-छाँट—साधारण सिंचाई होनी चाहिए। जब फल आने लगें तब से जब तक फल समाप्त न हो जायें पानी पूरा देना चाहिए। काट-छाँट भी साधारण ही होनी चाहिए। जो शहतूत रेशम के कीड़े पालने के लिये लगाया जाता है, उसकी काट-छाँट बहुत करनी पड़ती है, जिससे पत्ते अधिक से अधिक आवें।

फमल की तैयारी—कलमी पौधे तीन साल की आयु के होने पर फल देते हैं और प्रतिवर्ष चैत्र-वैशाख (एप्रिल-मई) तक फल मिलते रहते हैं। फल निकट के बाजार में कम गहरी (छिछली) टोकरियों में रख कर भेजे जा सकते हैं।

उपयोग और गुण—पत्ते रेशम के कीड़े खा-खाकर पुष्ट होते हैं। फल वैसे ही खाये जाते हैं। इनका रस भी निकाला जाता है जिससे शरबत बना कर पीते हैं।

शहतूत भारी, शीतल, और पित्तनाशक होता है।

सन्तरा, माल्टा, मौसम्बी

(Orange—*Citrus aurantium*)

हमारे यहां दो जगहों के सन्तरे विरोध प्रसिद्ध हैं—नागपुरी और सिलहटी। नागपुरी की अपेक्षा सिलहटी सन्तरे छोटे, परन्तु कम बीज वाले और मीठे अधिक होते हैं। उपर्युक्त स्थानों के अतिरिक्त सन्तरे देहली, लाहौर, मुल्तान, पूना, मद्रास, लंका, नेपाल, भूटान आदि स्थानों में भी अधिकता से होते हैं। इसकी किस्म निम्नप्रति श्रेणी की जा रही है।

माधारणतः सन्तरो की जातियाँ तीन भागों में बांटी जाती हैं—

(१) ढीले और मोटे छिलके वाले नारंगी या पीले रंग के ।

(२) बिपके हुए पतले छिलके वाले पीले रंग के ।

सन्तरे की यह दोनों जातियाँ आसानी से छीली जा सकती हैं और छीलने पर अन्दर की फाँकें सहूलियत से अलग-अलग हो जा सकती हैं ।

(३) माल्टा या मौसम्बी-पंजाब की तरफ इस जाति के सन्तरे को माल्टा कहते हैं और गुजरात की तरफ मौसम्बी कहते हैं । सन्तरे का पेड़ सीधा लेकिन माल्टे का फैला हुआ होता है । फल छोटे, पीले रंग के बिपके हुए मुरमुरे धारीदार छिलके वाले होते हैं । इनका छिलका जल्दी नहीं छूटता और रस भी आसानी से नहीं निकलता । पहले दो प्रकार के सन्तरो की अपेक्षा इसका रस मोटा और एक निराले स्वाद का होता है । स्वास्थ्य के लिये सन्तरो की अपेक्षा इनका आदर अधिक है ।

सन्तरे के पीछे चट्टमा चढ़ा कर सेंयार बिये जाते हैं । बदना बानिक से पीप (अक्टूबर से दिसम्बर) तक चढ़ाया जाता है । बदने के लिये बीजू पीपे मोठे या जमेरी बीजू के बीज से सेंयार किये जाते हैं । बीजू के बीज को उपज-शाकिन बहुत शीघ्र नष्ट हो जाती है इसलिए ताजे बीज ही जमेरी या गमलों में लगा देने चाहिये । पानी बराबर मिलता रहे तो यह पीपे दरसान के दरसान तक १-२ ई.व. बढ़े हो जाते हैं, उन बदन इन्हे बसंती के

४-५ ईश की दूरी पर लगा लगाकर कार्तिक में यहां से हटाकर एक या छेद फुट की दूरी पर लगा देना चाहिए। दूसरे कार्तिक तक ये पौधे चश्मे चढ़ाने योग्य हो जाते हैं। चश्मे के लिए ऐसे पौधे चुनने चाहिए जिनके तने का घेरा लगभग ३.४ या ३.६ सें. हो अथवा ठनड़ी मोटाई हाथ की छोटी अंगुली के समान हो। जब चश्मा जनेरी नीचू के पौधे पर चढ़ाया जाता है तो फल दीर्घ द्रिलक के वाले कुछ कम मीठे होते हैं परन्तु पैदावार अच्छी होती है। मीठे नीचू के ऊपर चढ़ाया जाये तो फल मीठे और चिपके हुए द्रिलक के वाले होते हैं। माल्टा (मौसम्बी) का चश्मा मीठे नीचू पर ही ठीक रहता है। इससे पेड़ छोटे होकर बहुत मीठे फल देते हैं, लेकिन पैदावार कुछ कम होती है।

चश्मा चढ़ाई जाने वाली ढाली पारसल द्वारा कोयले के चूर्ण में रख कर बाहर से भी मंगवाई जा सकती हैं। पेड़ से पृथक होने पर भी दो-तीन सप्ताह तक इसके चश्मों में उपज की शक्ति बनी रहती है।

सन्तरो के पौधे पौष-माघ में बीज लगा कर भी तैयार किए जा सकते हैं। परन्तु ऐसा करने से पेड़ देरी से फल देते हैं। इतना ही नहीं, पेड़ों में काँट भी अधिक हो जाते हैं जिनसे कभी-कभी फलों में भी छेद हो जाता है। ऐसे पेड़ करीब १०-१२ साल की आयु होने पर फल देना प्रारम्भ करते हैं। बीजू से मोधे पैदा करने में यह लाभ होता है कि पेड़ दीर्घजीवी होता है। यहाँ कलमो पेड़ की आयु केवल बीस वर्ष की होती है यहाँ

पेड़ से उत्तम पौधा ५०-६० साल तक फल देता रहता है।
 इसी कारण है कि आसाम और तम्र देश आदि में धीजू पेड़ ही
 अधिक लगाये जाने हैं। पाथों का बालान क्रोट में किया जाता
 है। समीप होने पर टोकुरियों में भेज सकते हैं।

भूमि और खाद—सन्तरे के लिए ऐसी दुमट मिट्टी जिसमें
 नीचे की भूमि में घूने के कण्डू हों और जिसमें पानी नहीं लगता
 हो, उत्तम होती है। गर्मी में सन्तारों के पेड़ के लिए पन्द्रह
 फीट और मौसमों के लिए लगभग दीस फीट की दूरी पर गढ़े
 बनवाने चाहिये। आसाम में सन्तरे १० फीट और दक्षिण भारत
 में २० फीट की दूरी पर लगाये जाते हैं। नागपुर में १५ से १८
 फीट की दूरी ठीक मानी जाती है। गढ़े दो-छाई फीट व्यास के
 सोन फीट गहरे होने चाहिये और प्रत्येक गढ़े की मिट्टी में दो
 सेर दड़ही बिनी हुई, पाँच सेर राख और २५-३० सेर गोबर का
 गड़ा हुआ खाद मिलाना चाहिये। दो-तीन सप्ताह तक धूप मिलाने
 के बाद मिट्टी में खाद मिला कर गढ़े भर देने चाहिये। फिर एक
 बारिश के बाद आवश्यकतानुसार गोद कर इन गढ़ों में पाँच
 लगाये जा सकते हैं। पतल आने होंगे हम वक्त से पतल ले लेने
 के बाद ही ब्येत (मई) के आख में जड़े खोद कर एक-दो
 सप्ताह बाद उनमें खाद दे देना चाहिये। गोबर के खाद के साथ
 दड़ही का घूला और राख भी दी जा सकती है क्योंकि राख
 पत्ती आसानी से मिल गये तो प्रत्येक बीघे बीघे दो सेर राख,
 दो सेर राख और एक सेर बिनी हुई दड़ही दी जाती है।

कृत्रिम खादों में एक पाव एमोनियम सल्फेट या सोडियम नाइट्रेट
 आधा सेर सुपरफास्फेट और इतना ही पोटेशियम सल्फेट भी
 देना चाहिए। कृत्रिम खाद या खली दी जाये तो जाड़े और गर्मी
 की दोनों फसलें ली जा सकती हैं। परन्तु पौधों के स्वास्थ्य का
 विचार करते हुए एक फसल लेना ही ठीक होगा। यदि दोनों
 फसलें लेनी हों तो जड़ों को अधिक दिनों तक खोल कर न रक्खा
 जाये। दोनों फसलों के फल तोड़ने के बाद ही मिट्टी में कृत्रिम
 खाद मिला, कर जड़ें ढक दी जायें। गर्मी की फसल प्राप्त करने
 के लिए वैशाख-ज्येष्ठ (एप्रिल-मई) में सिंचाई बंद करके वर्षारम्भ
 होने के पूर्व खाद दे देना चाहिए। ऐसा करने से जून में फूल
 आधेंगे, जिन से ६-१० महीने बाद मार्च-एप्रिल में फल मिलने
 लगेंगे। यदि जाड़े की फसल लेनी हो तो पौष (दिसम्बर) में
 जड़ें खोल कर खाद देने के बाद सिंचाई शुरू कर देनी चाहिए।
 इससे माघ-फाल्गुन में फूल आकर जाड़े में फल मिलेंगे। जाड़े
 की फसल लेने के लिए गर्मी में बराबर सिंचाई करनी पड़ती है।
 वर्षाकाल में सन्तरो को एक प्रकार का पतंगा बहुत हानि पहुँचाता
 है। वह फलों में छेद कर देता है, जिससे फल पेड़ से नीचे गिर
 जाते हैं। इससे फलों की रक्षा करने तथा सिंचाई से घबरे के
 लिए गर्मी की फसल लेना ही उचित है।

पौधा लगाना—बरसात और जाड़े में लगाये जा सकते हैं।

किन जहाँ तक हो सके बरसात में ही पौधे लगाने चाहियें।

सिंचाई और काट-छाँट—सिंचाई साधारण होनी चाहिए।

जाड़े की फसल के लिए फूल माघ (जनवरी) में और गर्मी की

फमल के लिए आषाढ़ (जून) में आते हैं । मिर्चाई जाड़े और गर्मी दोनों में नहीं तो गर्मी में तो अयश्य करनी ही पड़ती है । गर्मी की मिर्चाई में ऐसा कि ऊपर बतलाया गया है । उभी हालत में छुंधारा हो सकता जब कि जाड़े की फमल न ली जाये । छोटे पेड़ों की काट-छाँट आकार के लिए की जाती है । बड़े पेड़ों में सूखी या व्याधि-ग्रस्त टहनियाँ काटनी पड़ती हैं । पेड़ के घड़ पर या डालियों पर से कभी-कभी गोंद जैसा एक पदार्थ (Gum-mastic) निकलता है । इससे पेड़ या घड़ डाली मर जाती है । जब ऐसा दिखाई दे तो उस भाग को छील कर वहाँ पर फार्मालिक एसिड और पानी बराबर मिला कर लगा देना चाहिए । इसके बाद ऊपर से मोम या अलकतर (तारकोल) गर्म करके लगा देना चाहिए ।

फमल की तैयारी—पौधे लगाने के समय से ४-५ साल में फल आने शुरू हो जाते हैं और हर साल दो बार फल देते हैं । पहली फसल के फल जाड़े में और दूसरी फसल के गर्मी (मार्च-एप्रिल) में प्राप्त होने हैं । प्रत्येक पेड़ में पाँच सौ से हजार फल तक की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा अनुमान है ।

उपयोग और गुण—सन्तरी मीठा, शीतल, पाचक और पेशाब साफ लाने वाला होता है । सन्तरे की फाँकें चूस कर खाई जाती हैं और मारुटे का रस निकाल कर पिया जाता है । दिलकों से सुगंधित सत प्राण कर उसका मारमनेट बना सकते हैं । सन्तरे का सेवन करने से स्तर्षी आदि व्याधि दूर हो जाती हैं । सन्तरे

में सेवन करने से तबीअन अच्छी रहती है। व्याधि से ठे हुए लोगों के लिए माल्टा अच्छा हाता है।

सपाटू, चीकू (Sapato—Achros sapota)

इसका फल भूरे रंग का खुरखुरा एक इंच से ढेढ़ इंच लम्बा और एक इंच व्यास का होता है। इसकी एक जाति ऐसी भी है जिसके फल छोटे घेल जैसे बड़े होते हैं। पके हुए फल के अन्दर का गूदा भी भूरे रंग का होता है। प्रत्येक फल में दो या तीन काले-काले चमकीले बीज होते हैं। कच्चे फलों में चिकना दूध होता है। पौधे भेंट कलम से या दाघ कलम से तैयार किए जाते हैं। कलम सपाटू, महुआ या खिरनी के पेड़ के साथ भाद्रपद (अगस्त) में बांध देनी चाहिए।

भूमि और खाद—दुमट और बलुआ-दुमट भूमि इसके लिए अच्छी होती है। वैसे जिस जमीन में अधिक पानी न लगे उसमें ये हो जाते हैं। गड़े बीस-पच्चीस फीट की दूरी पर आम के गड़ों की भांति तैयार करने चाहियें।

पौधे लगाना—पौधा बरसात या जाड़े में लगाना चाहिए।

सिंचाई और काट-छाँट—छोटे पौधों की सिंचाई नियमित रूप से करनी चाहिए। बड़ों की न भी की जाये तो काम चल जाता है। काट-छाँट साधारण अधिकतर सूखी टहनियां निकालने के लिए की जाती है।

फसल की तैयारी—पौधे लगाने के समय से पेड़ ५-६ साल की आयु होने पर फलने लगते हैं। लगभग २८-२५ साल की

आयु तक फल देते रहते हैं। प्रतिवर्ष चैत्र-चैशाख (मार्च-एप्रिल) और आश्विन-भाद्रपद (जुलाई-अगस्त) में फल मिलने लगते हैं। प्रतिवृत्त पाँच सौ से हजार फल तक प्राप्त हो जाते हैं। फल भेजने हों तो घास-पान रख कर टोकरियों में भेजे जा सकते हैं। जब फल के छिलकों पर से भूरा पदार्थ गिरने लगे तब उन्हें तोड़ना चाहिए।

उपयोग और गुण—इसके फल बहुत मीठे होते हैं। इसकी लकड़ी भी काफी मजबूत होती है। फल पित्तनाशक और दुग्धार दूर करने वाला होता है।

सिंघाड़ा (Water-nut—*Trapa bispinosa*)

वर्षाप्रभ होने के पूर्व ही इसके फल तालाब या झील में निही में पाँच से दस फर माह दिए जाने हैं। कुछ दिनों बाद पौधे निकल आते हैं जिनके पत्ते कमल की तरह पानी पर फैलते रहते हैं। आदिमन में फूल आकर वार्षिक तक फल द्या जाने हैं और मार्गशीर्ष तक सब फल पुन लिए जाने हैं।

होता है। इसकी दो-एक जातियां ऐसी भी हैं जो कहीं कहीं मैदानों में भी हो जाती हैं। पौधे बीही, नाशपाती या इसके बीजू पौधे पर चित्र-चैशाख (मार्च-एप्रिल) में चशमा (रिंग ड्राइफ्टिंग) चढ़ाकर तैयार किए जाते हैं। पौधे कहीं भेजने हों तो बक्सों में रख कर भेजे जा सकते हैं। सेव के पौधे पर सेव की कलम चढ़ाने से पेड़ बहुत ऊंचे हो जाते हैं। इसलिए बहुधा बिही पर ही चढ़ाते हैं, जिससे पेड़ छोटे ही रहें।

भूमि और खाद-दुमट और मटियार-दुमट जमीन इसके लिए अच्छी होती है। गढ़े १५-१५ फीट की दूरी पर तीन फीट गहरे और ३-४ फीट व्यास के तैयार किये जाते हैं। प्रत्येक गढ़े की मिट्टी में पत्ते और गोबर का सड़ा हुआ खाद करीब एक मन और दो ढाई सेर दहली का चूर्ण मिला देना चाहिए। जो पौधे बिही पर तैयार न किये गये हों उनके गढ़ों में २० फीट का अन्तर ठीक रहता है। फल आने लगें उस समय से प्रतिवर्ष पौष-माघ (दिसम्बर जनवरी) में खाद देना चाहिए। कृत्रिम खाद देना हो तो २०-२५ सेर नत्रजन, ३०-३५ सेर स्फुर और लगभग ५० सेर पोटाश प्रति एकड़ पहुँचे इतना खाद देना चाहिए।

पौधे लगाना—इसके पौधे कार्तिक (अक्टूबर) से माघ (जनवरी) तक लगाये जा सकते हैं।

सिंचाई और काट-छाँट—आवश्यकतानुसार सिंचाई होती चाहिए। फूल और फल आने लगें तब से विशेष पानी की आवश्यकता होती है। पत्तों का स्वाद अच्छा बना रहे इसलिए फल

कने लगे तब पानी कम देना चाहिए। फाट-झांट घनो ओर गी टहनियों का पौप-माप (दिसम्बर जनवरी) में होनी चाहिए। ई भी इसी समय खोली जानी चाहियें। टहनियों पर यदि फल आवश्यकता से अधिक हों तो कुछ फलों को जब वे आँवले जितने हों उभी तोड़ देना चाहिए, ताकि दूसरे फल अच्छे हों।

फल की तैयारी—पौचे लगाने के समय से छः सात बरस में पेड़ फल देने योग्य हो जाते हैं। प्रति वर्ष गर्मी के अन्त से गर्मियों के प्रारम्भ तक फल मिलते रहते हैं। फलों का चालान करने प्लांट बुड के बक्सों में होना चाहिए। सेब में भूरे-भूरे दाग लग जाते हैं और धीरे से वे बिगड़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए फलों को कागज में लपेट कर रखना चाहिए। बक्स की तह में पहले कागज बिछा कर उस पर एक तह फलों की होनी चाहिये और फलों के बीच की खाली जगह में लकड़ी के पतले-पतले छीलन भर देने चाहियें, जिसमें फल रगड़ खा कर खराब न होने पायें। इस तह के ऊपर एक दूसरा कागज रख कर फिर दूसरी तह फलों की रखनी चाहिये।

उपयोग और गुण—सेब छील कर घैसे ही खाये जाते हैं। इनका मुरब्बा भी बनाया जाता है। सेब पाचक, रुचिदायक, पित्त-वर्द्धक और रक्त को पढ़ाने वाला होता है। रोग से बढने के बाद इसका सेवन लाभदायक होता है।

सूखे फल Dry fruits

अखरोट Walnuts—Juglens regia

यह अफगानिस्तान और फारस में अधिकता से होता है। भारतवर्ष में सीमाप्रान्त कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भी कहीं-कहीं होता है। मैदानों में नहीं हो सकता।

भूमि और खाद—इसके लिए बलुआ-दुमट जमीन अच्छी होती है। गढ़े २५-२५ फीट के अन्तर पर ३-४ फीट व्यास के ३ फीट गहरे बना कर उनकी मिट्टी में एक मन गोबर पत्तों का सड़ा हुआ खाद और २-३ सेर हड्डी का चूर्ण मिला देना चाहिए।

इसके पौधे बीज से तैयार किये जा सकते हैं। बीज पहले बालू में धोकर ठंडे स्थान में रख देना चाहिये। पाँच-छः महीने में जब अंकुर फूट कर कुछ बड़े हो जायें तब एक-एक फुट की दूरी पर नर्सरी में लगा कर हर दूसरे साल स्थानान्तरित करके

खेती-बारी करने वालों के लिये दो अनुपम उपहार

अनाजों की खेती तथा शाक-भाजी-तरकारी

इन दोनों पुस्तकों से आप हर प्रकार के अनाज और तरकारी की खेती करने के तरीके तथा पैदावार बढ़ाने के सुगम उपाय जान कर सहज ही अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे।

पता—देहाती पुस्तक भण्डार, चावड़ी बाजार, देहली।

बार-बार साल के होने पर ठीक जगह पर गड़ों में लगा देने चाहिए।

पीछे लगाना—बरसात या जाड़े में लगाना ठीक होगा।

सिंचाई और काट-छाँट—साधारण सिंचाई और पत्ते मड़ने से सब पत्ती और सूखी टहनियों को काट-छाँट की जाती है।

फसल की तैयारी—इसके फल श्रावण से आश्विन तक मसते रहते हैं। ज्यों-ज्यों फल पेड़ों पर से गिरते जाते हैं, उन्हें गुगुण कर रख लिए जाते हैं। फलों को धोरो में भर कर पाटे कदनी भी दूर भेजा जा सकता है।

उपयोग और गुण—हरे फलों का अचार बनता है और [सब] फलों की मीठी जाड़ों में रखा जाता है। गली पशुओं को पकाने हैं। अखरोट भारी, गरम, वीर्यवर्धक और कफ-कारक होते हैं। पटाही लोग इसके तेल को रगाने और जलाने के काम में लाते हैं। यह जाड़ों का एक सज्जन मेवा है।

अंजीर—(Figs—*Ficus carica*)

इसके पीछे टाही लगा कर या दाब कलम से सेंदार दिये जाते हैं। फलकों का खालान छोटे बबलों में ढोपने के बुर्र में रख कर दिया जा सकता है। बड़मे पटले नली में लगा कर पीछे सेंदार कर होते चाहिए।

भूमि और खाद—बुझा-दुमट जमीन जितने खुने हो खाद अच्छी हो और पानी भी सहाय्य हो इनमें अंजीर अच्छे

सूखे फल Dry fruits

अखरोट Walnuts—Juglens regia

यह अफगानिस्तान और फारस में अधिकता से होता है। भारतवर्ष में सीमाप्रान्त कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भी कहीं-कहीं होता है। मैदानों में नहीं हो सकता।

भूमि और खाद—इसके लिए बलुआ-दुमट जमीन अच्छी होती है। गढ़े २५-२५ फीट के अन्तर पर ३-४ फीट व्यास के ३ फीट गहरे बना कर उनकी मिट्टी में एक मन गोबर पत्तों का सड़ा हुआ खाद और २-३ सेर हड्डी का चूर्ण मिला देना चाहिए।

इसके पौधे बीज से तैयार किये जा सकते हैं। बीज पड़ने वालू में धोकर ठंडे स्थान में रख देना चाहिये। पाँच-छः महीने में जब अंकुर फूट कर कुछ बड़े हो जायें तब एक-एक फुट की दूरी पर नर्सरी में लगा कर हर दूसरे साल स्थानान्तरित करें

खेती-बारी करने वालों के लिये दो अनुसम

अनाजों की खेती तथा शाक-

इन दोनों पुस्तकों से आप हर प्रकार के कारितों की खेती करने के तरीके तथा वे उपाय जान कर सहज ही अपनी

पता—देहाती पुस्तक भण्डार,

काजू—Cashew-nut

Anacardium Occidentale

काजू के पेड़ घलुआ कंकरीली जमीन में जहाँ के पानी में सरापन हो और जहाँ समुद्र की हवा लगती हो वहाँ अच्छे हो जाते हैं। इसके पौधे बीज से तैयार किये जाते हैं और पर्यावाल में पौधे लगा दिये जाते हैं। पेड़ों की २० फीट की दूरी रखी जाती है।

पौधे लगाने के समय से तीन-चार साल में पेड़ फल देने लगता है। प्रतिवर्ष गर्मी में फल मिलने रहते हैं और बरसात के होने पर खत्म हो जाते हैं।

उपयोग और गुण — भूनी हुई बीड़ी खाई जाती है। टंटन का अचार बनता है। अफ्रीका में इससे मसाला भी बनाने हैं। काजू में बादाम जैसे गुण होते हैं।

होते हैं। गर्मी में १५-१५ फीट की दूरी पर गढ़े बनवाने चाहिये जो दो-दो फीट गहरे और उतने ही व्यास के हों। गढ़े से निकली हुई मिट्टी में हड्डीमिश्रित गोबर और पत्तों की खाद प्रति गढ़ा आधा मन के करीब मिला दी जाये। फल आने लगे उस समय से प्रति वर्ष माघ (जनवरी) महीने में भी कुछ खाद देना जरूरी है। यदि इस वक्त न दे सकें तो बरसात में दे देना चाहिए।

पौधे लगाना—दो साल की आयु के पौधे वर्षा अथवा जाड़े के अन्त में लगाये।

सिंचाई और काट-छाँट—सिंचाई आवश्यकतानुसार की जाये। छोटे पौधों की काट-छाँट इस भाँति की जाये कि जिसमें डेढ़-दो फीट का घड़ और उतनी ही लम्बी शाखाएँ हों। उप-शाखाएँ इतनी ऊँची हों कि पूरा पेड़ छः सात फीट से ऊँचा न होने पाये।

फसल की तैयारी—रोपने के समय से २-३ साल बाद फल मिलने प्रारम्भ होते हैं और प्रतिवर्ष चैत्र से श्येष्ठ तक मिलते रहते हैं। कहीं-कहीं हल्की-सी बहार बरसात में भी आ जाती है, परन्तु इसके फल खट्टे होते हैं। फलों का चालान छोटी-छोटी टोकरियों में किया जा सकता है।

उपयोग और गुण—ताजे फल वैसे ही खाये जाते हैं और सूखे फलों का सेबेन दूध के साथ प्रायः जाड़े में किया जाता है। अंजीर का शर्बत बच्चों के लिए विशेष गुणकारी होता है। अंजीर हल्के, दस्तावर, सौंसी मिटाने वाले होते हैं।

काजू—Cashew-nut

Anacardium Occidentale

काजू के पेड़ धलुआ घंकरीली जमीन में जहाँ के पानी में स्थापन हो और जहाँ समुद्र की हवा लगती हो वहाँ अच्छे हो जाते हैं। इसके पौधे बीज से तैयार किये जाते हैं और वर्षाकाल में पौधे लगा दिये जाते हैं। पेड़ों की २० फीट की दूरी रखी जाती है।

पौधे लगाने के समय से तीन-चार साल में पेड़ फल देने लगता है। प्रतिवर्ष गर्मी में फल मिलने रहते हैं और दरमाग के पहले खत्म हो जाते हैं।

उपयोग और गुण — भूजी हुई बीजी खाई जाती है। हंटर या अपार बनता है। अफ्रीका में हमारे रागव भी बनते हैं। काजू में बादाम जैसे गुण होते हैं।

गुवानो, जरदालू Apricot—Prunus armeniaca

होते हैं। गर्मी में १५-१५ फीट की दूरी पर गढ़े बनवाने चाहियें जो दो-दो फीट गहरे और उतने ही व्यास के हों। गढ़े से निकली हुई मिट्टी में ह्यूमिनिफ़िड गोबर और पत्तों की खाद प्रति गड़ा आधा मन के करीब मिला दी जाये। फल आने लगें उस समय से प्रति वर्ष माघ (जनवरी) महीने में भी कुछ खाद देना जरूरी है। यदि इस वक्त न दे सकें तो बरसात में दे देना चाहिए।

पौधे लगाना—दो साल की आयु के पौधे वर्षा अथवा जाड़े के अन्त में लगायें।

सिंचाई और काट-छाँट—सिंचाई आवश्यकतानुसार की जाये। छोटे पौधों की काट-छाँट इस भाँति की जाये कि जिसमें डेढ़-दो फीट का घड़ और उतनी ही लम्बी शाखायें हों। उप-शाखायें इतनी ऊँची हों कि पूरा पेड़ छः सात फीट से ऊँचा न होने पाये।

फसल की तैयारी—रोपने के समय से २-३ साल बाद फल बनने प्रारम्भ होते हैं और प्रतिवर्ष चैत्र से अक्टूबर तक फल होते हैं। कहीं-कहीं हल्की-सी बहार बरसात में आता है, अतः इससे फल खट्टे होते हैं। फलों का उपयोग करियों में किया जा सकता है।

उपयोग और गुण—ताजे फलों का सेबेन दूध के साथ और शर्बत बच्चों के लिए अच्छे, दस्तावर, खाँसी

कोपल फेंके हुए न हों तो अच्छे दूध से भरे हुए नारियल पानी में डाल देने से कोपल फेंक देते हैं। इन कोपल फेंके हुए नारियलों को पहले नर्सरी में लगाते हैं और एक साल बाद वहाँ से उठाकर ठीक जगह पर लगा देते हैं।

भूमि और खाद—यह दुमट या बलुआ-दुमट जमीन में जहाँ तरी हो ऐसी जगह अच्छा रहता है। गद्दे २०-२० फीट की दूरी पर ३ फीट गहरे और उतने ही व्यास के बनवा कर उनकी मिट्टी में एक सेर हड्डी का चूर्ण, आध मन राख और एक मन गोबर का खाद मिलवा देना चाहिये। जब फल आने लगें उस वक्त से हर साल वरमात में ८-१० सेर नारियल की खली अथवा ४-५ सेर एरण्डी की खली के साथ एक सेर पिसी हुई हड्डी या मछली का खाद और कुछ राख दे दिया जाय। करे तो अच्छे फल प्राप्त होते हैं।

पौधे लगाना—नारियल के पौधे वरमात के शुरू में लगा दिये जाते हैं।

मिचोई और फाट-छांट—इसकी प्रायः काट-छांट छन्ही शाखाओं की करनी पड़ती है जो या तो सूख गई हों अथवा बेकार हो गई हों। पानी आवश्यकतानुसार दें।

फल की तैयारी—पौधे रोपने के बाद ५-६ साल की आयु होने पर फल प्राप्त होने लगते हैं और ८-९ सालों तक फल मिलने रहते हैं। बड़ी-बड़ी इसमें भी अधिक समय लगता है। नारियल प्रायः अस्सी वर्ष की आयु तक फल देते रहते हैं। इसकी

उपयोग और गुण—खुशानी बलवर्धक और दस्तावर होती है। इसका ऊपरी भाग और अन्दर की बाह्यम जैसी गिरी खाई जाती है। इसका भुग्घा भा वन्ता है।

चिलगांजा Chilgoza—Pinus geradiana

यह हमारे देश में नहीं होता। अफगानिस्तान की तरफ इसकी खेती होती है और यहीं से यह भारतवर्ष में आता है। इसमें फल अक्टूबर में पकते हैं। फलों को भूनकर तथा कच्चा भी खाया जाता है। भूने हुए फल का द्रिक्का जल्दी उतर जाता है और स्वाद भी अच्छा हो जाता है। इसमें तेल की मात्रा अधिक होती है। यह बड़ी ताकतवर चीज है।

चिरौंजी Chiraunji—Buchanania latifolia

मलाबार, कारो-मंडल, मसूरी और विन्धाचल पर्वत पर जंगलों में इसके पेड़ पाये जाते हैं। इसकी मींगी तूवर के बीज जैसी होती है। भील या जंगल में बसने वाले लोग जंगलों से लाकर अनाज, कपड़ा, नमक, गुड़, तेल आदि के बदले में इसे दे जाते हैं।

उपयोग और गुण—मींगी घैमे ही खाई जाती है। इसे मिठाइयों में भी डालते हैं। दूध में डालकर भी खाते हैं, बड़ी पौष्टिक चीज है। शरीर पर जलन हो तो इसका लेप करते हैं।

नारियल Coconut—Cocos nucifera

इसके पौधे फलों से तैयार किए जाते हैं। पूर्ण बाढ़ पाये हुए नारियल जो कोपल फेंकते ही उन्हीं को लगा दिया जाता है। यदि

कोपल फेंके हुए न हों तो अच्छे दूध से भरे हुए नारियल पानी में हाल देने से कोपल फेंक देते हैं। इन कोपल फेंके हुए नारियलों को पहले नर्सरी में लगाते हैं और एक साल बाद वहाँ से उठाकर ठीक जगह पर लगा देते हैं।

भूमि और खाद—यह दुमट या धनुआ-दुमट जमीन में जहाँ तरी हो ऐसी जगह अच्छा रहता है। गहरे २०-२० फीट की दूरी पर ३ फीट गहरे और उतने ही व्यास के बनवा कर उनकी मिट्टी में एक सेर हरी या चूर्ण, आध मन राख और एक मन गोबर या ग्याद मिला देना चाहिये। जब पत्र आने लगें उस वक़्त से हर साल परमात में ८-१० सेर नारियल की गली अथवा ४-५ सेर घरएही की गली के साथ एक सेर मिर्ची हुई हरी या मलाई का ग्याद और कुछ राख दे दिया जाय। करे का अच्छे फल प्राप्त होते हैं।

पींधे लगाना—नारियल के पींधे परमात के शुरू में लगा दिये जाते हैं।

मिर्चार्ई और पाट-छांट—इसकी भाँसा पाट-छांट छत्ती सायसकी की करनी पड़ती है जो या तो खुद रखे हो अथवा बेकार हो गई हो। पानी आवश्यकतानुसार दे।

पत्राल की सेवारी—पींधे रोपने के बाद ३-५ साल के आगु होने पर पत्राल होने लगते हैं और ८-१० साल के बाद फल देने लगते हैं। बड़ी बड़ी इससे भी अधिक फल दे सकते हैं। पत्राल के बाद आती हरे की आगु एक वर्ष के होते हैं। इससे

आयु सौ से डेढ़ सौ वर्ष तक मानी जाती है। प्रति वृक्ष ७०-८० फल में प्रायः सवा सौ फल प्रतिवर्ष मिलते रहते हैं। फल बो में भर कर चाहे किननी भी दूर भेज सकते हैं।

उपयोग और गुण—हरे नारियल (हान) का रस पीने में प्यास बुझती है। इसका रस ठण्डा और मीठा होता है। दूध सूखने पर अंदर का गूदा खोपरा या गिरी कहलाता है इसे बैसे बैसे खाते हैं, चटनी और कई तरह की मिठाइयाँ भी इसमें बनती हैं। गिरी का तेल खाने, जलाने, सिर में लगाने और साबुन बनाने के काम में आता है। इसके छिलकों (खोल) के छुक्के बनते हैं। फलों के ऊपर जो रेशे होते हैं उनसे रस्मियाँ बनाते हैं पूजन तथा विवाहादि शुभ कार्यों में नारियल की बहुत माँग रहती है। नारियल का गूदा चलचरक, भारी, पित्तनाशक और दाह को मिटाने वाला होता है।

पिस्ता Pistachionut—Pistacia vera

भारतवर्ष में अफ़ग़ानिस्तान की तरफ से जाड़े में बहुत पिस्ता आते हैं इसकी खेती फारस, मेसोपोटामिया, सीरिया आदि देशों में अधिक होती है। फारस में तो इसके जंगल के जंगल पाये जाते हैं। सीमाप्रान्त और बिलोचिस्तान में भी कहीं-कहीं जंगल में इसके पेड़ होते हैं। भारतवर्ष में चेष्टा करने से पहाड़ों पर इसकी खेती हो सकती है। इसके फल दो प्रकार के होते हैं, एक जल्दी फूट जाने वाले और दूसरे कठिनाई से टूटने वाले। पिस्ता में द्रोण ६० शतांश तक तेल रहता है। पिस्ता रक्तशोधक, बल-वर्धक और दहलाशक होते हैं।

आम Almonds—Amygdalus Communis

यह भी अफ़ग़ानिस्तान की तरफ अधिक होता है। भारतवर्ष में पेशावर इलाक़ों में पेड़ तो हो जाते हैं, परन्तु फल नहीं देते। यहाँ पर कुछ अंश तक फल दे जाते हैं। पौधे बीज से या के पौधे पर चढ़कर चढ़ा कर तैयार किये जाते हैं। ये भी नीति आड़ की होती के समान है। लेकिन काट-छाँट आड़, अपेक्षा अधिक करनी पड़ती है।

आम गरम, पलदायक, वीर्यवर्धक और पित्तनाशक होता है। यहाँ की ज्यादा के लिए जादों में इसका सेवन लाभप्रद होता है। इसका तेल विर-दर-दूर कर देता है।

अन्य और मुख्य आदि के लिये उपयोगी फल

अमरुआ Plum—*Prunus domestica*

आमूचुआ Plum—*Prunus Bokharensis*

आमूला Anala—*Phyllanthus emblica*

आमूली Tamarind—*Tamarindus indica*

आमूला Karanda—*Carissa carandas*

आमूला Wood-pps—*Ferula elephantaria*

आमूली Ampel—*Coccoloba punctata*

इन सबके लिये आमूलादि फल तो लेने के लिये हैं। इन फलों के लिये आमूलादि फल तो लेने के लिये हैं। इन फलों के लिये आमूलादि फल तो लेने के लिये हैं। इन फलों के लिये आमूलादि फल तो लेने के लिये हैं।

आधु सौ से डेढ़ सौ वर्ष तक मानी जाती है। प्रति वृक्ष ७०-८० फल से प्रायः सवा सौ फल प्रतिवर्ष मिलते रहते हैं। फल षोणों में भर कर चाहे कितनी भी दूर भेज सकते हैं।

उपयोग और गुण—हरे नारियल (छात्र) का रस पाने से प्यास बुझती है। इसका रस ठण्डा और मोठा होता है। दूध मूयने पर अंदर का गूदा खोपरा या गिरी कहलाता है इसे पैसे ही मानते हैं, चटनी और कई तरह की मिठाइयों भी इसमें बनती हैं। गिरी का तेल राने, जलाने, मिर में लगाने और सायुन बनाने के काम में आता है। इसके दिलकों (खोल) के छुफे बनते हैं। फलों के ऊपर जो रेशे होते हैं उनसे रस्मियाँ बनाये हैं पूजन तथा विवाहादि शुभ कार्यों में नारियल की बहुत माँग रहती है। नारियल का गुण बलवर्धक, मारी, विषनाशक और दाह को मिटाने वाला होता है।

मिलाकर पुनः यही मिट्टी गढ़े में भर दी जाती है। इससे पैदावार अच्छी होती है।

जिस भाँति मनुष्य को अपना स्वास्थ्य बनाये रखने के लिए हर प्रकार के अनाज, शाक-भाजी और तरकारियों का सेवन करना आवश्यक है उसमे फली अधिक सघ प्रकार के फलों का उपयोग करना भी मनुष्य के लिए परमआवश्यक है। परन्तु खेद का विषय है कि हमारे देश की बढ़ी हुई जन-संख्या को देखते हुए फलों की पैदावार बहुत कम है और इस कारण हम अभाव की पूर्ति के लिए बहुत से फल हमें प्रतिवर्ष बाहर से मंगाने पड़ते हैं। भूमिपतियों और कृषकजनों को इस ओर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे न केवल फलों की पैदावार ही बढ़ेगी, बल्कि बेकार लोगों को काम-धंधा मिलने का एक जरिया भी होगा।

कमी न भूलें कि—

अनाज की खेती, शाक-भाजी-तरकारी और फलों की खेती
ये तीनों पुस्तकें एक साथ मंगाने पर
हम अपने ग्राहकों को खास रियायत देते हैं।

❀ समाप्त ❀

हर प्रकार की पुस्तकें ती. पी. द्वारा मंगाने का पता

दिल्ली पुस्तक मंडिर
जयपी बाजार
देहली ६

मुद्रकः—यादव प्रिंटिंग प्रेस, बाजार सीताराम, देहली।

आयल इंजन गाइड ले०-प्रोफेसर नरेन्द्रनाथ (B. Sc.)

इस पुस्तक में रोम व आयल से चलने वाले हर किसम के अपट्टेड इंजनों का बेरोसिन अथवा पेट्रोल पर चलने वाले हर किसम के कम्पमचन इंजनों के काम करने के तरीके, उनका सारे कल पुर्जों का विस्तार के साथ वर्णन चित्रों द्वारा किया गया है। इसके अनिरिक्त पुर्जों और इंजनों में होने वाली खराबियों को जानना और ठीक करना और हर प्रकार की फिटिंग का वर्णन बहुत से चित्रों द्वारा विस्तार पूर्वक लिखा गया है। इंजन की दामप.वर निकालने का ढंग भी बताया गया है। यह पुस्तक हर इंजन दादवर मकानक और इंजीनियर के लिए एक सी लाभ-दायक और सहायक सिद्ध हुई है। पुस्तक ऐसी सरल भाषा में लिखी गई है कि थोड़े पढ़े लिखे लोग भी पूरा लाभ उठा सकते हैं। पुस्तक हिन्दी तथा उर्दू, दोनों भाषाओं में मिल सकती है। प्रथम संख्या ४१२ चित्र ६३ वम पर सजिल्द पुस्तक का रियायती मूल्य ६) छः रुपया टाक खर्च ॥१) अलग।

ट्रैक्टर और खेती अथवा (ट्रैक्टर गाइड)

लेखकः—कृष्णानन्द शर्मा M. M. (M. L. S.)

हिन्दुस्तान में ट्रैक्टर का प्रयोग अभी २ शुरु हुआ है। किन्तु इस थोड़े से समय में ही यह बहुत लोकप्रिय हो गये हैं। इससे जहां समय बचती है और पैसे भी बचत होती है, वहां बीजर जमीन को जोतना भी इसी का काम है। किन्तु हमारे बिमान भाई इसके चल पुर्जों में धाकिए न होने के कारण परेशान हैं, इस लहरन को नजर में रखते हुए हिन्दी भाषा तथा नागरी लिपि में हमने यह पुस्तक पढ़े योग्य व्यक्ति से लिखावाई है। इसकी सहायता से थोड़े पढ़े लिखे व्यक्ति भी पूरा लाभ उठा सकते हैं। मूल ७) मात्र रुपया टाक खर्च ॥२॥ अलग।

पेता—देहाती पुस्तक भण्डार, चारहों बाजार, देहली।

मिलाकर पुनः वही मिट्टी गढ़े में भर दी जाती है। इससे पैदावार अच्छी होती है।

जिस भाँति मनुष्य को अपना स्वास्थ्य बनाये रखने के लिए हर प्रकार के अनाज, शाक-भाजी और तरकारियों का सेवन करना आवश्यक है उससे कहीं अधिक सब प्रकार के फलों का उपयोग करना भी मनुष्य के लिए परमआवश्यक है। परन्तु रस का विषय है कि हमारे देश की बढ़ी हुई जन-संख्या को देखते हुए फलों की पैदावार बहुत कम है और इस कारण उम्र अभाव की पूर्ति के लिए बहुत से फल हमें प्रतिवर्ष बाहर से मँगाने पड़ते हैं। भूमिपतियों और कृषकजनों को इस ओर अवश्य ही विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे न केवल फलों की पैदावार ही बढ़ेगी, बल्कि बेकार लोगों को काम-धंधा मिलने का एक जरिया भी होगा।

कमी न भूलें कि—

अनाज की खेती, शाक-भाजी-तरकारी और फलों की खेती

ये तीनों पुस्तकें एक साथ मँगाने पर

हम अपने माहकों को ग्रास रिआयत देते हैं।

❀ समाप्त ❀

एक पुस्तक की पुस्तक के ती. टी. द्वारा मँगाने का पता

दिल्ली पुस्तक

मद्रकः—यादव प्रिंटिंग प्रेस,

मोटर मकैनिक टीचर

टैक्निकल स्कूलों तथा वर्कशॉपों से स्वीकृत)

लेखक—कृष्णानन्द शर्मा M. M. (M. E. S.)

हिन्दी भाषा में यह अमूल्य पुस्तक जिसकी वर्षों से प्रतीक्षा की जा रही थी। दूसरा संशोधित (रिवाइज्ड) संस्करण छपकर तैयार है। इस पुस्तक में वर्तमान समय की फोर्ड, श्वरलेट आदि सभी नई-पुरानी मोटर कारों के इंजनों, विजली तथा वायरिंग, हर एक पुर्जों के नाम काम तथा उनकी मरम्मत करना, एक सौ चित्रों से भरपूर यह पुस्तक इतने सरल ढंग से लिखी गई है कि कठिन से कठिन बात भी बड़ी आसानी से समझ में आती है। इससे नये काम सीखने वाले तथा पुराने दोनों प्रकार के कारीगर लाभ उठा सकेंगे, और सभी वर्कशॉपों में काम सीखने वाले ड्राइवर, तथा उम्मीदवार या किसी इंजन के इंजीनियर, मोटर मालिक, मकैनिक का काम सीखने के उम्मीदवारों की पूरी जानकारी के लिए पर्याप्त है। पृष्ठ संख्या ३३६ चित्र संख्या १०५ मूल्य केवल ६) छः रुपया डाक व्यय ॥१) अलग।

व्यापार दस्तकारी अथवा 'कला व्यापार दर्पण'

शुद्ध तथा संशोधित तीसरा संस्करण

(लेखक—श्री शिवानन्द शर्मा भास्कर)

यदि आप चाहते हैं कि संसार के हर क्षेत्र का ज्ञान हो जाये तो यह पुस्तक पढ़िये। इसका प्रत्येक पृष्ठ स्वजाने की कुञ्जी है। किसी एक कार्य को हाथ में लेकर आप गालामाल हो जायेंगे। तेल-साबुन, रंगारंग, बुनाई, दवा चित्र आदि सब कुछ बनाने की विधि दी गई है। अगर भारतीयों इस व्यापारिक तरीके को अपनायें तो हमें आशा है कि हम निरन्तर धनवान बनते चले जायें। मूल्य केवल २॥१) डाई रुपया डाक व्यय ॥२) ग्रन्थक।

पता—देहाती पुस्तक भण्डार, चावटी बाजार, देहली।

ट्रेक्टर और खेती अध्या (ट्रेक्टर गाइड)

ले० कृष्णानन्द शर्मा M. A. (M. E. S.)

हिन्दुस्तान में ट्रैक्टर का प्रयोग अभी २
शुरू हुआ है। किन्तु इस थोड़े से समय में ही यह
बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। इससे जहाँ समय का
और पैसा की बचत होती है, वहाँ वंशज जमीन का
जानना भी इसी का काम है। किन्तु हमारे किसान
भरते-भरके कत-कतों से वास्तविक न होने के कारण
परेशान हैं। इस जलूत का नजर में रखते हुए
भारत के कीने २ में जोर लिखा जाने वाला हिन्दी
भाषा तथा नागरी लिपि में हमने यह पुस्तक बड़े
ही योग्य व्यक्ति से लिखावाई है। इसकी सहायता
से थोड़े पढ़े लिखे कृषक भाई भी पूरा २ लाभ
उठा सकेंगे। क्योंकि पुस्तक बड़ी सरल है तथा
काटन बातों को भी बड़े रोचक ढंग से समझाया
गया है। इसमें बाँझा और घटिया दोनों प्रकार
के तेलों पर चलने वाले ट्रैक्टरों को स्टार्ट करना,
पेदा होने वाले नुक्सों का पहचानना तथा ठीक
करना सारी बातें समझाई गई हैं (कृपया ७) सात
रुपया ठाक स्वयं साहित्य।

देहाती पुस्तक भण्डार,

चावड़ी बाजार, दिल्ली ६

२०) रु० में रेडियो बना लो

अगर आपको रेडियो सुनने का शौक है तो स्वयं ही अपने हाथों में रेडियो तैयार करो। "बिन बिजली का रेडियो"-नाम की पुस्तक को वेदप्रकाश ने इतनी सरल भाषा में लिखा है कि मामूली हिन्दी पढ़े लिखे व्यक्ति को यह पुस्तक पढ़ लेने के बाद बिना बिजली का रेडियो बनाने का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। यह बिन बिजली का रेडियो बना भी सकता है और उसकी मरम्मत भी कर सकता है। आप भी स्वयं अपने हाथों से बिन बिजली का रेडियो तैयार करके, रेडियो सुनकर आनन्दित हो जायें।

डा० हर एक पुर्जे का अच्छी तरह समझाया गया है। इस अमूल्य पुस्तक का मूल्य केवल २) डा० खर्च सहित।

कृषि विज्ञान शास्त्र

फसलों की खेती

यह पुस्तक लेखक ने बड़े परिश्रम तथा अनुभव के आधार पर लिखी है। हर पढ़े-लिखे जमींदार (किसान) के पास इस पुस्तक का होना बर्तन आवश्यक है। इसको कृषि वर्ग के लोगों ने बहुत पसन्द किया है। पुस्तक की विषय सूची इस प्रकार है।

फसलों का हेर पेर, फसलों के दुश्मन, फसलों की बरत, अलसी, अरहर, बाजरा, जौ, गेहूँ, चना, तोरियाँ, ताण मीरा, ज्वार, चावल, गन्ना, सत, सरसों, मूँग, मोठ, मसूर, कपास मक्की आदि मूल्य ५) डा० खर्च सहित।

देहाती पुस्तक भंडार, चाँवड़ी बजार, देहली ६

